

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## דוקסילאמין ופירידוקסין מבוטא כ (peer i dox' een) (dox il' a meen)

### היי האם נרשמה תרופה זו?

השילוב של דוקסילאמין ופירידוקסין משמש לטיפול בבחילות והקאות אצל נשים הרות שתסמיניהן לא השתפרו לאחר שינוי תזונתן או שימוש בטיפולים אחרים שאינם תרופתיים. דוקסילאמין הוא בקבוצה של תרופות הנקראות אנטיהיסטמינים. זה פועל על ידי חסימת פעולתם של חומרים טבעיים מסוימים בגוף שעלולים לתרום לבחילות והקאות. פירידוקסין (ויטמין B6) הוא ויטמין. היא ניתנת מכיוון שמחסור בפירידוקסין בגוף עשוי להיות גם גורם בגרימת בחילות והקאות במהלך ההריון.

### כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

השילוב של דוקסילאמין ופירידוקסין מגיע כטבליה עם שחרור מושהה (משחרר את התרופה במעי כדי לדחות מתי התרופה תתחיל לפעול) וכטבליה בשחרור מורחב (לאורך זמן) לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל על קיבה ריקה (לפחות שעה אחת לפני או שעתיים אחרי הארוחה) עם כוס מים מלאה. בהתחלה, הרופא שלך בדרך כלל יגיד לך לקחת את זה פעם ביום לפני השינה. אם הסימפטומים שלך של בחילות והקאות אינם טובים יותר, ייתכן שהרופא שלך יגיד לך לקחת את הטבליה עם שחרור מושהה פעמיים או שלוש ביום, או את הטבליה עם שחרור מורחב פעמיים ביום. . עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח דוקסילאמין ופירידוקסין בדיוק לפי ההוראות.

לבלוע את הטבליה עם שחרור מורחב ושחרור מושהה בשלמותן; אין לפצל, ללעוס או לכתוש אותם.

בקש מהרוקח או הרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

### השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

### יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

#### לפני נטילת דוקסילאמין ופירידוקסין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לדוקסילאמין (Unisom); פירידוקסין (ויטמין B6); תרופות אנטי-היסטמיניות אחרות כולל קרבוקסמיד (ארבינוקסה), קלמאסטין (טוויסט),

כל תרופה אחרת; או כל אחד מהמרכיבים בטבליות דוקסילאמין ופירידוקסין בשחרור מושהה או בשחרור מורחב. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים (;Phenergan (1-promethazine), Benadryl(, (diphenhydramine), Dramamine(, dimenhydrinate),

- ספר לרופא שלך אם אתה נוטל מעכב מונואמין אוקסידאז (MAO) כגון (isocarboxazid) Marplan(, phenelzine) Nardil(, selegiline) Eldepryl, Emsam, Zelapar( (-Parnate) tranylcypromine. הרופא שלך כנראה יגיד לך לא לקחת דוקסילאמין ופירידוקסין אם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות הללו.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: תרופות להצטננות, קדחת השחת או אלרגיות; תרופות לדיכאון; מרפי שרירים; תרופות נרקוטיות לכאב; תרופות הרגעה; תרופות שינה; וכדורי הרגעה. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם מאסטמה או בעיות נשימה אחרות, לחץ מוגבר בעין או גלאוקומה (מצב שבו לחץ מוגבר בעין יכול להוביל לאובדן הדרגתי של ראייה), כיבים, חסימת מעיים או קשיי שתן.
- ספר לרופא שלך אם אתה מניקה. אסור להניק בזמן נטילת דוקסילאמין ופירידוקסין.
- אתה צריך לדעת שדוקסילאמין ופירידוקסין עלולים לגרום לך לנמנום. אל תנהג במכונית או תפעיל מכונות עד שאתה יודע כיצד התרופה משפיעה עליך.
- הימנע ממשקאות אלכוהוליים או מוצרים המכילים אלכוהול בזמן נטילת דוקסילאמין ופירידוקסין. אלכוהול יכול להוסיף לנמנום הנגרמת על ידי תרופה זו.

## האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

## כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שהוחמצה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשיכו בלוח הזמנים הרגיל של המינון. אין לקחת יותר מארבע טבליות בשחרור מושהה או יותר משתי טבליות בשחרור מורחב ביום. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

## התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

**דוקסילאמין ופירידוקסין עלולים לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:**

- יובש בפה, באף ובגרון
- נומה
- כאב ראש
- אי שקט
- סתירות
- כאבי שרירים או חולשה

- כאב בטן
- עצירות
- שלשול
- פריחה

## תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו, הפסק ליטול דוקסילאמין ופירידוקסין והתקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- בעיות ראייה
- ראייה מטושטשת
- אישונים מורחבים (עיגולים שחורים במרכז העיניים)
- קושי במתן שתן או הטלת שתן כואבת
- דופק מהיר, לא סדיר או דופק
- קוצר נשימה
- בלבול
- התקפים

דוקסילאמין ופירידוקסין עלולים לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

## צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה). אם התרופה שלך הגיעה עם מיכל ייבוש (מיכל קטן המכיל חומר הסופג לחות כדי לשמור על התרופה יבשה), השאר את המיכל בבקבוק.

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>].

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות כדי להגן על ילדים צעירים מהרעלה, נעל תמיד מכסי בטיחות.

ומיד למקם את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.  
<http://www.upandaway.org> ]<http://www.upandaway.org>

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help> ]<https://www.poisonhelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

### תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- אי שקט
- פה יבש
- אישונים מורחבים (עיגולים שחורים במרכז העיניים)
- ישנוניות או ישנוניות
- סחרחורת
- בלבול
- התקפים
- דופק מהיר, לא סדיר או דופק
- קושי במתן שתן או הטלת שתן כואבת
- כאבי שרירים או חולשה
- הצטברות נוזלים בגוף
- שתן אדום כהה או בצבע קולה

### צריך לדעת מידע אחר?

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

### שמות רנד

- בונג'סטטה®
- דיקלגיס®

מתוקן לאחרונה - 15/02/2017

למד כיצד לצטט דף זה



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

---

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022