

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [ドキシラミンとピリドキシシ](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

ドキシラミンとピリドキシシ

(dox il'a meen) (peer i dox' een) と発音されます

なぜこの薬が処方されているのですか？

ドキシラミンとピリドキシシの組み合わせは、食事を変えたり、他の非薬用治療を使用した後も症状が改善されていない妊婦の吐き気と嘔吐を治療するために使用されます。ドキシラミンは、抗ヒスタミン薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。吐き気や嘔吐の原因となる可能性のある体内の特定の天然物質の作用をブロックすることによって機能します。ピリドキシシ (ビタミンB6) はビタミンです。体内にピリドキシシが不足していることも、妊娠中に吐き気や嘔吐を引き起こす要因となる可能性があるためです。

わあ、この薬を使うべきですか？

ドキシラミンとピリドキシシの組み合わせは、遅延放出 (薬が効き始めるのを遅らせるために腸内で薬を放出する) 錠剤と、経口摂取する徐放性 (長時間作用型) 錠剤として提供されます。通常、空腹時に (食事の少なくとも1時間前または2時間後に) コップ一杯の水で服用します。最初は、医師は通常、就寝時に1日1回服用するように指示します。吐き気や嘔吐の症状が改善されない場合は、医師が徐放性錠剤を1日2~3回、または徐放性錠剤を1日2回服用するように指示することがあります。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。ドキシラミンとピリドキシシを指示どおりに服用してください。

徐放性および徐放性の錠剤を丸ごと飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ドキシラミンとピリドキシシを服用する前に、

- ドキシラミン (ユニソム) にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。ピリドキシシ (ビタミンB6) ; カルボキサミド (アルビノキサ)、クレマスチン (タビスト)、

ジメンヒドリナート（ドラマミン）、ジフェンヒドラミン（ベネドリル）、およびプロメタジン（フェネルガン）；その他の薬；またはドキシラミンおよびピリドキシン徐放性または徐放性錠剤の成分のいずれか。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

- イソカルボキサジド（Marplan）、フェネルジン（Nardil）、セレギリン（Eldepryl、Emsam、Zelapar）、トラニルシプロミン（Parnate）などのモノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤を服用しているかどうかを医師に伝えてください。あなたがこれらの薬の1つ以上を服用している場合、あなたの医師はおそらくドキシラミンとピリドキシンを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。風邪、干し草熱、またはアレルギーの薬。うつ病の薬；筋弛緩薬；痛みのための麻薬；鎮静剤；睡眠薬；と精神安定剤。あなたの医師はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 喘息やその他の呼吸の問題、眼圧の上昇または緑内障（眼圧の上昇が徐々に視力を失う可能性がある状態）、潰瘍、腸閉塞、または排尿困難があるかどうかを医師に伝えてください。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。ドキシラミンとピリドキシンを服用している間は授乳しないでください。
- ドキシラミンとピリドキシンが眠気を催す可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかがわかるまで、車を運転したり機械を操作したりしないでください。
- ドキシラミンとピリドキシンを服用している間は、アルコール飲料やアルコールを含む製品を避けてください。アルコールは、この薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があります。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、飲み忘れた場合は1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ドキシラミンとピリドキシンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 口、鼻、喉の乾燥
- 眠気
- 頭痛
- 落ち着きのなさ
- めまい
- 筋肉痛または脱力感

- 胃痛
- 便秘
- 下痢
- 発疹

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、ドキシラミンとピリドキシシの服用を中止し、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 視力の問題
- ぼやけた視界
- 瞳孔の拡張（目の中心にある黒い円）
- 排尿困難または痛みを伴う排尿
- 速い、不規則な、またはドキドキする心拍
- 呼吸困難
- 錯乱
- 発作

ドキシラミンとピリドキシシは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。薬剤に乾燥剤キャニスター（水分を吸収して薬剤を乾燥状態に保つ物質を含む小さなキャニスター）が付属している場合は、キャニスターをボトルに入れたままにします。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から守るために、常に安全キャップをロックしてください

そしてすぐに安全な場所に薬を置きます-彼らの視界と手の届かないところにあります。 <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。 <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- 落ち着きのなさ
- 口渇
- 瞳孔の拡張（目の中心にある黒い円）
- 眠気または眠気
- めまい
- 錯乱
- 発作
- 速い、不規則な、またはドキドキする心拍
- 排尿困難または痛みを伴う排尿
- 筋肉痛または脱力感
- 体内の水分の蓄積
- 濃い赤またはコーラ色の尿

他の情報を知っておく必要がありますか？

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ボンジェスタ®
- Diclegis®

最終改訂日-2017年2月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日