



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[집](#) → [약물, 허브 및 보조제](#) → 독실아민과 피리독신

Source : U.S. National Library of Medicine

이 페이지의 URL: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## 독실아민과 피리독신

(dox il' a meen) (peer i dox' een)로 발음

### 이 약이 처방된 이유는 무엇입니까?

독실아민과 피리독신의 조합은식이 요법을 변경하거나 다른 비 약물 치료법을 사용해도 증상이 개선되지 않은 임신부의 메스꺼움과 구토를 치료하는 데 사용됩니다. 독실아민은 항히스타민제라고 불리는 약물 종류에 속합니다. 그것은 메스꺼움과 구토에 기여할 수 있는 신체의 특정 천연 물질의 작용을 차단함으로써 작동합니다. 피리독신(비타민 B6) 비타민입니다. 체내에 피리독신이 부족하면 임신 중에 메스꺼움과 구토를 유발하는 요인이 될 수 있기 때문에 제공됩니다.

### 오 이 약을 사용해야합니까?

독실아민과 피리독신의 조합은 지연 방출(장에서 약물을 방출하여 약물 작용이 시작되는 시기를 지연시킴) 정제 및 경구로 복용하는 연장 방출(지속형) 정제로 제공됩니다. 보통 공복(식사 전 최소 1시간 또는 식후 2시간)에 물 한 컵과 함께 복용합니다. 처음에는 의사가 일반적으로 하루에 한 번 취침 시간에 복용하라고 말할 것입니다. 메스꺼움과 구토의 증상이 나아지지 않으면 의사는 지연 방출 정제를 하루에 두세 번 복용하거나 연장 방출 정제를 하루에 두 번 복용하도록 지시할 수 있습니다. . 처방전 라벨의 지시 사항을 주의 깊게 따르고 의사나 약사에게 이해되지 않는 부분에 대한 설명을 요청하십시오. 지시에 따라 독실아민과 피리독신을 정확히 복용하십시오.

연장 방출 및 지연 방출 정제를 통째로 삼키십시오. 쪼개거나 씹거나 부수지 마십시오.

약사 또는 의사에게 환자에 대한 제조업체 정보 사본을 요청하십시오.

### 이 약의 용도

이 약은 다른 용도로 처방될 수 있습니다. 자세한 내용은 의사나 약사에게 문의하십시오.

### 모자 특별 예방 조치를 따라야 합니까?

독실아민과 피리독신을 복용하기 전에,

- 독실아민(Unisom)에 알레르기가 있는 경우 의사와 약사에게 알려십시오. 피리독신(비타민 B6); 카르복사미드(Arbinoxa), 클레마스틴(Tavist),

디멘히드리네이트(Dramamine), 디펜히드라민(Benadryl) 및 프로메타진(Phenergan); 기타 약물; 또는 독실아민 및 피리독신 지연 방출 또는 연장 방출 정제의 성분 중 하나. 성분 목록은 약사에게 문의하십시오.

- isocarboxazid(Marplan), phenelzine(Nardil), selegiline(Eldepryl, Emsam, Zelapar) 및 tranylcypromine(Parnate)과 같은 모노아민 산화효소(MAO) 억제제를 복용 중인 경우 의사에게 알려십시오. 귀하가 이러한 약물 중 하나 이상을 복용하는 경우 의사는 독실아민 및 피리독신을 복용하지 말라고 말할 것입니다.
- 의사와 약사에게 귀하가 복용 중이거나 복용할 계획인 기타 처방 및 비처방 약품, 비타민, 영양 보조제, 약초 제품이 무엇인지 알려십시오. 다음 중 하나를 반드시 언급하십시오: 감기, 꽃가루 알레르기 또는 알레르기 치료제; 우울증 치료제; 근육 이완제; 통증에 대한 마약성 약물; 진정제; 수면제; 및 진정제. 의사는 약물의 복용량을 변경하거나 부작용에 대해 주의 깊게 모니터링해야 할 수도 있습니다.
- 천식 또는 기타 호흡 문제, 안압 상승 또는 녹내장(안압 상승으로 인해 점진적인 시력 상실), 궤양, 장폐색 또는 배뇨 곤란이 있거나 있었던 적이 있는지 의사에게 알려십시오. .
- 모유 수유 중인지 의사에게 알려십시오. 독실아민과 피리독신을 복용하는 동안 모유 수유를 해서는 안 됩니다.
- 독실아민과 피리독신이 졸음을 유발할 수 있음을 알아야 합니다. 이 약이 당신에게 어떤 영향을 미치는지 알기 전에는 차를 운전하거나 기계를 조작하지 마십시오.
- 독실아민과 피리독신을 복용하는 동안 알코올 음료 또는 알코올이 포함된 제품을 피하십시오. 알코올은 이 약으로 인한 졸음을 더할 수 있습니다.

## 모자 특별 식단 지침을 따라야 합니까?

의사가 달리 지시하지 않는 한 정상적인 식단을 계속하십시오.

## 복용량을 잊은 경우 모자를 써야 하나요?

놓친 복용량을 기억하는 즉시 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 가까워지면 놓친 복용량을 건너뛰고 규칙적인 복용 일정을 계속하십시오. 하루에 4개 이상의 지연 방출성 정제 또는 2개 이상의 연장 방출성 정제를 복용하지 마십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오.

## 모자 부작용이 약물이 일으킬 수 있습니까?

독실아민과 피리독신은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 다음 증상 중 하나라도 심각하거나 사라지지 않으면 의사에게 알려십시오.

- 건조한 입, 코, 목
- 졸음
- 두통
- 안절부절
- 현기증
- 근육통 또는 약점

- 복통
- 변비
- 설사
- 발진

**일부 부작용은 심각할 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 독실아민과 피리독신 복용을 중단하고 즉시 의사에게 연락하거나 응급 치료를 받으십시오.**

- 시력 문제
- 흐린 시야
- 동공 확장(눈 중앙의 검은색 원)
- 배뇨 곤란 또는 고통스러운 배뇨
- 빠르거나 불규칙하거나 두근거리는 심장 박동
- 호흡 곤란
- 착란
- 발작

독실아민과 피리독신은 다른 부작용을 일으킬 수 있습니다. 이 약을 복용하는 동안 비정상적인 문제가 발생하면 의사에게 연락하십시오.

심각한 부작용이 발생하는 경우 귀하 또는 담당 의사가 온라인으로 FDA(Food and Drug Administration)의 MedWatch 유해 사례 보고 프로그램에 보고서를 보낼 수 있습니다.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 또는 전화 (1-800-332-1088).

## 이 약의 보관 및 폐기에 대해 알아야 합니까?

이 약은 들어 있던 용기에 단단히 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실온에서 보관하고 과도한 열과 습기가 없는 곳(화장실이 아님)에 보관하십시오. 약이 건조제 용기(약물을 건조하게 유지하기 위해 수분을 흡수하는 물질이 들어 있는 작은 용기)와 함께 제공된 경우 용기를 병에 그대로 두십시오.

불필요한 약은 애완 동물, 어린이 및 다른 사람이 섭취할 수 없도록 특별한 방법으로 폐기해야 합니다. 그러나 이 약을 변기에 버리면 안 됩니다. 대신, 약물을 폐기하는 가장 좋은 방법은 약물 회수 프로그램을 이용하는 것입니다. 약사와 상담하거나 지역 쓰레기/재활용 부서에 연락하여 지역 사회의 수거 프로그램에 대해 알아보십시오. FDA의약품 안전 폐기 웹사이트(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 회수 프로그램에 대한 액세스 권한이 없는 경우 자세한 내용을 참조하십시오.

많은 용기(주간 알약 보관함 및 안약, 크림, 패치, 흡입기용 용기 등)는 어린이에게 내성이 없고 어린이가 쉽게 열 수 있으므로 모든 약을 어린이의 눈에 띄고 손이 닿지 않는 곳에 두는 것이 중요합니다. 어린 아이들을 중독으로부터 보호하기 위해 항상 안전 캡을 잠그십시오

그리고 즉시 안전한 위치에 약을 놓으십시오. 위쪽에 있고 멀리 떨어져 있고 그들의 시야와 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.  
<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n 응급/과다복용의 경우

과다 복용의 경우 독극물 관리 헬프라인 1-800-222-1222로 전화하십시오. 정보는 온라인으로도 제공됩니다.  
<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 피해자가 쓰러졌거나, 발작을 일으켰거나, 호흡 곤란을 겪거나, 깨어나지 못하면 즉시 911로 응급 서비스에 전화하십시오.

### 과다 복용의 증상에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 안절부절
- 마른 입
- 동공 확장(눈 중앙의 검은색 원)
- 졸음 또는 죽음
- 현기증
- 착란
- 발작
- 빠르거나 불규칙하거나 두근거리는 심장 박동
- 배뇨 곤란 또는 고통스러운 배뇨
- 근육통 또는 약점
- 체내 체액 축적
- 진한 빨간색 또는 콜라 색 소변

### 모자 다른 정보를 알아야합니까?

다른 사람이 귀하의 약을 복용하게 하지 마십시오. 처방전을 다시 조제하는 것과 관련하여 궁금한 사항은 약사에게 문의하십시오.

귀하가 복용하고 있는 모든 처방약 및 비처방약(일반의약품)은 물론 비타민, 미네랄 또는 기타 식이 보조제와 같은 제품의 목록을 작성하는 것이 중요합니다. 의사를 방문하거나 병원에 입원할 때마다 이 목록을 지참해야 합니다. 비상시에 휴대하는 것도 중요한 정보입니다.

## 랜드 이름

- 본제스타®
- 디클레기스®

최종 수정 - 2017년 2월 15일

[이 페이지를 인용하는 방법 알아보기](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 면책 조항](#)

AHFS®환자 투약 정보™. © 저작권, 2022. 미국 건강 시스템 약사 협회®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. 판권 소유. 복사

상업적 사용을 위해서는 ASHP의 승인을 받아야 합니다.

---

국립 의학 도서관 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 미국 보건 복지부

국립 보건원

페이지 마지막 업데이트: 2022년 3월 25일