

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Doxilamina e Piridoxina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## Doxilamina e Piridoxina

pronunciado como (dox il' a meen) (peer i dox' een)

### por que este medicamento é prescrito?

A combinação de doxilamina e piridoxina é usada para tratar náuseas e vômitos em mulheres grávidas cujos sintomas não melhoraram após a mudança de dieta ou o uso de outros tratamentos não medicamentosos. A doxilamina está em uma classe de medicamentos chamados anti-histamínicos. Funciona bloqueando a ação de certas substâncias naturais no corpo que podem contribuir para náuseas e vômitos. Piridoxina (vitamina B6) é uma vitamina. É administrado porque a falta de piridoxina no corpo também pode ser um fator para causar náuseas e vômitos durante a gravidez.

### como este medicamento deve ser usado?

A combinação de doxilamina e piridoxina vem como um comprimido de liberação retardada (libera a medicação no intestino para retardar quando a medicação começará a funcionar) e como um comprimido de liberação prolongada (de ação prolongada) para tomar por via oral. Geralmente é tomado com o estômago vazio (pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição) com um copo cheio de água. No início, seu médico geralmente lhe dirá para tomá-lo uma vez ao dia na hora de dormir. Se os seus sintomas de náusea e vômito não melhorarem, seu médico pode dizer para você tomar o comprimido de liberação retardada duas ou três vezes ao dia, ou o comprimido de liberação prolongada duas vezes ao dia. . Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome doxilamina e piridoxina exatamente como indicado.

Engula os comprimidos de liberação prolongada e de liberação retardada inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

### outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

### Que precauções especiais devo seguir?

#### Antes de tomar doxilamina e piridoxina,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à doxilamina (Unisom); piridoxina (vitamina B6); outros medicamentos anti-histamínicos, incluindo carboxamida (Arbinoxa), clemastina (Tavist),

dimenidrinato (Dramamine), difenidramina (Benadryl) e prometazina (Fenergan); quaisquer outros medicamentos; ou qualquer um dos ingredientes em comprimidos de liberação retardada ou de liberação prolongada de doxilamina e piridoxina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

- informe o seu médico se estiver tomando um inibidor da monoamina oxidase (MAO), como isocarboxazida (Marplan), fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate). Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar doxilamina e piridoxina se estiver tomando um ou mais desses medicamentos.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: medicamentos para resfriados, febre do feno ou alergias; medicamentos para depressão; relaxantes musculares; medicamentos narcóticos para dor; sedativos; medicamentos para dormir; e tranquilizantes. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se você tem ou já teve asma ou outros problemas respiratórios, aumento da pressão no olho ou glaucoma (uma condição na qual o aumento da pressão no olho pode levar à perda gradual da visão), úlceras, obstrução intestinal ou dificuldade em urinar .
- informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar enquanto estiver tomando doxilamina e piridoxina.
- você deve saber que a doxilamina e a piridoxina podem deixá-lo sonolento. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.
- evite bebidas alcoólicas ou produtos que contenham álcool enquanto estiver tomando doxilamina e piridoxina. O álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento.

## Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

### o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue com o esquema posológico regular. Não tome mais de quatro comprimidos de liberação retardada ou mais de dois comprimidos de liberação prolongada em um dia. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

### Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

**A doxilamina e a piridoxina podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:**

- boca, nariz e garganta secos
- sonolência
- dor de cabeça
- inquietação
- tontura
- dor ou fraqueza muscular

- dor de estômago
- constipação
- diarreia
- irritação na pele

**Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, pare de tomar doxilamina e piridoxina e contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:**

- problemas de visão
- visão embaçada
- pupilas dilatadas (círculos pretos no centro dos olhos)
- dificuldade em urinar ou dor ao urinar
- batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados
- falta de ar
- confusão
- convulsões

A doxilamina e a piridoxina podem causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

## **o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?**

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Se o seu medicamento veio com um recipiente dessecante (pequeno recipiente que contém uma substância que absorve a umidade para manter o medicamento seco), deixe o recipiente no frasco.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança

e coloque imediatamente a medicação em um local seguro – um que esteja longe e fora de sua vista e alcance.  
<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## **n caso de emergência/sobredosagem**

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

## **Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:**

- inquietação
- boca seca
- pupilas dilatadas (círculos pretos no centro dos olhos)
- sonolência ou sonolência
- tontura
- confusão
- convulsões
- batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados
- dificuldade em urinar ou dor ao urinar
- dor ou fraqueza muscular
- acúmulo de líquido no corpo
- urina vermelha escura ou cor de cola

## **Quais outras informações devo saber?**

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

### **nomes de rands**

- Bonjesta®
- Diclegis®

Última revisão - 15/02/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS® Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022