

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Doxilamină și piridoxină

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## **Doxilamină și piridoxină** pronunțat ca (dox il' a meen) (peer i dox' een)

### **de ce este prescris acest medicament?**

Combinția de doxilamină și piridoxină este utilizată pentru a trata greața și vărsăturile la femeile însărcinate ale căror simptome nu s-au ameliorat după schimbarea dietei sau după utilizarea altor tratamente non-medicale. Doxilamina face parte dintr-o clasă de medicamente numite antihistaminice. Acționează prin blocarea acțiunii anumitor substanțe naturale din organism care pot contribui la greață și vărsături. Piridoxina (vitamina B6) este o vitamină. Se administrează deoarece lipsa de piridoxină în organism poate fi, de asemenea, un factor de a provoca greață și vărsături în timpul sarcinii.

### **cum trebuie utilizat acest medicament?**

Combinția de doxilamină și piridoxină vine ca un comprimat cu eliberare întârziată (eliberează medicamentul în intestin pentru a întârzia momentul în care medicamentul va începe să funcționeze) și ca un comprimat cu eliberare prelungită (de lungă durată) de administrat pe cale orală. Se ia de obicei pe stomacul gol (cu cel puțin 1 oră înainte sau 2 ore după masă) cu un pahar plin de apă. La început, medicul dumneavoastră vă va spune de obicei să îl luați o dată pe zi, la culcare. Dacă simptomele dumneavoastră de greață și vărsături nu sunt mai bune, atunci medicul dumneavoastră vă poate spune să luați comprimatul cu eliberare întârziată de două sau trei ori pe zi sau comprimatul cu eliberare prelungită de două ori pe zi. . Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați doxilamină și piridoxină exact conform instrucțiunilor.

Înghițiți comprimatele cu eliberare prelungită și cu eliberare întârziată întregi; nu le despicăți, mestecați sau zdrobiți.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

### **există utilizări pentru acest medicament**

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

### **ce precauții speciale ar trebui să urmez?**

#### **Înainte de a lua doxilamină și piridoxină,**

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la doxilamină (Unisom); piridoxina (vitamina B6); alte medicamente antihistaminice, inclusiv carboxamidă (Arbinox), clemastină (Tavist),

dimenhidrinat (Dramamine), difenhidramină (Benadryl) și prometazină (Phenergan); orice alte medicamente; sau oricare dintre ingredientele din tabletele cu eliberare întârziată sau cu eliberare prelungită de doxilamină și piridoxină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă luați un inhibitor de monoaminoxidază (MAO), cum ar fi isocarboxazid (Marplan), fenelzină (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați doxilamină și piridoxină dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: medicamente pentru răceli, febra fânului sau alergii; medicamente pentru depresie; relaxante musculare; medicamente narcotice pentru durere; sedative; medicamente pentru somn; și tranchilizante. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată astm bronșic sau alte probleme de respirație, presiune crescută în ochi sau glaucom (o afecțiune în care presiunea crescută în ochi poate duce la pierderea treptată a vederii), ulcere, blocaj intestinal sau dificultăți la urinare .
- spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați doxilamină și piridoxină.
- trebuie să știți că doxilamina și piridoxina vă pot face somnolent. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.
- evitați băuturile alcoolice sau produsele care conțin alcool în timp ce luați doxilamină și piridoxină. Alcoolul se poate adăuga la somnolența cauzată de acest medicament.

## **ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?**

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## **ce ar trebui să fac dacă uit o doză?**

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și continuați programul de dozare obișnuit. Nu luați mai mult de patru comprimate cu eliberare întârziată sau mai mult de două comprimate cu eliberare prelungită într-o zi. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

## **ce efecte secundare poate provoca acest medicament?**

**Doxilamina și piridoxina pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:**

- gura, nasul și gâtul uscat
- somnolență
- durere de cap
- neliniște
- amețeală
- dureri musculare sau slăbiciune

- dureri de stomac
- constipație
- diaree
- eczemă

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, încetați să luați doxilamină și piridoxină și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:**

- probleme de vedere
- vedere încetățată
- pupile dilatate (cercuri negre în centrul ochilor)
- dificultate la urinare sau urinare dureroasă
- bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii
- dificultăți de respirație
- confuzie
- convulsii

Doxilamina și piridoxina pot provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

## **ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?**

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Dacă medicamentul dumneavoastră a venit cu un recipient cu desicant (canistru mic care conține o substanță care absoarbe umezeala pentru a menține medicamentul uscat), lăsați recipientul în sticlă.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur – unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## **n caz de urgență/supradozaj**

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

### **Simptomele supradozajului pot include următoarele:**

- neliniște
- gură uscată
- pupile dilatate (cercuri negre în centrul ochilor)
- somnolență sau somnolență
- amețelă
- confuzie
- convulsii
- bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii
- dificultate la urinare sau urinare dureroasă
- dureri musculare sau slăbiciune
- acumularea de lichid în organism
- urină roșu închis sau de culoarea cola

## **ce alte informatii ar trebui sa stiu?**

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## **nume rand**

- Bonjesta®
- Diclegis®

Ultima revizuire - 15.02.2017

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

---

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022