

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Доксиламин и Пиридоксин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## Доксиламин и Пиридоксин

произносится как (dox il' a meen) (peer i dox' een)

### зачем назначают это лекарство?

Комбинация доксиламина и пиридоксина используется для лечения тошноты и рвоты у беременных женщин, симптомы которых не улучшились после изменения диеты или применения других немедикаментозных методов лечения. Доксиламин относится к классу препаратов, называемых антигистаминными средствами. Он работает, блокируя действие определенных природных веществ в организме, которые могут вызывать тошноту и рвоту. Пиридоксин (витамин B6) является витамином. Его назначают потому, что недостаток пиридоксина в организме также может быть фактором, вызывающим тошноту и рвоту во время беременности.

### Как следует использовать это лекарство?

Комбинация доксиламина и пиридоксина выпускается в виде таблеток с отсроченным высвобождением (высвобождает лекарство в кишечнике, чтобы отсрочить начало действия лекарства) и в виде таблеток с пролонгированным высвобождением (длительного действия) для приема внутрь. Обычно его принимают натощак (как минимум за 1 час до или через 2 часа после еды), запивая полным стаканом воды. Сначала ваш врач обычно говорит вам принимать его один раз в день перед сном. Если ваши симптомы тошноты и рвоты не улучшились, ваш врач может порекомендовать вам принимать таблетки с отсроченным высвобождением два или три раза в день или таблетки с пролонгированным высвобождением два раза в день. . Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте доксиламин и пиридоксин.

Проглатывайте таблетки с пролонгированным высвобождением и отсроченным высвобождением целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

### использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

### Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

#### Прежде чем принимать доксиламин и пиридоксин,

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на доксиламин (Unisom); пиридоксин (витамин B6); другие антигистаминные препараты, включая карбоксамид (Арбинокса), клемастин (Тавист),

дименгидринат (Драмамин), дифенгидрамин (Бенадрил) и прометазин (Фенерган); любые другие лекарства; или любой из ингредиентов таблеток доксиламина и пиридоксина с отсроченным или пролонгированным высвобождением. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

- сообщите своему врачу, если вы принимаете ингибитор моноаминоксидазы (МАО), такой как изокарбосазид (марплан), фенелзин (нардил), селегилин (элдеприл, эмсам, зелапар) и транилципромин (парнат). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать доксиламин и пиридоксин, если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств.
- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из следующего: лекарства от простуды, сенной лихорадки или аллергии; лекарства от депрессии; миорелаксанты; наркотические препараты от боли; седативные средства; лекарства для сна; и транквилизаторы. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.
- сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были астма или другие проблемы с дыханием, повышенное внутриглазное давление или глаукома (состояние, при котором повышенное внутриглазное давление может привести к постепенной потере зрения), язвы, закупорка кишечника или затрудненное мочеиспускание. .
- Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, принимая доксиламин и пиридоксин.
- Вы должны знать, что доксиламин и пиридоксин могут вызывать сонливость. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.
- избегайте алкогольных напитков или продуктов, содержащих алкоголь, принимая доксиламин и пиридоксин. Алкоголь может усилить сонливость, вызванную этим лекарством.

### **какие специальные диетические указания я должен соблюдать?**

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

### **Что мне делать, если я забыл принять дозу?**

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте обычный график приема. Не принимайте более четырех таблеток с отсроченным высвобождением или более двух таблеток с пролонгированным высвобождением в день. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

### **Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?**

**Доксиламин и пиридоксин могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:**

- сухость во рту, носу и горле
- сонливость
- Головная боль
- беспокойство
- головокружение
- мышечная боль или слабость

- боль в животе
- запор
- диарея
- сыпь

**Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, прекратите прием доксиламина и пиридоксина и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:**

- проблемы со зрением
- затуманенное зрение
- расширенные зрачки (черные круги в центре глаз)
- затрудненное мочеиспускание или болезненное мочеиспускание
- быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение
- сбивчивое дыхание
- путаница
- припадки

Доксиламин и пиридоксин могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

## Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной). Если к вашему лекарству прилагалась канистра с осушителем (небольшая канистра, содержащая вещество, которое поглощает влагу, чтобы лекарство оставалось сухим), оставьте канистру в бутылке.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы защитить маленьких детей от отравления, всегда запирайте предохранительные колпачки.

и немедленно поместите лекарство в безопасное место — то, которое находится наверху и вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## **п экстренный случай/передозировка**

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

## **Симптомы передозировки могут включать следующее:**

- беспокойство
- сухость во рту
- расширенные зрачки (черные круги в центре глаз)
- сонливость или сонливость
- головокружение
- путаница
- припадки
- быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение
- затрудненное мочеиспускание или болезненное мочеиспускание
- мышечная боль или слабость
- скопление жидкости в организме
- моча темно-красного или цвета колы

## **какую другую информацию я должен знать?**

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

## **ранд имена**

- Бонжеста®
- Диклегис®

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Инс. Отказ от ответственности](#)

АНФС®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

---

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.