

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Doxilamina y Piridoxina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## **Doxilamina y Piridoxina**

pronunciado como (dox il' a meen) (peer i dox' een)

### **¿Por qué se prescribe este medicamento?**

La combinación de doxilamina y piridoxina se usa para tratar las náuseas y los vómitos en mujeres embarazadas cuyos síntomas no han mejorado después de cambiar su dieta o usar otros tratamientos no medicamentosos. La doxilamina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihistamínicos. Funciona al bloquear la acción de ciertas sustancias naturales en el cuerpo que pueden contribuir a las náuseas y los vómitos. Piridoxina (vitamina B<sub>6</sub>) es una vitamina. Se administra porque la falta de piridoxina en el cuerpo también puede ser un factor que cause náuseas y vómitos durante el embarazo.

### **¿Cómo se debe usar este medicamento?**

La combinación de doxilamina y piridoxina viene como una tableta de liberación retardada (libera el medicamento en el intestino para retrasar el momento en que el medicamento comenzará a funcionar) y como una tableta de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por vía oral. Por lo general, se toma con el estómago vacío (al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida) con un vaso lleno de agua. Al principio, su médico generalmente le indicará que lo tome una vez al día a la hora de acostarse. Si sus síntomas de náuseas y vómitos no mejoran, entonces su médico puede indicarle que tome la tableta de liberación retardada dos o tres veces al día, o la tableta de liberación prolongada dos veces al día. . Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la doxilamina y la piridoxina exactamente como se indica.

Trague las tabletas de liberación prolongada y de liberación retardada enteras; no los parta, mastique ni triture.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

### **Otros usos de este medicamento**

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

### **¿Qué precauciones especiales debo seguir?**

#### **Antes de tomar doxilamina y piridoxina,**

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la doxilamina (Unisom); piridoxina (vitamina B<sub>6</sub>); otros medicamentos antihistamínicos que incluyen carboxamida (Arbinox), clemastina (Tavist),

dimenhidrinato (Dramamine), difenhidramina (Benadryl) y prometazina (Phenergan); cualquier otro medicamento; o cualquiera de los ingredientes de las tabletas de liberación retardada o prolongada de doxilamina y piridoxina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

- Informe a su médico si está tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa (MAO), como isocarboxazida (Marplan), fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) y tranilcipromina (Parnate). Su médico probablemente le indicará que no tome doxilamina y piridoxina si está tomando uno o más de estos medicamentos.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: medicamentos para resfriados, fiebre del heno o alergias; medicamentos para la depresión; relajantes musculares; medicamentos narcóticos para el dolor; sedantes; medicamentos para dormir; y tranquilizantes. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido asma u otros problemas respiratorios, aumento de la presión en el ojo o glaucoma (una afección en la que el aumento de la presión en el ojo puede conducir a la pérdida gradual de la visión), úlceras, obstrucción intestinal o dificultad para orinar .
- Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar mientras toma doxilamina y piridoxina.
- Debe saber que la doxilamina y la piridoxina pueden provocarle somnolencia. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.
- evite las bebidas alcohólicas o productos que contengan alcohol mientras toma doxilamina y piridoxina. El alcohol puede aumentar la somnolencia causada por este medicamento.

## ¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

## ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario regular de dosificación. No tome más de cuatro tabletas de liberación retardada o más de dos tabletas de liberación prolongada en un día. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

## ¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

**La doxilamina y la piridoxina pueden ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:**

- sequedad de boca, nariz y garganta
- somnolencia
- dolor de cabeza
- inquietud
- mareo
- dolor muscular o debilidad

- dolor de estómago
- constipación
- Diarrea
- erupción

**Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar doxilamina y piridoxina y llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:**

- problemas de la vista
- visión borrosa
- pupilas dilatadas (círculos negros en el centro de los ojos)
- dificultad para orinar o dolor al orinar
- latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes
- dificultad para respirar
- confusión
- convulsiones

La doxilamina y la piridoxina pueden ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

### **¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?**

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). Si su medicamento vino con un recipiente desecante (pequeño recipiente que contiene una sustancia que absorbe la humedad para mantener seco el medicamento), deje el recipiente en el frasco.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad

e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, uno que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## **n caso de emergencia/sobredosis**

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

### **Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:**

- inquietud
- boca seca
- pupilas dilatadas (círculos negros en el centro de los ojos)
- somnolencia o somnolencia
- mareo
- confusión
- convulsiones
- latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes
- dificultad para orinar o dolor al orinar
- dolor muscular o debilidad
- acumulación de líquido en el cuerpo
- orina de color rojo oscuro o cola

## **¿Qué otra información debo saber?**

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

### **nombres aleatorios**

- bonjesta®
- Diclegis®

Última revisión - 15/02/2017

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. All Rights Reserved. Duplication for commercial use must be authorized by ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 U.S. Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Page last updated: 25 March 2022