

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Doxylamin och Pyridoxin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

Doxylamin och Pyridoxin

uttalas som (dox il' a meen) (peer i dox' een)

hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av doxylamin och pyridoxin används för att behandla illamående och kräkningar hos gravida kvinnor vars symtom inte har förbättrats efter att ha ändrat sin kost eller använt andra icke-medicinska behandlingar. Doxylamin är i en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera verkan av vissa naturliga ämnen i kroppen som kan bidra till illamående och kräkningar. Pyridoxin (vitamin B₆) är ett vitamin. Det ges eftersom brist på pyridoxin i kroppen också kan vara en faktor för att orsaka illamående och kräkningar under graviditeten.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av doxylamin och pyridoxin kommer som en tablett med fördröjd frisättning (släpper läkemedlet i tarmen för att fördröja när läkemedlet börjar verka) och som en tablett med fördröjd frisättning (långverkande) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis på fastande mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid) med ett helt glas vatten. Till en början kommer din läkare vanligtvis att säga till dig att ta det en gång om dagen vid sänggåendet. Om dina symtom på illamående och kräkningar inte är bättre, kan din läkare säga till dig att ta tablettens med fördröjd frisättning två eller tre gånger om dagen, eller tablettens med förlängd frisättning två gånger om dagen. . Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta doxylamin och pyridoxin exakt enligt anvisningarna.

Svälj tablettorna med förlängd och fördröjd frisättning hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar doxylamin och pyridoxin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot doxylamin (Unisom); pyridoxin (vitamin B₆); andra antihistaminläkemedel inklusive karboxamid (Arbinox), clemastin (Tavist),

dimenhydrinat (Dramamin), difenhydramin (Benadryl) och prometazin (Phenergan); andra mediciner; eller någon av ingredienserna i doxylamin och pyridoxin tabletter med fördröjd frisättning eller förlängd frisättning. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

- tala om för din läkare om du tar en monoaminoxidashämmare (MAO) som isokarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta doxylamin och pyridoxin om du tar en eller flera av dessa mediciner.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: mediciner mot förkylningar, hörsnuva eller allergier; läkemedel mot depression; muskelavslappnande medel; narkotiska läkemedel mot smärta; lugnande medel; sömnmediciner; och lugnande medel. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft astma eller andra andningsproblem, ökat tryck i ögat eller glaukom (ett tillstånd där ökat tryck i ögat kan leda till gradvis förlust av synen), sår, blockering av tarmen eller svårigheter att kissa .
- tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du tar doxylamin och pyridoxin.
- du bör veta att doxylamin och pyridoxin kan göra dig dåsig. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.
- Undvik alkoholhaltiga drycker eller produkter som innehåller alkohol när du tar doxylamin och pyridoxin. Alkohol kan lägga till dåsigheten som orsakas av denna medicin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte mer än fyra tabletter med fördröjd frisättning eller mer än två tabletter med förlängd frisättning på en dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Doxylamin och pyridoxin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- torr mun, näsa och svalg
- dåsighet
- huvudvärk
- rastlöshet
- yrsel
- muskelsmärta eller svaghet

- magont
- förstoppning
- diarre
- utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, sluta ta doxylamin och pyridoxin och ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- synproblem
- suddig syn
- vidgade pupiller (svarta cirklar i mitten av ögonen)
- svårigheter att urinera eller smärtsam urinering
- snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag
- andnöd
- förvirring
- anfall

Doxylamin och pyridoxin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Om din medicin kom med en torkmedelsbehållare (liten behållare som innehåller ett ämne som absorberar fukt för att hålla läkemedlet torrt), lämna behållaren i flaskan.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid säkerhetskåpor

och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är uppe och borta och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- rastlöshet
- torr mun
- vidgade pupiller (svarta cirklar i mitten av ögonen)
- dåsighet eller sömnighet
- yrsel
- förvirring
- anfall
- snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag
- svårigheter att urinera eller smärtsam urinering
- muskelsmärta eller svaghet
- ansamling av vätska i kroppen
- mörkröd eller kolafärgad urin

hat annan information bör jag veta?

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Bonjesta®
- Diclegis®

Senast reviderad - 2017-02-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022