

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

دوكسيلامين وبيريدوكسين تنطق (peer i dox' een) (dox il 'a meen)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم مزيج دوكسيلامين وبيريدوكسين لعلاج الغثيان والقيء لدى النساء الحوامل اللواتي لم تتحسن أعراضهن بعد تغيير نظامهن الغذائي أو استخدام علاجات أخرى غير طبية. ينتمي دوكسيلامين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الهيستامين. وهو يعمل عن طريق منع عمل بعض المواد الطبيعية في الجسم التي قد تساهم في الغثيان والقيء. البيريدوكسين (فيتامين ب6) فيتامين. يتم إعطاؤه لأن نقص البيريدوكسين في الجسم قد يكون أيضاً عاملاً في التسبب في الغثيان والقيء أثناء الحمل.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي مزيج دوكسيلامين وبيريدوكسين كإصدار متأخر (يطلق الدواء في الأمعاء لتأخير موعد بدء الدواء) وكقرص ممتد المفعول (طويل الأمد) ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله على معدة فارغة (قبل ساعة واحدة على الأقل أو ساعتين بعد الوجبة) مع كوب كامل من الماء. في البداية ، سيخبرك طبيبك عادةً بتناوله مرة واحدة يومياً في وقت النوم. إذا لم تتحسن أعراض الغثيان والقيء ، فقد يخبرك طبيبك أن تأخذ قرصاً مؤجل الإصدار مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ، أو قرص ممتد المفعول مرتين في اليوم. . اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ دوكسيلامين وبيريدوكسين تماماً حسب التوجيهات.

ابتلاع الأقراص الممتدة المفعول والأقراص المتأخرة ؛ لا تقسمها أو تمضغها أو تسحقها.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول دوكسيلامين وبيريدوكسين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من دوكسيلامين (يونيسوم) ؛ البيريدوكسين (فيتامين ب6) ؛ الأدوية الأخرى المضادة للهيستامين بما في ذلك كاربوكساميد (أريبنوكسا) ، كليماستين (تافيست) ،

ديمينهيدرينات(درامامين) وديفينهيدرامين (بينادريل) وبروميثازين (فينيرجان) ؛ أي أدوية أخرى أو أي من المكونات الموجودة في أقراص دوكسيلامين وبيريدوكسين ، أو أقراص إطالة المفعول. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.

- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول مثبط أكسيديز أحادي الأمين (MAO) مثل إيزوكاربوكسازيد (ماربلان) ، فينيلزين (نارديل) ، سيليجيلين(الدبريل ، إمسام ، زيلابار) ، وترانيلسيبرومين (بارنات). من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول دوكسيلامين وبيريدوكسين إذا كنت تتناول واحداً أو أكثر من هذه الأدوية.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: أدوية لنزلات البرد أو حمى القش أو الحساسية. أدوية للاكتئاب.مرخيات العضلات الأدوية المخدرة للألم. المهدئات. أدوية النوم والمهدئات. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني أو عانيت من قبل من الربو أو مشاكل التنفس الأخرى ، أو زيادة الضغط في العين أو الجلوكوما(وهي حالة يمكن أن يؤدي فيها الضغط المتزايد في العين إلى فقدان تدريجي للرؤية) ، أو القرحة ، أو انسداد الأمعاء ، أو صعوبة التبول .
- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. يجب عدم الإرضاع أثناء تناول دوكسيلامين وبيريدوكسين.
- يجب أن تعلم أن دوكسيلامين وبيريدوكسين قد يجعلك تشعر بالنعاس. لا تقود السيارة أو تشغل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.
- تجنب المشروبات الكحولية أو المنتجات التي تحتوي على الكحول أثناء تناول دوكسيلامين وبيريدوكسين. يمكن أن يزيد الكحول النعاس الذي يسببه هذا الدواء.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعالها إذا نسيت جرعة؟

خذالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا كان الوقت قد حان للجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب دوكسيلامين وبيريدوكسين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- جفاف الفم والأنف والحنجرة
- النعاس
- صداع الراس
- الأرق
- دوخة
- آلام العضلات أو ضعفها

- آلام في المعدة
- إمساك
- إسهال
- متسرع

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فتوقف عن تناول دوكسيلامين وبيريدوكسين واتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- مشاكل في الرؤية
- عدم وضوح الرؤية
- اتساع حدقة العين (دوائىر سوداء في مراكز العيون)
- صعوبة في التبول أو التبول المؤلم
- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو متقطعة
- ضيق في التنفس
- ارتباك
- النوبات

قد يسبب دوكسيلامين وبيريدوكسين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام). إذا كان الدواء الخاص بك يأتي مع علبة مجففة (علبة صغيرة تحتوي على مادة تمتص الرطوبة للحفاظ على الدواء جافاً) ، اترك العلبة في الزجاج.

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [c4Rm4p] / [http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغذية الأمان

وعلى الفور ضع الدواء في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.

[http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org

نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- الأرق
- فم جاف
- اتساع حدقة العين (دوائر سوداء في مراكز العيون)
- النعاس أو النعاس
- دوخة
- ارتباك
- النوبات
- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو متقطعة
- صعوبة في التبول أو التبول المؤلم
- آلام العضلات أو ضعفها
- تراكم السوائل في الجسم
- البول الأحمر الداكن أو لون الكولا

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- بونجستا®
- ديكليجيس®

آخر مراجعة - 2017/02/15

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض TM. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022