



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → [ดีออกซิลามีนและไพริดอกซี](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## ดีออกซิลามีนและไพริดอกซี

ออกเสียงว่า (dox il 'a meen) (peer i dox' een)

### hy เป็นยานี้กำหนด?

การใช้ยา doxylamine และ pyridoxine ร่วมกันใช้รักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ที่อาการไม่ดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนอาหารหรือใช้ยารักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ยา ดีออกซิลามีนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาแก้แพ้ มันทำงานโดยการปิดกั้นการทำงานของสารธรรมชาติบางชนิดในร่างกายที่อาจนำไปสู่อาการคลื่นไส้และอาเจียน ไพริดอกซี (วิตามิน B6) เป็นวิตามิน ได้รับเนื่องจากกรดไพริดอกซีในร่างกายอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนในระหว่างตั้งครรภ์

### ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

การรวมกันของ doxylamine และ pyridoxine มาในรูปแบบเม็ดออกฤทธิ์ช้า (ปล่อยยาในลำไส้เพื่อชะลอเมื่อยาเริ่มทำงาน) แก๊บเล็ทและเป็นยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน (longacting) ที่จะรับประทานทางปาก โดยปกติจะต้องรับประทานในขณะท้องว่าง (อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร) ด้วยน้ำเต็มแก้ว ในตอนแรก แพทย์ของคุณมักจะบอกให้คุณทานวันละครั้ง ก่อนนอน หากอาการคลื่นไส้และอาเจียนของคุณไม่ดีขึ้น แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานยาเม็ดที่ออกฤทธิ์ช้าสองหรือสาม ครั้งต่อวัน หรือยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นานวันละสองครั้ง . ปฏิบัติตามคำแนะนำนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานดีออกซิลามีนและไพริดอกซีตามคำแนะนำ

กลืนเม็ดยาแบบขยายเวลาและแบบล่าช้าออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

### ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

### หมวด ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

#### ก่อนรับประทานดีออกซิลามีนและไพริดอกซี

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ดีออกซิลามีน (Unisom); ไพริดอกซี (วิตามิน B6); ยาต้านฮีสตามีนอื่น ๆ รวมถึงคาร์บอซอกซาไมด์ (Arbinoxa), เคลมาสทีน (เกวิส)

โดเมนไฮโดรเจน (ดรามามีน), โดเฟนไฮโดรามีน (เบนาดริล) และโพรเมทาสีน (ฟีเนอร์แกน); ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดด็อกซิลาซีนและไพริดอกซินที่ออกฤทธิ์ช้าหรือออกฤทธิ์นาน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังใช้ตัวยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine (Parnate) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานด็อกซิลาซีนและไพริดอกซินถ้าคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาสำหรับโรคหัวใจ ใช้ละอองฟาง หรือภูมิแพ้; ยารักษาโรคซึมเศร้า; ยากลายกล้ามเนื้อ; ยาเสพติดสำหรับอาการปวด; ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคหอบหืดหรือปัญหาการหายใจอื่น ๆ ความดันในตาหรือต้อหินเพิ่มขึ้น (ภาวะที่ความดันในดวงตาเพิ่มขึ้นอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นที่เล็กน้อย) แผลในลำไส้อุดตันหรือปัสสาวะลำบาก .
- แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะทานด็อกซิลาซีนและไพริดอกซิน
- คุณควรรู้ว่าด็อกซิลาซีนและไพริดอกซินอาจทำให้คุณง่วง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ในขณะที่ทานด็อกซิลาซีนและไพริดอกซิน แอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้

## ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

## ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ อย่ากินยาเม็ดที่ออกฤทธิ์ช้าเกินสี่เม็ดหรือมากกว่าสองเม็ดที่ปล่อยยาเป็นเวลานานในหนึ่งวัน อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

## ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

**Doxylamine และ pyridoxine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:**

- ปากแห้ง จมูกและลำคอ
- อาการง่วงนอน
- ปวดหัว
- กระสับกระส่าย
- อาการเวียนศีรษะ
- ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

- อาการปวดท้อง
- ท้องผูก
- ท้องเสีย
- ผื่น

**ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดทานด็อกซิลามีนและไพรด์ดอกซินและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษายาบาลฉุกเฉิน:**

- ปัญหาการมองเห็น
- มองเห็นภาพซ้อน
- รูม่านตาขยาย (วงกลมสีดำตรงกลางดวงตา)
- ปัสสาวะลำบากหรือปัสสาวะเจ็บปวด
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง
- หายใจถี่
- ความสับสน
- อาการชัก

ด็อกซิลามีนและไพรด์ดอกซินอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

## หมวก ฉนวนความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ) หากยาของคุณมาพร้อมกับกระป๋องสารดูดความชื้น (กระป๋องขนาดเล็กที่มีสารที่ดูดซับความชื้นเพื่อให้ยาแห้ง) ให้ทิ้งกระป๋องไว้ในขวด

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยว เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาในถังโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ฝูดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ

และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเฝ้าถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

## อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- กระสับกระส่าย
- ปากแห้ง
- ฐานตาขยาย (วงกลมสีดำตรงกลางดวงตา)
- ง่วงนอนหรืออ่อนเพลีย
- อาการเวียนศีรษะ
- ความสับสน
- อาการชัก
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง
- ปัสสาวะลำบากหรือปัสสาวะเจ็บปวด
- ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง
- การระคายเคืองของเหลวในร่างกาย
- ปัสสาวะสีแดงเข้มหรือสีโคล่า

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแบรนด์

- Bonjesta®
- Diclegis®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS® ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ © ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

---

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022