

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Doksilamin ve Piridoksin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

## doksilamin ve piridoksin

(dox il' a meen) olarak telaffuz edilir (peer i dox' een)

### Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Doksilamin ve piridoksin kombinasyonu, diyetlerini değiştirdikten veya diğer ilaç dışı tedavileri kullandıktan sonra semptomları düzelmeyen hamile kadınlarda bulantı ve kusmayı tedavi etmek için kullanılır. Doksilamin, antihistaminikler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Bulantı ve kusmaya katkıda bulunabilecek vücuttaki bazı doğal maddelerin etkisini bloke ederek çalışır. Piridoksin (B vitamini6) bir vitamindir. Vücutta piridoksin eksikliği de hamilelik sırasında bulantı ve kusmaya neden olan bir faktör olabileceği için verilir.

### peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Doksilamin ve piridoksin kombinasyonu, gecikmeli salım (ilaç çalışmaya başlayacağını geciktirmek için ilacı bağırsakta serbest bırakır) tablet ve ağızdan almak için uzun süreli salım (uzun etkili) tablet olarak gelir. Genellikle aç karnına (yemekten en az 1 saat önce veya 2 saat sonra) bir bardak dolusu su ile alınır. İlk başta, doktorunuz genellikle günde bir kez yatmadan önce almanızı söyleyecektir. Bulantı ve kusma semptomlarınız daha iyi değilse, doktorunuz gecikmeli salımlı tableti günde iki veya üç kez veya uzatılmış salımlı tableti günde iki kez almanızı söyleyebilir. . Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuza veya eczacınıza danışarak açıklamasını isteyin. Doksilamin ve piridoksini aynen belirtildiği gibi alın.

Uzatılmış salımlı ve gecikmeli salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

### bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### özel önlemler almalı mıyım?

#### Doksilamin ve piridoksin almadan önce,

- doksilamine (Unisom) alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; piridoksin (B6 vitamini); karboksamid (Arbinoxa), klemastin (Tavist) dahil olmak üzere diğer antihistaminik ilaçlar,

dimenhidrinat (Dramamin), difenhidramin (Benadryl) ve prometazin (Phenergan); diğer ilaçlar; veya doksilamin ve piridoksin gecikmeli salımlı veya uzun salımlı tabletlerdeki bileşenlerden herhangi biri. Eczacıınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

- izokarboksazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate) gibi bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size doksilamin ve piridoksin almamanızı söyleyecektir.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: soğuk algınlığı, saman nezlesi veya alerji ilaçları; depresyon ilaçları; kas gevşeticiler; ağrı için narkotik ilaçlar; sakinleştirici; uyku ilaçları; ve sakinleştiriciler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- doktorunuza astım veya diğer solunum problemlerinizi, gözde basınç artışı veya glokom (gözdeki artan basıncın kademeli olarak görme kaybına yol açabileceği bir durum), ülser, bağırsak tıkanıklığı veya idrara çıkma zorluğu olup olmadığını söyleyin. .
- Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doksilamin ve piridoksin alırken emzirmemelisiniz.
- doksilamin ve piridoksinin uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.
- doksilamin ve piridoksin alırken alkollü içeceklerden veya alkol içeren ürünlerden kaçınınız. Alkol, bu ilacın neden olduğu uyusukluğu artırabilir.

## Özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

## Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Günde dörtten fazla gecikmeli salımlı tablet veya ikiden fazla uzatılmış salımlı tablet almayın. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

## Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

**Doksilamin ve piridoksin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:**

- ağız, burun ve boğaz kuruluğu
- uyusukluk
- baş ağrısı
- huzursuzluk
- baş dönmesi
- kas ağrısı veya zayıflığı

- karın ağrısı
- kabızlık
- ishal
- döküntü

**Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doksilamin ve piridoksin almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:**

- görüş problemleri
- bulanık görme
- genişlemiş öğrenciler (gözlerin ortasındaki siyah halkalar)
- idrara çıkma zorluğu veya ağrılı idrara çıkma
- hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı
- nefes darlığı
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- nöbetler

Doksilamin ve piridoksin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

## **Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?**

Bu ilacı geldiği kaptan, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. İlacınız bir kurutucu kutu (ilacın kuru kalması için nemi emen bir madde içeren küçük kutu) ile birlikte geldiyse kutuyu şişede bırakın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin.

ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun – yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.  
<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

## Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

- huzursuzluk
- kuru ağız
- genişlemiş öğrenciler (gözlerin ortasındaki siyah halkalar)
- uyuşukluk veya uyku hali
- baş dönmesi
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- nöbetler
- hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı
- idrara çıkma zorluğu veya ağrılı idrara çıkma
- kas ağrısı veya zayıflığı
- vücutta sıvı birikmesi
- koyu kırmızı veya kola renkli idrar

## Şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

## rand isimleri

- bonjesta®
- Diclegis®

Son Revize - 02/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022