

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Доксиламин и пиридоксин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

Доксиламин и пиридоксин

произнася се като (dox il' a meen) (peer i dox' een)

защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от доксиламин и пиридоксин се използва за лечение на гадене и повръщане при бременни жени, чиито симптоми не са се подобрили след промяна на диетата им или използване на други немедикаментозни лечения. Доксиламинът е в клас лекарства, наречени антихистамини. Действа като блокира действието на определени естествени вещества в тялото, които могат да допринесат за гадене и повръщане. Пиридоксин (витамин В6) е витамин. Предписва се, защото липсата на пиридоксин в организма може също да бъде фактор за причиняване на гадене и повръщане по време на бременност.

как трябва да се използва това лекарство?

Комбинацията от доксиламин и пиридоксин се предлага като таблетка със забавено освобождаване (освобождава лекарството в червата, за да забави кога лекарството ще започне да действа) и като таблетка с удължено освобождаване (удължено действие), която се приема през устата. Обикновено се приема на празен стомах (поне 1 час преди или 2 часа след хранене) с пълна чаша вода. В началото Вашият лекар обикновено ще Ви каже да го приемате веднъж дневно преди лягане. Ако симптомите Ви на гадене и повръщане не са по-добри, тогава Вашият лекар може да Ви каже да приемате таблетката със забавено освобождаване два или три пъти на ден или таблетката с удължено освобождаване два пъти дневно. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте доксиламин и пиридоксин точно както е указано.

Поглъщайте таблетките с удължено освобождаване и таблетките със забавено освобождаване цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете доксиламин и пиридоксин,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към доксиламин (Unisom); пиридоксин (витамин В6); други антихистаминови лекарства, включително карбоксамид (Arbinoxa), клемастин (Tavist),

дименхидринат (Dramamine), дифенхидрамин (Benadryl) и прометазин (Phenergan); всякакви други лекарства; или някоя от съставките на таблетките с доксиламин и пиридоксин със забавено или удължено освобождаване. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

- уведомете Вашия лекар, ако приемате инхибитор на моноаминоксидазата (MAO) като изокарбосазид (Marplan), фенелзин (Nardil), селегилин (Eldepryl, Emsam, Zelapar) и транилципромин (Parnate). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате доксиламин и пиридоксин, ако приемате едно или повече от тези лекарства.
- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: лекарства за настинка, сenna хрема или алергии; лекарства за депресия; мускулни релаксанти; Наркотични лекарства за болка; успокоителни; лекарства за сън; и транквиланти. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.
- уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали астма или други проблеми с дишането, повишено налягане в окото или глаукома (състояние, при което повишеното налягане в окото може да доведе до постепенна загуба на зрение), язви, чревно запушване или затруднено уриниране .
- кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате доксиламин и пиридоксин.
- трябва да знаете, че доксиламинът и пиридоксинът могат да ви направят сънливи. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.
- избягвайте алкохолни напитки или продукти, съдържащи алкохол, докато приемате доксиламин и пиридоксин. Алкохолът може да увеличи сънливостта, причинена от това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не приемайте повече от четири таблетки с отложено освобождаване или повече от две таблетки с удължено освобождаване на ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Доксиламин и пиридоксин могат да причинят странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

- сухота в устата, носа и гърлото
- СЪНЛИВОСТ
- главоболие
- безпокойство
- световъртеж
- мускулна болка или слабост

- стомашни болки
- запек
- диария
- обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, спрете приема на доксиламин и пиридоксин и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

- проблеми със зрението
- замъглено зрение
- разширени зеници (черни кръгове в центровете на очите)
- затруднено уриниране или болезнено уриниране
- бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм
- недостиг на въздух
- объркване
- припадъци

Доксиламин и пиридоксин могат да причинят други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Ако вашето лекарство се доставя с кутия за десикант (малка кутия, която съдържа вещество, което абсорбира влагата, за да поддържа лекарството сухо), оставете кутията в бутилката.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки

и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече и далеч от погледа им и обсега.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

п случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

- безпокойство
- суха уста
- разширени зеници (черни кръгове в центровете на очите)
- СЪНЛИВОСТ ИЛИ СЪНЛИВОСТ
- световъртеж
- объркване
- припадъци
- бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм
- затруднено уриниране или болезнено уриниране
- мускулна болка или слабост
- натрупване на течности в тялото
- тъмночервена или оцветена на кола урина

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

- Боньеста®
- Диклегис®

Последна редакция - 15.02.2017 г

Научете как да цитирате тази страница



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г