

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Doxylamine en pyridoxine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

Doxylamine en pyridoxine

uitgesproken als (dox il' a meen) (peer i dox' een)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van doxylamine en pyridoxine wordt gebruikt voor de behandeling van misselijkheid en braken bij zwangere vrouwen bij wie de symptomen niet zijn verbeterd na het veranderen van hun dieet of het gebruik van andere niet-medicamenteuze behandelingen. Doxylamine zit in een klasse van medicijnen die antihistaminica worden genoemd. Het werkt door de werking van bepaalde natuurlijke stoffen in het lichaam te blokkeren die kunnen bijdragen aan misselijkheid en braken. Pyridoxine (vitamine B6) is een vitamine. Het wordt gegeven omdat een gebrek aan pyridoxine in het lichaam ook een factor kan zijn bij het veroorzaken van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van doxylamine en pyridoxine wordt geleverd als tablet met vertraagde afgifte (laat de medicatie in de darm vrij om uit te stellen wanneer de medicatie begint te werken) en als tablet met verlengde afgifte (langwerkende werking) om via de mond in te nemen. Het wordt meestal op een lege maag ingenomen (minstens 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd) met een vol glas water. In het begin zal uw arts u gewoonlijk vertellen om het eenmaal per dag voor het slapengaan in te nemen. Als uw symptomen van misselijkheid en braken niet beter zijn, kan uw arts u vertellen om de tablet met vertraagde afgifte twee of drie keer per dag in te nemen, of de tablet met verlengde afgifte twee keer per dag. . Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem doxylamine en pyridoxine precies zoals voorgeschreven.

Slik de tabletten met verlengde afgifte en vertraagde afgifte heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Vraag uw apotheker of arts om een kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u doxylamine en pyridoxine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor doxylamine (Unisom); pyridoxine (vitamine B6); andere antihistaminica, waaronder carboxamide (Arbinoxa), clemastine (Tavist),

dimenhydrinaat (Dramamine), difenhydramine (Benadryl) en promethazine (Phenergan); eventuele andere medicijnen; of een van de ingrediënten in tabletten met vertraagde afgifte of verlengde afgifte van doxylamine en pyridoxine. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.

- vertel het uw arts als u een monoamineoxidase (MAO) -remmer gebruikt, zoals isocarboxazid (Marplan), fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) en tranylcypromine (Parnate). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen doxylamine en pyridoxine te gebruiken als u een of meer van deze medicijnen gebruikt.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: medicijnen tegen verkoudheid, hooikoorts of allergieën; medicijnen voor depressie; spierverslappers; verdovende medicijnen tegen pijn; kalmerende middelen; slaap medicijnen; en kalmeringsmiddelen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- vertel het uw arts als u astma of andere ademhalingsproblemen heeft of ooit heeft gehad, verhoogde druk in het oog of glaucoom (een aandoening waarbij verhoogde druk in het oog kan leiden tot geleidelijk verlies van gezichtsvermogen), zweren, darmblokkade of moeite met urineren .
- vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van doxylamine en pyridoxine.
- u moet weten dat doxylamine en pyridoxine u slaperig kunnen maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.
- vermijd alcoholische dranken of producten die alcohol bevatten tijdens het gebruik van doxylamine en pyridoxine. Alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid veroorzaakt door dit medicijn.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem niet meer dan vier tabletten met vertraagde afgifte of meer dan twee tabletten met verlengde afgifte per dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Doxylamine en pyridoxine kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- droge mond, neus en keel
- slaperigheid
- hoofdpijn
- rusteloosheid
- duizeligheid
- spierpijn of zwakte

- buikpijn
- constipatie
- diarree
- uitslag

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, stop dan met het innemen van doxylamine en pyridoxine en neem onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

- zichtproblemen
- wazig zien
- verwijde pupillen (zwarte cirkels in het midden van de ogen)
- moeite met urineren of pijnlijk urineren
- snelle, onregelmatige of bonzende hartslag
- kortademigheid
- verwardheid
- toevallen

Doxylamine en pyridoxine kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Als uw medicatie is geleverd met een busje met droogmiddel (klein busje dat een stof bevat die vocht opneemt om het medicijn droog te houden), laat u het busje in de fles.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, altijd de veiligheidsdoppen vergrendelen

en plaats de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats - een die omhoog en weg is en buiten hun zicht en bereik.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

- rusteloosheid
- droge mond
- verwijde pupillen (zwarte cirkels in het midden van de ogen)
- slaperigheid of slaperigheid
- duizeligheid
- verwardheid
- toevallen
- snelle, onregelmatige of bonzende hartslag
- moeite met urineren of pijnlijk urineren
- spierpijn of zwakte
- ophoping van vocht in het lichaam
- donkerrode of colakleurige urine

wat moet ik nog meer weten?

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Bonjesta®
- Diclegis®

Laatst herzien - 15-02-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022