

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Doxylamine at Pyridoxine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

Doxylamine at Pyridoxine

binibigkas bilang (dox il' a meen) (peer i dox' een)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang kombinasyon ng doxylamine at pyridoxine ay ginagamit upang gamutin ang pagduduwal at pagsusuka sa mga buntis na kababaihan na ang mga sintomas ay hindi bumuti pagkatapos baguhin ang kanilang diyeta o gumamit ng iba pang mga paggamot na hindi gamot. Ang Doxylamine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antihistamines. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng ilang natural na sangkap sa katawan na maaaring mag-ambag sa pagduduwal at pagsusuka. Pyridoxine (bitamina B6) ay isang bitamina. Ito ay ibinibigay dahil ang kakulangan ng pyridoxine sa katawan ay maaari ding maging salik sa sanhi ng pagduduwal at pagsusuka sa panahon ng pagbubuntis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang kombinasyon ng doxylamine at pyridoxine ay nagmumula bilang isang delayed-release (naglalabas ng gamot sa bituka upang maantala kung kailan magsisimulang gumana ang gamot) at bilang isang extended-release (longacting) na tablet na iinumina sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha nang walang laman ang tiyan (hindi bababa sa 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain) na may isang buong baso ng tubig. Sa una, karaniwang sasabihin sa iyo ng iyong doktor na inumin ito isang beses sa isang araw bago matulog. Kung ang iyong mga sintomas ng pagduduwal at pagsusuka ay hindi mas mahusay, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na inumin ang naantalang-release na tablet dalawa o tatlong beses sa isang araw, o ang extended-release na tablet dalawang beses sa isang araw. . Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kumuha ng doxylamine at pyridoxine nang eksakto tulad ng itinuro.

Lunukin nang buo ang extended-release at delayed-release na mga tablet; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng doxylamine at pyridoxine,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa doxylamine (Unisom); pyridoxine (bitamina B6); iba pang mga gamot na antihistamine kabilang ang carboxamide (Arbinox), clemastine (Tavist),

dimenhydrinate (Dramamine), diphenhydramine (Benadryl), at promethazine (Phenergan); anumang iba pang mga gamot; o alinman sa mga sangkap sa doxylamine at pyridoxine delayed-release o extended-release na mga tablet. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng monoamine oxidase (MAO) inhibitor tulad ng isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at tranylcypromine (Parnate). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng doxylamine at pyridoxine kung umiinom ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: mga gamot para sa sipon, hay fever, o allergy; mga gamot para sa depresyon; mga relaxant ng kalamnan; mga gamot na narkotiko para sa sakit; pampakalma; mga gamot sa pagtulog; at mga tranquilizer. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng hika o iba pang mga problema sa paghinga, tumaas na presyon sa mata o glaucoma (isang kondisyon kung saan ang pagtaas ng presyon sa mata ay maaaring humantong sa unti-unting pagkawala ng paningin), mga ulser, pagbabara ng bituka, o kahirapan sa pag-ihi .
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpapasuso habang umiinom ng doxylamine at pyridoxine.
- dapat mong malaman na ang doxylamine at pyridoxine ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.
- iwasan ang mga inuming may alkohol o mga produktong naglalaman ng alkohol habang umiinom ng doxylamine at pyridoxine. Ang alkohol ay maaaring makadagdag sa pag-aantok na dulot ng gamot na ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag uminom ng higit sa apat na delayed-release na tablet o higit sa dalawang extended-release na tablet sa isang araw. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang doxylamine at pyridoxine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- tuyong bibig, ilong, at lalamunan
- antok
- sakit ng ulo
- pagkabalisa
- pagkahilo
- pananakit o panghihina ng kalamnan

- sakit sa tyan
- pagtitibi
- pagtatae
- pantal

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, itigil ang pag-inom ng doxylamine at pyridoxine at tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

- mga problema sa paningin
- malabong paningin
- dilat na mga mag-aaral (mga itim na bilog sa gitna ng mga mata)
- hirap umihi o masakit na pag-ihing
- mabilis, hindi regular, o tumitibok na tibok ng puso
- kinakapos na paghinga
- pagkalito
- mga seizure

Ang doxylamine at pyridoxine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Kung ang iyong gamot ay may kasamang desiccant canister (maliit na canister na naglalaman ng substance na sumisipsip ng moisture para panatilihin tuyo ang gamot), iwanan ang canister sa bote.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga safety cap

at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon – isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

- pagkabalisa
- tuyong bibig
- dilat na mga mag-aaral (mga itim na bilog sa gitna ng mga mata)
- antok o antok
- pagkahilo
- pagkalito
- mga seizure
- mabilis, hindi regular, o tumitibok na tibok ng puso
- hirap umihi o masakit na pag-ihing
- pananakit o panghihina ng kalamnan
- akumulasyon ng likido sa katawan
- maitim na pula o kulay cola na ihi

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Bonjesta®
- Diclegis®

Huling Binago - 02/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022