

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Doxylamine et Pyridoxine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613045.html>

Doxylamine et Pyridoxine

prononcé comme (dox il' a meen) (peer i dox' een)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'association doxylamine et pyridoxine est utilisée pour traiter les nausées et les vomissements chez les femmes enceintes dont les symptômes ne se sont pas améliorés après avoir modifié leur alimentation ou utilisé d'autres traitements non médicamenteux. La doxylamine appartient à une classe de médicaments appelés antihistaminiques. Il agit en bloquant l'action de certaines substances naturelles dans le corps qui peuvent contribuer aux nausées et aux vomissements. Pyridoxine (vitamine B6) est une vitamine. Il est administré parce qu'un manque de pyridoxine dans le corps peut également être un facteur provoquant des nausées et des vomissements pendant la grossesse.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La combinaison de doxylamine et de pyridoxine se présente sous la forme d'un comprimé à libération retardée (libère le médicament dans l'intestin pour retarder le moment où le médicament commencera à agir) et d'un comprimé à libération prolongée (à action prolongée) à prendre par voie orale. Il est généralement pris à jeun (au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas) avec un grand verre d'eau. Au début, votre médecin vous dira généralement de le prendre une fois par jour au coucher. Si vos symptômes de nausées et de vomissements ne s'améliorent pas, votre médecin peut vous demander de prendre le comprimé à libération retardée deux ou trois fois par jour ou le comprimé à libération prolongée deux fois par jour. . Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la doxylamine et la pyridoxine exactement comme indiqué.

Avalez les comprimés à libération prolongée et à libération retardée entiers ; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la doxylamine et de la pyridoxine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la doxylamine (Unisom); pyridoxine (vitamine B6); d'autres médicaments antihistaminiques, y compris le carboxamide (Arbinoxa), la clémastine (Tavist),

dimenhhydrinate (Dramamine), diphenhydramine (Benadryl) et prométhazine (Phenergan); tout autre médicament; ou l'un des ingrédients des comprimés à libération retardée ou à libération prolongée de doxylamine et de pyridoxine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

- informez votre médecin si vous prenez un inhibiteur de la monoamine oxydase (MAO) tel que l'isocarboxazide (Marplan), la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) et la tranylcypromine (Parnate). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de doxylamine et de pyridoxine si vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : médicaments contre le rhume, le rhume des foins ou les allergies ; médicaments pour la dépression; relaxants musculaires; médicaments narcotiques pour la douleur; sédatifs; somnifères; et tranquillisants. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou d'autres problèmes respiratoires, une pression accrue dans l'œil ou un glaucome (une condition dans laquelle une pression accrue dans l'œil peut entraîner une perte progressive de la vision), des ulcères, une occlusion intestinale ou des difficultés à uriner .
- informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez de la doxylamine et de la pyridoxine.
- vous devez savoir que la doxylamine et la pyridoxine peuvent vous rendre somnolent. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.
- évitez les boissons alcoolisées ou les produits contenant de l'alcool pendant que vous prenez de la doxylamine et de la pyridoxine. L'alcool peut augmenter la somnolence causée par ce médicament.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas plus de quatre comprimés à libération retardée ou plus de deux comprimés à libération prolongée par jour. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La doxylamine et la pyridoxine peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- bouche, nez et gorge secs
- somnolence
- mal de crâne
- agitation
- vertiges
- douleur ou faiblesse musculaire

- Douleur d'estomac
- constipation
- diarrhée
- éruption

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez de prendre de la doxylamine et de la pyridoxine et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- problèmes de vue
- Vision floue
- pupilles dilatées (cercles noirs au centre des yeux)
- difficulté à uriner ou miction douloureuse
- rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant
- essoufflement
- confusion
- convulsions

La doxylamine et la pyridoxine peuvent provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Si votre médicament est fourni avec une cartouche déshydratante (petite cartouche qui contient une substance qui absorbe l'humidité pour garder le médicament au sec), laissez la cartouche dans le flacon.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité

et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- agitation
- bouche sèche
- pupilles dilatées (cercles noirs au centre des yeux)
- somnolence ou somnolence
- vertiges
- confusion
- convulsions
- rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant
- difficulté à uriner ou miction douloureuse
- douleur ou faiblesse musculaire
- accumulation de liquide dans le corps
- urine rouge foncé ou couleur cola

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Bonjesta®
- Diclégis®

Dernière révision - 15/02/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022