Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603001.html

Dutasterid

uttalas som (doo tas' teer ide)

hur är denna medicin utskriven?

Dutasterid används ensamt eller tillsammans med annan medicin (tamsulosin [Flomax]) för att behandla godartad prostatahyperplasi (BPH; förstoring av prostatakörteln). Dutasterid används för att behandla symtom på BPH och kan minska risken för att utveckla akut urinretention (plötslig oförmåga att urinera). Dutasterid kan också minska risken för att prostatakirurgi kommer att behövas. Dutasterid är i en klass av läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. Det fungerar genom att blockera produktionen av ett naturligt ämne som förstorar prostatan.

hur ska detta läkemedel användas?

Dutasteride kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat. Ta dutasterid vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta dutasterid exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna hela; öppna inte tugga eller krossa dem.

Dina symtom kan förbättras efter att du har tagit dutasterid i 3 månader, men det kan ta 6 månader eller längre för dig att se full nytta av dutasterid. Tala med din läkare om hur du mår under din behandling.

Dutasteride kan kontrollera dina symtom men kommer inte att bota ditt tillstånd. Fortsätt att ta dutasterid även om du mår bra. Sluta inte ta dutasterid utan att tala med din läkare.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar dutasterid,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot dutasterid, finasterid (Propecia, Proscar), andra mediciner eller något av ingredienserna i dutasteridkapslar. Fråga din läkare eller kontrollera tillverkarens patientinformation för en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: svampdödande medel som ketokonazol (Nizoral); cimetidin (Tagamet); ciprofloxacin (Cipro); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); ritonavir, (Norvir), troleandomycin (TAO); och verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom eller prostatacancer.
- du bör veta att dutasterid endast är avsett för män. Kvinnor, särskilt de som är eller kan bli gravida, bör inte hantera dutasteridkapslar. Att röra vid innehållet i kapslarna kan skada fostret. Om en kvinna som är gravid eller som kan bli gravid av misstag vidrör läckande kapslar, ska hon omedelbart tvätta området med tvål och vatten och ringa sin läkare.
- du bör veta att du inte ska donera blod medan du tar dutasterid och i 6 månader efter att du slutat ta denna medicin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du kommer ihåg den glömda dosen samma dag, ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det. Men om du inte kommer ihåg det förrän nästa dag, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser på en dag eller ta en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Dutasterid kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- oförmåga att ha eller bibehålla en erektion
- minskad sexlust
- problem med utlösning

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk hjälp:

- förändringar i brösten såsom ökad storlek, knölar, smärta eller flytningar från bröstvårtan
- svullnad i ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att andas eller svälja
- peeling hud

Att ta dutasterid kan öka risken att du utvecklar höggradig prostatacancer (en typ av prostatacancer som sprider sig och växer snabbare än andra typer av prostatacancer). Tala med din läkare om riskerna med att ta dutasterid.

Dutasterid kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Dutasteridkapslar som förvaras vid höga temperaturer kan bli deformerade eller missfärgade. Kassera alla kapslar som är deformerade, missfärgade eller läckande.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på dutasterid.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar dutasterid.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.

kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Avodart®

randnamn på kombinationsprodukter

- Jalyn®(innehåller dutasterid, tamsulosin)

Senast reviderad - 2016-02-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists ®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022