Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 0.5mg/0.4mg Sert Kapsüller

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı almaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyun.

- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.
- Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Dişlere geçirmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
- Herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşun. Bu broşürde listelenmeyen olası yan etkiler de buna dahildir. 4. bölüme bakın.
- Bu ilacın tam adı Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 0.5mg/0.4mgHardCapsules'tur, ancak bu broşürde Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsüller olarak anılacaktır.

Bu broşürde neler var?

1 **Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller nedir ve ne için kullanılırlar**
2 **Dutasterid/ TamsulosinHidroklorür Kapsülleri almadan önce bilmeniz gerekenler**
3 **Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller Olası yan etkiler nasıl alınır?**
4 **Dutasterid/TamsulosinHidroklorürKapsüllerPaketin içeriği ve diğer bilgiler nasıl saklanır**
5
6

1 Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller nedir ve ne için kullanılırlar

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller prostat büyümesi olan erkekleri tedavi etmek için kullanılır.(iyi huylu prostat hiperplazisi) - dihidrotestosteron adı verilen bir hormonun çok fazla üretilmesinin neden olduğu prostat bezinin kanserli olmayan bir büyümesi.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller, dutasterid ve tamsulosin adı verilen iki farklı ilacın bir kombinasyonudur. Dutasteride, adı verilen bir ilaç grubuna aittir.**5-alfa redüktaz inhibitörleri**ve tamsulosin adı verilen bir ilaç grubuna aittir.**alfa blokerler**.

Prostat büyüdükçe idrar yapma zorluğu ve sık sık tuvalete gitme ihtiyacı gibi üriner problemlere yol açabilir. Ayrıca idrar akışının daha yavaş ve daha az kuvvetli olmasına neden olabilir. Tedavi edilmezse idrar akışınızın tamamen bloke olma riski vardır (**akutüriner retansiyon**).Bu, acil tıbbi tedavi gerektirir. Bazen prostat bezinin boyutunu çıkarmak veya küçültmek için ameliyat gerekir.

Dutasterid, prostatı küçültmeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olan dihidrotestosteron adı verilen bir hormonun üretimini azaltır. Bu, akut üriner retansiyon riskini ve ameliyat ihtiyacını azaltır. Tamsulosin, prostat bezinizdeki kasları gevşeterek etki ederek idrarın atılmasını kolaylaştırır ve semptomlarınızı hızla düzeltir. .

2 Dutasterid/ TamsulosinHidroklorür Kapsülleri almadan önce bilmeniz gerekenler

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri almayın

- eğer bir**Kadın**(çünkü**bu ilaç sadece**)
- eğer bir**18 yaşından küçük çocuk veya ergen**
- Eğer öyleysen**alerjik todutasterid**, başka**5-alfa redüktaz inhibitörleri**, **tamsulosin**, **soya**,**fıstık**veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine (bölüm 6'da listelenmiştir)
- varsa**düşük kan basıncı**baş dönmesi, sersemlik veya baygınlık hissetmenize neden olan (**ortostatik hipotansiyon**)
- eğer varsa**şiddetli karaciğer hastalığı**.

Bunlardan herhangi birinin sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız,**alma** Doktorunuza danışana kadar bu ilacı

Uyarılar ve önlemler

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini almadan önce doktorunuzla konuşunuz:

- Bazı klinik çalışmalarda, dutasterid ve tamsulosin gibi bir alfa bloker adı verilen başka bir ilaç alan hasta, yalnızca tozasterid veya yalnızca bir alfa bloker alan hastalardan daha fazla kalp yetmezliği yaşadı. Kalp yetmezliği, kalbinizin olması gerektiği gibi kan pompalamadığı anlamına gelir.
- **Doktorunuzun karaciğer sorunları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın**. Karaciğerinizi etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa, Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri kullanırken bazı ek kontrollere ihtiyacınız olabilir.
- **Böbreğinizle ilgili ciddi sorunlarınız olup olmadığını doktorunuzun bilmesini sağlayın.**
- **Katarakt (bulutlu lens) ameliyatı**. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuz ameliyattan bir süre önce Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsül almayı kesmenizi isteyebilir. Ameliyattan önce göz uzmanınıza Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsül veya tamsulosin kullandığınızı (veya daha önce almış olmanız gerektiğini) söyleyiniz. Operasyonunuz sırasında komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için uygun önlemleri almak.
- **Kadınlar, çocuklar ve ergenler**sızan Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri ele almamalıdır, çünkü aktif bileşen cilt yoluyla emilebilir.**Etkilenen alanı hemen yıkayın**cilt ile teması halinde sabun ve su ile
- **cinsel ilişki sırasındakondom kullanın**. Dutasterid, Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri alan menide bulunmuştur. Eşiniz hamileyse veya hamileyse dutasterid amale bebeğin normal gelişimini etkileyebileceğinden onu meninize maruz bırakmaktan kaçınmalısınız. Dutasterid'in sperm sayısını, meni hacmini ve sperm hareketliliğini azalttığı gösterilmiştir. Bu doğurganlığınızı azaltabilir.
- **Dutasterid/TamsulosinHidroklorürKapsüller için bir kan testini etkiler** Bazen prostat kanserini saptamak için kullanılan PSA (prostata özgü antijen). Doktorunuz bu etkinin farkında olmalıdır ve yine de testi prostat kanserini saptamak için kullanabilir. PSA için kan testi yaptırıyorsanız, doktorunuza Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsül kullandığınızı söyleyin.**Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsül kullanan erkekler, PSA'larını düzenli olarak test ettirmelidir.**.
- Prostat kanseri riski yüksek olan erkeklerle ilgili bir klinik çalışmada, Dutasterid alan erkeklerde**prostat kanserinin ciddi formudaha sık**Dutasterid almayan erkeklerden daha fazladır. Dutasterid'in prostat kanserinin bu ciddi formu üzerindeki etkisi net değildir.
- **Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllermeme büyümesine ve hassasiyetine neden olabilir**. Bu zahmetli hale gelirse veya fark ederseniz **göğüs topakları**veya**meme başı boşalması**Bu değişiklikler meme kanseri gibi ciddi bir durumun belirtileri olabileceğinden doktorunuzla konuşmalısınız.

Doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules kullanımına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa.

Diğer ilaçlar ve Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alabiliyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini bu ilaçlarla birlikte almayınız:

- **diğer alfa blokerler**(genişlemiş prostat veya yüksek tansiyon için)

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerin şu ilaçlarla kullanılması önerilmez:

- **ketokonazol**(mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır)

Bazı ilaçlar Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller ile reaksiyona girebilir ve yan etkilere sahip olmanızı daha olası hale getirebilir. Bu ilaçlar şunları içerir:

- **PDE5 inhibitörleri**(vardenafil, sildenafil sitrat ve tadalafil gibi ereksiyonun sağlanmasına yardımcı olmak için kullanılır)
- **verapamil ordiltiazem**(yüksek tansiyon için)
- **ritonaviror indinavir (**HIV için)
- **itrakonazol veya ketakonazol**(mantar enfeksiyonları için)
- **nefazodon**(bir antidepresan)
- **simetidin**(mide ülseri için)
- **varfarin**(kan pıhtılaşması için)
- **eritromisin**(enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik)
- **paroksetin**(bir antidepresan)
- **terbinafin**(mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır)
- **diklofenak**(ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılır)

doktoruna söyle Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleryiyecek ve içecek ile

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller her gün aynı yemekten 30 dakika sonra alınmalıdır.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller**kadınlar tarafından alınmamalıdır**.

Hamile kadınlar (veya belki) sızan kapsülleri tutmamalıdır.

Dutasterid deri yoluyla emilir ve amalebaby'nin normal gelişimini etkileyebilir. Bu, hamileliğin ilk 16 haftasında özel bir risktir.

Doktorunuzla iletişime geçin Hamile bir kadının Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri ile temas etmesi durumunda tavsiye için.

Sonraki sütunun devamı

Sayfanın devamı

cinsel ilişki sırasındakondom kullanın. Dutasterid, Dutasterid/Tamsulosin alan semende bulunmuştur. Partneriniz hamileyse veya hamile olabilirse, onu sperminize maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Dutasterid/Tamsulosin'in sperm sayısını, meni hacmini ve sperm hareketini azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle erkek doğurganlığı azalabilir.

Makineleri sürme ve kullanma

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller bazı kişilerin başını döndürebilir, bu nedenle güvenli bir şekilde araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Donotsürücü veyaişletim makineleribu şekilde etkilenirseniz.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller şunları içerir:

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller, alerjik reaksiyonlara neden olabilen günbatımı sarısı FCF (E110) renklendirici maddeyi içerir.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller soyadan lesitin içerir. Yerfıstığı veya soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller, kapsül başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

3 Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız..

Düzenli olarak almazsanız, PSA seviyelerinizin izlenmesi etkilenebilir. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır

Önerilen doz, her gün aynı öğünden 30 dakika sonra, günde bir kez alınan bir kapsüldür.

Nasıl alınır

Kapsülleri suyla yutun. Kapsülü kırarak çiğnemeyiniz. Kapsüllerin içeriğiyle temas, ağzınızı veya boğazınızı ağrıtabilir.

Almanız gerekenden daha fazla Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsül alırsanız

Çok fazla Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsül kullanıyorsanız, tavsiye almak için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini kullanmayı unutursanız

Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Sadece bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri tavsiye etmeden durdurmayın

Önce doktorunuzla konuşmadan Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri kullanmayı bırakmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4 Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak herkes onları almayabilir..

Alerjik reaksiyon

Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerebilir:

- **deri döküntüsü**(kaşıntılı olabilir)
- **kurdeşen**(ısırgan otu döküntüsü gibi)
- **göz kapaklarının, yüzün, dudakların, kolların veya bacakların şişmesi**

Derhal doktorunuza başvurun Bu belirtilerden herhangi birini alırsanız ve**Dutasteride/ TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini kullanmayı bırakın.**

Baş dönmesi, sersemlik ve bayılma

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller baş dönmesine, baş dönmesine ve nadir durumlarda bayılmaya neden olabilir. Özellikle gece uyanırsanız, bu ilacın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar, yatar veya oturur pozisyondan oturur veya ayakta dururken dikkatli olun. Tedavi sırasında herhangi bir zamanda baş dönmesi veya sersemlik hissederseniz,**semptomlar geçene kadar oturun veya uzanın**.

Ciddi cilt reaksiyonları

Ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri şunları içerebilir:

- **özellikle ağız, burun, gözler ve genital bölge çevresinde kabarcıklar ve soyulmalarla birlikte yaygın bir döküntü**(Stevens-Johnson sendromu). **Derhal doktorla iletişime geçin**Bu semptomları alırsanız ve**Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini kullanmayı bırakmak.**

yaygın yan etkiler(10 kişiden 1'ini etkileyebilir)

- iktidarsızlık (**ereksiyon elde edemez veya sürdüremez**)*
- cinsel dürtüde azalma (**libido**)*
- seks sırasında salınan meni miktarında azalma gibi boşalma ile ilgili zorluk*
- göğüs büyümesi veya hassasiyeti (**jinekomasti**)
- baş dönmesi.

* Az sayıda insanda bu olaylardan bazıları, Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri kullanmayı bıraktıktan sonra da devam edebilir.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir)

- kalp yetmezliği (kalbin kanı vücuda pompalamada etkinliği azalır. Nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve ayak bileklerinde ve bacaklarında şişme gibi belirtiler olabilir)
- ayakta dururken düşük kan basıncı
- hızlı nabız (**çarpıntı**)
- kabızlık, ishal, kusma, hasta hissetme (bulantı)
- zayıflık veya güç kaybı
- baş ağrısı
- kaşıntılı, tıkalı veya burun akıntısı (**rinit**)
- deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntı
- saç dökülmesi (genellikle vücuttan) veya saç uzaması.

Nadir yan etkiler(1000 kişiden 1'ini etkileyebilir)

- göz kapaklarının, yüzün, dudakların, kolların veya bacakların şişmesi (**anjiyoödem**)
- bayılma.

Çok seyrekyan etkiler(10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)

- penisin kalıcı ağrılı ereksiyon (**priapizm)**
- ciddi cilt reaksiyonları (**Stevens-Johnson sendromu**)

Diğer yan etkiler

Diğer yan etkiler az sayıda erkekte meydana gelmiştir, ancak bunların kesin sıklıkları bilinmemektedir (eldeki verilerden sıklık tahmin edilememektedir):

- anormal veya hızlı kalp atışı (**aritmiveya taşikardiveya atriyal fibrilasyon**)
- nefes darlığı (**dispne**)
- depresyon
- testislerinizde ağrı ve şişlik
- burun kanaması
- şiddetli deri döküntüsü
- görüşteki değişiklikler (**bulanık görme veya görme bozukluğu**)
- kuru ağız

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle konuşun. Bu broşürde listelenmeyen olası yan etkiler de buna dahildir.YellowCard SchemeWeb sitesi aracılığıyla da yan etkileri doğrudan bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play'de veya AppleApp Store'da MHRAYellowCard'ı arayın. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5 Nasıl MağazaDutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsüller

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra karton şişe veya blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayın. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

HPDE şişeleri için, ilk açıldıktan sonra 30 kapsüllük paketler için 6 haftadan fazla ve 90 kapsüllük paketler için 18 haftadan uzun kullanmayınız.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini 30°C'nin üzerinde saklamayın.

Herhangi bir ilacı atıksu veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorun. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6 Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerin içeriği

- Etkin maddeler dutasterid ve tamsulosinhidroklorürdür. Her kapsül 0,5 mg dutasterid ve 0,4 mg tamsulosinhidroklorür içerir.
- Diğer bileşenler (yardımcı maddeler):
- sert kapsül kabuğu: hipromelloz, karagenan (E407), potasyumklorür, titanyumdioksit (E171), demiroksit kırmızısı (E172), gün batımı sarısıFCF (E110).
- Sert kapsülün içinde: gliserolmonokaprilokaprat ve butilhidroksitoluen (E321), jelatin, gliserol, titanyumdioksit (E171), demir oksit sarısı (E172), trigliseritler (orta zincirli), lesitin (soya yağı içerebilir) (E322), selüloz mikrokristalin, metakrilik asit- etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyon %30, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1), magnezyum stearat, sodyumhidroksit, triasetin, talk, titanyumdioksit (E171).

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller neye benziyor ve paketin içeriği

Bu ilaç, dikdörtgen şeklinde, yaklaşık 24 mm uzunluğunda, kahverengi gövdeli ve turuncu kapaklı sert kapsüllerdir.

HDPE şişelere veya alüminyum/alüminyum kabarcıklara yerleştirilmiş 30 kapsüllük ambalajlarda mevcutturlar.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

AccordHealthcare Limited, SageHouse , 319 Pinner Road, NorthHarrow Middlesex, HA1 4HF, Birleşik Krallık

Üretici firma

SAGMANUFACTURINGS.LU , Crta. NI, Km36 28750 SanAgustindeGuadalix Madrid , İspanya

Bu broşür en son Ağustos 2019'da revize edilmiştir..

Daha büyük metinli bir broşür isterseniz, lütfen 01271385257 ile iletişime geçin.

Sonraki sütunun devamı