

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Edaravonă injectabilă

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617027.html>

Edaravone injectabil pronunțat ca (e dar' a vone)

de ce este prescris acest medicament?

Edaravona injectabilă este utilizată pentru a trata scleroza laterală amiotrofică (ALS, boala Lou Gehrig; o afecțiune în care nervii care controlează mișcarea mușchilor mor încet, determinând micșorarea și slăbirea mușchilor). Injecția cu edaravonă face parte dintr-o clasă de medicamente numite antioxidanți. Poate funcționa pentru a încetini afectarea nervilor asociată cu agravarea simptomelor ALS.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu Edaravone vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie injectată intravenos (într-o venă) timp de 60 de minute de către un profesionist din domeniul sănătății într-un cabinet medical sau o unitate medicală. Inițial, se administrează de obicei o dată pe zi în primele 14 zile ale unui ciclu de 28 de zile. După primul ciclu, se administrează o dată pe zi în primele 10 zile ale unui ciclu de 28 de zile. Medicul dumneavoastră va decide cât de des trebuie să primiți edaravonă în funcție de răspunsul organismului dumneavoastră la acest medicament.

Edaravone poate provoca reacții grave în timpul sau după ce vi se administrează perfuzia. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întrerupă tratamentul dacă prezentați anumite reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație, dificultăți de respirație, tuse, leșin, înroșire, mâncărime, erupții cutanate, urticarie, umflare a gâtului, limbii sau feței, senzație de constrângere a gâtului sau dificultăți la înghițire. Este important să spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu injecție cu edaravonă. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau primiți imediat asistență medicală de urgență dacă aveți oricare dintre aceste simptome după ce părăsiți cabinetul medicului sau unitatea medicală.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu edaravonă,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la edaravonă, la orice alte medicamente, bisulfid de sodiu sau la oricare dintre ingredientele din injecția cu edaravonă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată astm.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți edaravonă, sunați la medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi edaravonă, sunați-vă medicul cât mai curând posibil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injectia cu edaravonă poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- vânătăi
- dificultate la mers
- durere de cap
- erupție cutanată roșie, mâncărime sau solzoasă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele din secțiunea CUM, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

- dificultăți de respirație, constricție în piept, respirație șuierătoare și tuse (în special la persoanele cu astm bronșic)

Injectia cu edaravonă poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poissonhelp.org/help> [<https://www.poissonhelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Întrebați-vă farmacistul dacă aveți întrebări despre injecția cu edaravonă.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Radicava®

Ultima revizuire - 15.06.2017

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022