

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Эдаравон инъекции

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617027.html>.

Эдаравон инъекции

произносится как (e dar' a vone)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция эдаравона используется для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС, болезнь Лу Герига; состояние, при котором нервы, контролирующее движение мышц, медленно умирают, вызывая сокращение и ослабление мышц). Инъекция эдаравона относится к классу препаратов, называемых антиоксидантами. Это может помочь замедлить повреждение нервов, связанное с ухудшением симптомов БАС.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция эдаравона представляет собой раствор (жидкость), который вводится внутривенно (в вену) в течение 60 минут медицинским работником в кабинете врача или в медицинском учреждении. Первоначально его обычно назначают один раз в день в течение первых 14 дней 28-дневного цикла. После первого цикла его дают один раз в день в течение первых 10 дней 28-дневного цикла. Ваш врач решит, как часто вы должны получать эдаравон, исходя из реакции вашего организма на это лекарство.

Эдаравон может вызвать серьезные реакции во время или после инфузии. Вашему врачу может потребоваться прекратить лечение, если вы испытываете определенные побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов: свистящее дыхание или затрудненное дыхание, одышка, кашель, обморок, покраснение, зуд, сыпь, крапивница, отек горла, языка или лица, стеснение в горле или затрудненное глотание. Для вас важно сообщить своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения инъекцией эдаравона. Немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов после того, как вы покинете кабинет врача или медицинское учреждение.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед получением инъекции эдаравона,

- Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эдаравон, какие-либо другие лекарства, бисульфит натрия или любой из ингредиентов инъекции эдаравона. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.
- Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была астма.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время приема эдаравона, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите прием эдаравона, позвоните своему врачу как можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция эдаравона может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

- кровоподтеки
- трудности при ходьбе
- Головная боль
- красная, зудящая или чешуйчатая сыпь

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или симптомы, описанные в разделе КАК, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

- затрудненное дыхание, стеснение в груди, свистящее дыхание и кашель (особенно у людей с астмой)

Инъекция эдаравона может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

в экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poissonhelp.org/help> [<https://www.poissonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Спросите своего фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы об инъекции эдаравона.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

бренд имени

- Радикава®

Последняя редакция — 15.06.2017

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности](#)

АНФС®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.