

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Edaravone Injection

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617027.html>

Edaravon Injektion

uttalas som (e dar' a vone)

hur är denna medicin utskriven?

Edaravone-injektion används för att behandla amyotrofisk lateralskleros (ALS, Lou Gehrigs sjukdom; ett tillstånd där nerverna som kontrollerar muskelrörelser långsamt dör, vilket gör att musklerna krymper och försvagas).

Edaravoninjektion är i en klass av mediciner som kallas antioxidanter. Det kan fungera för att bromsa nervskadorna i samband med försämringen av ALS-symtom.

hur ska detta läkemedel användas?

Edaravone-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) under 60 minuter av en sjukvårdspersonal på en läkarmottagning eller medicinsk anläggning. Initialt ges det vanligtvis en gång om dagen under de första 14 dagarna av en 28-dagarscykel. Efter den första cykeln ges det en gång om dagen under de första 10 dagarna av en 28-dagarscykel. Din läkare kommer att bestämma hur ofta du ska få edaravon baserat på din kropps svar på denna medicin.

Edaravone kan orsaka allvarliga reaktioner under eller efter att du fått din infusion. Din läkare kan behöva avbryta behandlingen om du upplever vissa biverkningar. Tala om för din läkare om du upplever något av följande symtom: väsande andning eller andningssvårigheter, andnöd, hosta, svimning, rodnad, klåda, utslag, nässelfeber, svullnad i halsen, tungan eller ansiktet, täthet i halsen eller svårigheter att svälja. Det är viktigt att du berättar för din läkare hur du mår under din behandling med edaravoninjektion. Ring din läkare omedelbart eller få omedelbar akut läkarvård om du upplever något av dessa symtom efter att du lämnat din läkares kontor eller medicinska anläggning.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerar för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får edaravoninjektion,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot edaravon, andra mediciner, natriumbisulfid eller något av innehållsämnen i edaravoninjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller har haft astma.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du får edaravone, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få edaravone, ring din läkare så snart som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Edaravoninjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- blåmärken
- svårigheter att gå
- huvudvärk
- röda, kliande eller fjällande utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de i avsnittet HUR, ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- andningssvårigheter, tryck över bröstet, väsande andning och hosta (särskilt hos personer med astma)

Edaravoninjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du får denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Fråga din apotekspersonal om du har några frågor om edaravoninjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Radicava®

Senast reviderad - 2017-06-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022