

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Инжекция с Едаравон

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617027.html>

Инжектиране на едаравон

произнася се като (e dar' a vone)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на Едаравон се използва за лечение на амиотрофична латерална склероза (ALS, болест на Лу Гериг; състояние, при което нервите, които контролират движението на мускулите, бавно умират, което води до свиване и отслабване на мускулите). Инжектирането на Edaravone е в клас лекарства, наречени антиоксиданти. Може да работи за забавяне на увреждането на нервите, свързано с влошаването на симптомите на ALS.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на Edaravone идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира интравенозно (във вена) в продължение на 60 минути от медицински специалист в лекарски кабинет или медицинско заведение. Първоначално обикновено се дава веднъж дневно през първите 14 дни от 28-дневния цикъл. След първия цикъл се прилага веднъж дневно през първите 10 дни от 28-дневен цикъл. Вашият лекар ще реши колко често трябва да приемате едаравон въз основа на реакцията на тялото ви към това лекарство.

Едаравон може да причини сериозни реакции по време на или след инфузията. Вашият лекар може да се наложи да спре лечението Ви, ако получите определени нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако почувствате някой от следните симптоми: хрипове или затруднено дишане, задух, кашлица, припадък, зачервяване, сърбеж, обрив, копривна треска, подуване на гърлото, езика или лицето, стягане в гърлото или затруднено преглъщане. Важно е да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с инжекция с едаравон. Обадете се незабавно на Вашия лекар или потърсете незабавна спешна медицинска помощ, ако изпитате някой от тези симптоми, след като напуснете лекарския кабинет или медицинското заведение.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с едаравон,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към едаравон, други лекарства, натриев бисулфит или някоя от съставките в инжекцията с едаравон. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и хранителни добавки, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.
- уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали астма.
- уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато приемате едаравон, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща за получаване на едаравон, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на Edaravone може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

- натъртване
- затруднено ходене
- главоболие
- червен, сърбящ или люещ се обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези в раздела КАК, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

- затруднено дишане, стягане в гърдите, хрипове и кашлица (особено при хора с астма)

Инжектирането на Edaravone може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

в случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Попитайте Вашия фармацевт, ако имате някакви въпроси относно инжектирането на едаравон.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

- Радицава®

Последна редакция - 15.06.2017 г

[Научете как да цитирате тази страница](#)



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

АНФС®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г