

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Edaravon-injectie

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617027.html>

Edaravon-injectie

uitgesproken als (e dar' a vone)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Edaravone-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS, de ziekte van Lou Gehrig; een aandoening waarbij de zenuwen die de spierbeweging regelen langzaam afsterven, waardoor de spieren krimpen en verzwakken).

Edaravone-injectie zit in een klasse medicijnen die antioxidanten worden genoemd. Het kan werken om de zenuwbeschadiging te vertragen die gepaard gaat met de verergering van ALS-symptomen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Edaravone-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 60 minuten intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in een spreekkamer of medische instelling. Aanvankelijk wordt het gewoonlijk eenmaal per dag toegediend gedurende de eerste 14 dagen van een cyclus van 28 dagen. Na de eerste cyclus wordt het eenmaal per dag toegediend gedurende de eerste 10 dagen van een cyclus van 28 dagen. Uw arts zal beslissen hoe vaak u edaravone krijgt op basis van de reactie van uw lichaam op dit medicijn.

Edaravone kan ernstige reacties veroorzaken tijdens of nadat u uw infusie heeft gekregen. Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet stopzetten als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Vertel het uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart: piepende ademhaling of moeite met ademen, kortademigheid, hoesten, flauwvallen, blozen, jeuk, huiduitslag, netelroos, zwelling van de keel, tong of gezicht, beklemmende keel of moeite met slikken. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met edaravone-injectie. Bel onmiddellijk uw arts of roep onmiddellijk medische hulp in als u een van deze symptomen ervaart nadat u de spreekkamer of medische faciliteit heeft verlaten.

Vraag uw apotheker of arts om een kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u edaravone-injectie krijgt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor edaravone, andere medicijnen, natriumbisulfiet of een van de bestanddelen van de edaravone-injectie. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.

- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- vertel het uw arts als u astma heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u edaravone krijgt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een afspraak mist om edaravone te krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Edaravon-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- blauwe plekken
- moeite met lopen
- hoofdpijn
- rode, jeukende of schilferige uitslag

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of die in de HOE-sectie staan, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

- moeite met ademen, beklemd gevoel op de borst, piepende ademhaling en hoesten (vooral bij mensen met astma)

Edaravon-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Vraag uw apotheker als u vragen heeft over injectie met edaravone.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Radicava®

Laatst herzien - 15-06-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022