Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618028.html

Efavirenz, Lamivudine, at Tenofovir

binibigkas bilang (e fa veer' ens)(la miv' ue deen)(te noe' fo veer)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Efavirenz, lamivudine at tenofovir ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang impeksyon sa hepatitis B virus (HBV; isang patuloy na impeksyon sa atay). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o sa tingin mo ay maaaring mayroon kang HBV. Maaaring subukan ka ng iyong doktor upang makita kung mayroon kang HBV bago mo simulan ang iyong paggamot na may efavirenz, lamivudine at tenofovir. Kung mayroon kang HBV at umiinom ka ng efavirenz, lamivudine at tenofovir, maaaring biglang lumala ang iyong kondisyon kapag huminto ka sa pag-inom ng efavirenz, lamivudine at tenofovir. Susuriin ka ng iyong doktor at regular na mag-uutos ng mga lab test sa loob ng ilang buwan pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng efavirenz, lamivudine at tenofovir upang makita kung lumala ang iyong HBV.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri bago at sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa efavirenz, lamivudine, at tenofovir.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang kumbinasyon ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay ginagamit upang gamutin ang HIV sa mga matatanda at bata. Ang Efavirenz ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs). Ang Lamivudine at tenofovir ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na nucleoside at nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs). Gumagana sila sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng HIV sa katawan. Bagama't ang efavirenz, lamivudine at tenofovir ay hindi magpapagaling sa HIV, ang mga gamot na ito ay maaaring bawasan ang iyong pagkakataong magkaroon ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) at mga sakit na nauugnay sa HIV tulad ng malubhang impeksyon o kanser. Ang pag-inom ng mga gamot na ito kasama ng pagsasanay sa mas ligtas na pakikipagtalik at paggawa ng iba pang mga pagbabago sa pamumuhay ay maaaring mabawasan ang panganib na makakuha o maipasa ang HIV virus sa ibang mga tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang kumbinasyon ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay nagmumula bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito isang beses sa isang araw nang walang laman ang tiyan (hindi bababa sa 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain). Uminom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir sa halos parehong oras araw-araw. Ang pag-inom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir sa oras ng pagtulog ay maaaring gawing mas hindi nakakaabala ang ilang mga side effect. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin

efavirenz, lamivudine, at tenofovir nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pag-inom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung hihinto ka sa pag-inom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir kahit sa maikling panahon, o laktawan ang mga dosis, ang virus ay maaaring maging lumalaban sa mga gamot at maaaring mas mahirap gamutin.

Ang kumbinasyon ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay magagamit sa mga pangalan ng tatak ng Symfi at Symfi Lo. Ang dalawang brand na ito ay naglalaman ng magkaibang halaga ng parehong gamot, at hindi maaaring palitan para sa isa't isa. Tiyaking nakatanggap ka lamang ng tatak ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir na inireseta para sa iyo ng iyong doktor. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa uri ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir na ibinigay sa iyo.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa efavirenz, lamivudine, tenofovir, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa efavirenz, lamivudine, at tenofovir tablet. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- dapat mong malaman na ang efavirenz, lamivudine at tenofovir ay magagamit din nang isa-isa na may mga brand name na Sustiva, Epivir, Epivir-HBV (ginagamit upang gamutin ang hepatitis B), Vemlidy (ginagamit upang gamutin ang hepatitis B), at Viread, pati na rin ang kumbinasyon. kasama ng iba pang mga gamot na may mga brand name na Atripla, Biktarvy, Combivir, Complera, Descovy, Epzicom, Genvoya, Odefsey, Stribild, Symfi, Triumeq, Trizivir, at Truvada. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na ito upang matiyak na hindi ka makakatanggap ng parehong gamot nang dalawang beses.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng elbasvir/grazoprevir (Zepatier). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir kung iniinom mo ang gamot na ito.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: acyclovir (Sitavig, Zovirax); adefovir (Hepsera); aminoglycosides tulad ng gentamicin; artemether/lumefantine (Coartem); aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory medication (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); atorvastatin (Lipitor, sa Caduet); atovaquone/proguanil (Malarone); bupropion (Forfivo, Wellbutrin, Zyban, iba pa); calcium channel blockers tulad ng diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, iba pa), felodipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia), at verapamil (Calan, Verelan, sa Tarka); carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, iba pa); cidofovir; cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ganciclovir (Cytovene); glecaprevir/pibrentasvir (Mavynet); itraconazole (Sporanox, Onmel); ketoconazole; ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni); macrolide antibiotics tulad ng clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac); methadone (Dolophine, Methadose); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, sa Phenytek); posaconazole (Noxafil); pravastatin (Pravachol); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, sa Rifamate, Rifater); sertraline (Zoloft); simeprevir (Olyslo); simvastatin (Flolopid, Zocor, rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, sa Rifamate, Rifater); sertraline (Zoloft); simeprevir (Olyslo); simvastatin (Flolopid, Zocor, rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, sa Rifamate, Rifater); sertraline (Zoloft); simeprevir (Olyslo); simvastatin (Flolopid, Zocor,

sa Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir/velpatasvir (Epculsa); sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi); sorbitol o mga gamot na pinatamis ng sorbitol; tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); trimethoprim (Primsol, sa Bactrim, Septra); valacyclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); at warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa efavirenz, lamivudine at tenofovir, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

- sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA, o kung mayroon ka o nakaranas na ng matagal na pagitan ng QT (isang bihirang problema sa puso na maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso, nanghihina, o biglaang pagkamatay), mababang antas ng potassium o magnesium sa iyong dugo, mga problema sa buto kabilang ang osteoporosis (isang kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging manipis at mahina at madaling mabali) o mga bali ng buto, mga seizure, hepatitis C o iba pang sakit sa atay, o sakit sa bato. Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka o nakainom na ng maraming alak, gumamit o gumamit na ng mga gamot sa kalye, labis na paggamit o labis na gumamit ng mga iniresetang gamot, o nagkaroon o nagkaroon ng depresyon o iba pang sakit sa isip. Para sa mga batang umiinom ng gamot na ito,
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, o planong magbuntis. Hindi ka dapat mabuntis sa panahon ng iyong paggamot. Kung maaari kang maging buntis, kailangan mong magkaroon ng negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito at gumamit ng mabisang birth control sa panahon ng iyong paggamot. Ang Efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay maaaring makagambala sa pagkilos ng mga hormonal contraceptive (birth control pills, patch, ring, implants, o injection), kaya hindi mo dapat gamitin ang mga ito bilang iyong tanging paraan ng birth control sa panahon ng iyong paggamot. Dapat kang gumamit ng barrier method ng birth control kasama ng anumang iba pang paraan ng birth control na pinili mo sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 12 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis. Hilingin sa iyong doktor na tulungan kang pumili ng paraan ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng efavirenz, lamivudine,
- hindi ka dapat magpasuso kung ikaw ay nahawaan ng HIV o umiinom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir.
- dapat mong malaman na ang iyong taba sa katawan ay maaaring tumaas o lumipat sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, tulad ng iyong itaas na likod, leeg ("buffalo hump"), mga suso, at sa paligid ng iyong tiyan. Maaari mong mapansin ang pagkawala ng taba ng katawan mula sa iyong mukha, binti, at braso.
- dapat mong malaman na habang umiinom ka ng mga gamot upang gamutin ang impeksyon sa HIV, ang iyong immune system ay maaaring lumakas at magsimulang labanan ang iba pang mga impeksiyon na nasa iyong katawan na o maging sanhi ng iba pang mga kondisyon na mangyari. Ito ay maaaring magdulot sa iyo na magkaroon ng mga sintomas ng mga impeksyon o kundisyong iyon. Kung mayroon kang bago o lumalalang sintomas sa panahon ng iyong paggamot na may efavirenz, lamivudine, at tenofovir siguraduhing sabihin sa iyong doktor.
- dapat mong malaman na ang efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay maaaring makapagdulot sa iyo ng pagkahilo, pag-aantok, hindi makapag-concentrate, nahihirapang makatulog o manatiling tulog, magkaroon ng hindi pangkaraniwang panaginip o magkaroon ng mga guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral). Ang mga side effect na ito ay karaniwang nawawala 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos simulan ang paggamot. Ang mga side effect na ito ay maaaring mas malala kung umiinom ka rin ng alak, o umiinom ng ilang partikular na gamot gaya ng mga antidepressant, mga gamot para sa pagkabalisa, mga gamot para sa sakit sa pag-iisip, mga gamot para sa mga seizure, mga pampakalma, mga pampatulog, o mga tranquilizer. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.
- dapat mong malaman na ang efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong pag-iisip, pag-uugali, o kalusugan ng isip. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas habang umiinom ka ng efavirenz, lamivudine at tenofovir: depresyon, pag-iisip tungkol sa pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito, galit o agresibong pag-uugali, guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na nagagawa hindi umiiral), kakaibang pag-iisip, pagkawala ng ugnayan sa katotohanan, o hindi makagalaw o makapagsalita

karaniwan. Tiyaking alam ng iyong pamilya kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan nila ang iyong doktor kung hindi mo magawang magpagamot nang mag-isa.

- dapat mong malaman na ang efavirenz ay maaaring magdulot ng potensyal na malubhang problema sa nervous system, kabilang ang encephalopathy (isang seryoso at potensyal na nakamamatay na sakit ng utak) buwan o taon pagkatapos mong unang uminom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir. Bagama't maaaring magsimula ang mga problema sa nervous system pagkatapos mong uminom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir sa loob ng ilang panahon, mahalagang malaman mo at ng iyong doktor na maaaring sanhi ito ng efavirenz. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga problema sa balanse o koordinasyon, pagkalito, mga problema sa memorya, at iba pang mga paghihirap na dulot ng abnormal na paggana ng utak, anumang oras sa panahon ng iyong paggamot na may efavirenz, lamivudine, at tenofovir. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- sakit ng ulo
- sakit sa tiyan
- pagtatae
- heartburn
- pagduduwal
- pagsusuka
- pananakit ng likod, kasukasuan, o kalamnan
- kakulangan ng enerhiya
- nanunuot, nasusunog, o masakit na pakiramdam sa mga braso o binti

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa mga nasa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

- pamamantal, hirap sa paghinga o paglunok, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata, pamamalat
- pantal, pagbabalat o paltos ng balat, pangangati, lagnat, pamamaga ng mukha, mga sugat sa bibig, pula o namamaga ang mga mata
- hindi pangkaraniwang pananakit ng kalamnan, hirap sa paghinga, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, panlalamig lalo na sa iyong mga braso o binti, pagkahilo o pagkahilo, matinding pagkapagod o panghihina, mabilis o hindi regular na tibok ng puso

- paninilaw ng balat o mata, maitim na ihi, matingkad na dumi, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, pananakit, pananakit, o pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, namamaga ang tiyan, matinding pagkapagod, panghihina, pagkalito

- nabawasan ang pag-ihi, pamamaga ng mga binti
- pananakit ng buto, pananakit ng mga braso o binti, bali ng buto, pananakit o panghihina ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan
- mga seizure
- pakiramdam nanghihina, mahina ang ulo, o nahihilo; hindi regular o mabilis na tibok ng puso
- patuloy na pananakit na nagsisimula sa kaliwang itaas o gitna ng tiyan ngunit maaaring kumalat sa likod, pagduduwal, pagsusuka

Ang Efavirenz, lamivudine, at tenofovir ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

- pagkahilo
- hirap mag-concentrate

- pagkaantok
- nahihirapang makatulog o manatiling tulog
- hindi pangkaraniwang panaginip
- nakikita o naririnig ang mga bagay na wala doon
- paggalaw ng kalamnan o pagyanig na hindi mo makontrol

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Panatilihin ang isang supply ng efavirenz, lamivudine, at tenofovir sa kamay. Huwag maghintay hanggang maubusan ka ng gamot upang mapunan muli ang iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Symfi®
- Symfi Lo®

mga pangalan

- EFV, 3TC at TDF

Huling Binago - 04/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022