

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Empagliflozine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614043.html>

Empagliflozine

prononcé comme (em'' pa gli floe' zin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'empagliflozine est utilisée avec un régime alimentaire et de l'exercice, et parfois avec d'autres médicaments, pour abaisser la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 (état dans lequel la glycémie est trop élevée parce que le corps ne produit pas ou n'utilise pas normalement l'insuline). L'empagliflozine est également utilisée pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou de décès chez les personnes atteintes de diabète de type 2 ainsi que de maladies cardiaques et vasculaires. L'empagliflozine est également utilisée chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès dû à une maladie cardiaque et vasculaire. L'empagliflozine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Il abaisse la glycémie en obligeant les reins à se débarrasser de plus de glucose dans l'urine.

Au fil du temps, les personnes atteintes de diabète et d'hyperglycémie peuvent développer des complications graves ou potentiellement mortelles, notamment des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes rénaux, des lésions nerveuses et des problèmes oculaires. Prendre des médicaments, apporter des changements à votre mode de vie (par exemple, régime alimentaire, exercice, arrêter de fumer) et vérifier régulièrement votre glycémie peuvent aider à gérer votre diabète et à améliorer votre santé. Cette thérapie peut également réduire vos risques d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications liées au diabète telles qu'une insuffisance rénale, des lésions nerveuses (engourdissement, jambes ou pieds froids ; diminution de la capacité sexuelle chez les hommes et les femmes), des problèmes oculaires, y compris des changements ou perte de vision, ou maladie des gencives. Votre médecin et d'autres professionnels de la santé vous parleront de la meilleure façon de gérer votre diabète.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'empagliflozine se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une fois par jour le matin avec ou sans nourriture. Prenez l'empagliflozine à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'empagliflozine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin peut vous prescrire une faible dose d'empagliflozine et augmenter votre dose si nécessaire.

L'empagliflozine aide à contrôler votre état, mais ne le guérit pas. Continuez à prendre l'empagliflozine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre l'empagliflozine sans en parler avec votre médecin.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre l'empagliflozine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'empagliflozine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés d'empagliflozine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) tels que le bédazépril (Lotensin, dans Lotrel), le captopril, l'énalapril (Epaned, Vasotec, dans Vaseretic), le fosinopril, le lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, dans Zestoretic), moexipril, périndopril (dans Prestalia), quinapril (Accupril, dans Accuretic, dans Quinaretic), ramipril (Altace) et trandolapril ; les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine tels que l'azilsartan (Edarbi, dans Edarbyclor), le candésartan (Atacand, dans Atacand HCT), l'éprosartan (Teveten), l'irbésartan (Avapro, dans Avalide), le losartan (Cozaar, dans Hyzaar), l'olmésartan (Benicar, dans Azor, dans Benicar HCT, dans Tribenzor), le telmisartan (Micardis, dans Micardis HCT, dans Twynsta), et valsartan (Diovan, dans Diovan HCT, dans Exforge) ; l'aspirine et d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'ibuprofène (Advil, Motrin) et le naproxène (Aleve, Naprosyn); digoxine (Lanoxine); diurétiques ("pilules d'eau"); ou de l'insuline ou des médicaments oraux pour le diabète tels que le glimépiride (Amaryl, dans Duetact), le glipizide (Glucotrol), le glyburide (DiaBeta, Glynase) et le tolbutamide. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase) et tolbutamide. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous êtes sous dialyse. Votre médecin peut vous dire de ne pas prendre d'empagliflozine.
- informez votre médecin si vous buvez régulièrement de l'alcool ou buvez parfois de grandes quantités d'alcool en peu de temps (consommation excessive d'alcool) ou si vous suivez un régime pauvre en sodium. Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des infections des voies urinaires ou des problèmes de miction, une pression artérielle basse, un taux de cholestérol élevé, une insuffisance cardiaque, une maladie pancréatique, y compris une pancréatite (gonflement du pancréas) ou si vous avez subi une intervention chirurgicale sur votre pancréas, des infections à levures, dans la région génitale, ou une maladie rénale ou hépatique. Si vous êtes un homme, informez votre médecin si vous n'avez jamais été circoncis. Dites à votre médecin si vous mangez moins en raison d'une maladie, d'une intervention chirurgicale ou d'un changement dans votre régime alimentaire ou si vous ne pouvez pas manger ou boire normalement en raison de nausées, de vomissements, de diarrhée ou si vous vous déshydratez après avoir été trop longtemps au soleil. .
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. N'allaites pas pendant que vous prenez de l'empagliflozine. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de l'empagliflozine, appelez votre médecin.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de l'empagliflozine.
- l'alcool peut entraîner une modification de la glycémie. Demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez de la canagliflozine.
- vous devez savoir que l'empagliflozine peut provoquer des étourdissements, des étourdissements et des évanouissements lorsque vous vous levez trop rapidement d'une position allongée. Si vous avez ce problème, appelez votre médecin. Ce problème est plus fréquent lorsque vous commencez à prendre de l'empagliflozine. Pour éviter ce problème, sortez lentement du lit, en posant vos pieds sur le sol pendant quelques minutes avant de vous lever
- demandez à votre médecin quoi faire si vous tombez malade, développez une infection ou de la fièvre, ressentez un stress inhabituel ou êtes blessé. Ces conditions peuvent affecter votre glycémie et la quantité d'empagliflozine que vous

peut avoir besoin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Assurez-vous de suivre toutes les recommandations d'exercice et diététiques faites par votre médecin ou votre diététiste. Il est important d'avoir une alimentation saine et de faire de l'exercice régulièrement. Suivez les instructions de votre médecin concernant la consommation de suffisamment de liquides tout au long de la journée pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Ce médicament peut entraîner des modifications de votre glycémie. Vous devez connaître les symptômes de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie et savoir quoi faire si vous présentez ces symptômes.

L'empagliflozine peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- uriner beaucoup, y compris la nuit
- augmentation de la soif

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin :

- miction fréquente, urgente, brûlante ou douloureuse
- urine trouble, rouge, rose ou brune
- douleurs pelviennes ou dorsales
- (chez les femmes) odeur vaginale, pertes vaginales blanches ou jaunâtres (peuvent être grumeleuses ou ressembler à du fromage cottage) ou démangeaisons vaginales
- (chez les hommes) rougeur, démangeaisons ou gonflement du pénis ; éruption cutanée sur le pénis; écoulement nauséabond du pénis; ou douleur dans la peau autour du pénis
- se sentir fatigué, faible ou mal à l'aise; avec fièvre et douleur, sensibilité, rougeur et gonflement des organes génitaux ou de la zone située entre les organes génitaux et le rectum
- symptômes pseudo-grippaux

Si vous présentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de prendre l'empagliflozine et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- éruption
- urticaire
- démangeaison
- difficulté à avaler ou à respirer

- gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, de la bouche ou des yeux
- enrouement

Si vous présentez l'un des symptômes suivants d'acidocétose, arrêtez de prendre l'empagliflozine et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence. Si possible, vérifiez la présence de corps cétoniques dans vos urines si vous présentez ces symptômes, même si votre glycémie est inférieure à 250 mg/dL :

- nausée
- vomissement
- douleur dans la région de l'estomac
- fatigue
- difficulté à respirer

L'empagliflozine peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

En cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée,

a eu une crise d'épilepsie, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillé, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre glycémie doit être contrôlée régulièrement pour déterminer votre réponse à l'empagliflozine. Votre médecin prescrira d'autres tests de laboratoire, y compris l'hémoglobine glycosylée (HbA1c), pour vérifier votre réponse à l'empagliflozine. Votre médecin vous indiquera également comment vérifier votre réponse à ce médicament en mesurant votre glycémie à domicile. Suivez attentivement ces instructions.

Avant tout test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous prenez de l'empagliflozine. En raison de la façon dont ce médicament agit, votre urine peut être testée positive pour le glucose.

Vous devez toujours porter un bracelet d'identification du diabète pour être sûr d'obtenir un traitement approprié en cas d'urgence.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Jardiance®
- Glyxambi®(en tant que produit combiné contenant de l'Empagliflozine et de la Linagliptine)
- Synjardie®(en tant que produit combiné contenant de l'Empagliflozine et de la Metformine)

Dernière révision - 15/10/2021

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022