TITLE - EMPAGLIFLOZIN + LINAGLIPTIN / GLYXAMBI MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

abcd

Lilly

empagliflozin/linagliptin

Gliksambi®10 mg/5 mg film kaplı tabletler
Gliksambi®25 mg/5 mg film kaplı tabletler

315786

Gliksambi®10 mg/5 mg film kaplı tabletler
Gliksambi®25 mg/5 mg film kaplı tabletler

empagliflozin/linagliptin

abcd

Lilly

Paket broşürü: Hasta için bilgiler

Gliksambi®10 mg/5 mg film kaplı tabletler
Glyxambi®25 mg/5 mg film kaplı tabletler

empagliflozin/linagliptin

abcd

Lilly

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
- Herhangi bir yan etki yaşarsanız doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?

1. Glyxambi nedir ve ne için kullanılır?
2. Glyxambi'yi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Glyxambi nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Glyxambi nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Glyxambi nedir ve ne için kullanılır?

Glyxambi nedir?
Glyxambi, empagliflozin ve linagliptin adı verilen iki aktif madde içerir. Her biri "oral antidiyabetikler" adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Bunlar, tip 2 diyabeti tedavi etmek için ağızdan alınan ilaçlardır.

Tip 2 diyabet nedir?
Tip 2 diyabet, hem genlerinizden hem de yaşam tarzınızdan kaynaklanan bir durumdur. Tip 2 diyabetiniz varsa, pankreasınız kanınızdaki glikoz seviyesini kontrol etmek için yeterli insülin üretemeyebilir ve vücudunuz kendi insülinini etkili bir şekilde kullanamaz. Bu, kanınızda yüksek şeker seviyelerine neden olur ve bu da kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve uzuvlarınızda zayıf kan dolaşımı gibi tıbbi sorunlara yol açabilir.

Glyxambi nasıl çalışır?
Empagliflozin, sodyum glukoz co-transporter-2 (SGLT2) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. inhibitörler. SGLT2 proteinini bloke ederek çalışır. böbreklerinde. Bu, idrarınızda kan şekerinin (glikoz) atılmasına neden olur. Linagliptin, pankreasın kan şekeri düzeylerini düşürmek için daha fazla insülin üretmesini sağlayarak farklı bir şekilde çalışır. Bunu DPP-4 adlı bir proteini bloke ederek yapar. Böylece Glyxambi kanınızdaki şeker miktarını düşürür.

Glyxambi ne için kullanılır?
- Glyxambi, tip 2 diyabeti tedavi etmek için metformin ve/veya sülfonilüreye (SU) eklenir. 18 yaş ve üstü yetişkin hastalar empagliflozin ile kombinasyon halinde metformin ve/veya sülfonilüre ile tedavi edildiğinde veya linagliptin ile kombinasyon halinde metformin ve/veya sülfonilüre ile tedavi edildiğinde diyabet kontrol edilemez.

- Glyxambi, hem empagliflozin hem de linagliptin'i tek tablet olarak almaya alternatif olarak da kullanılabilir. Doz aşımından kaçınmak için, bu ilacı alıyorsanız empagliflozin ve linagliptin tabletlerini ayrı ayrı almaya devam etmeyin.

Diyet ve egzersiz planınıza doktorunuzun önerdiği şekilde devam etmeniz önemlidir, eczacı veya hemşire.

2. Glyxambi'yi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Glyxambi'yi almayın
- empagliflozin, linagliptin, diğer herhangi bir SGLT2 inhibitörüne (örn. dapagliflozin, kanagliflozin), diğer herhangi bir DPP-4 inhibitörüne (örn. sitagliptin, vildagliptin) veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine (bölüm 6'da listelenmiştir) alerjiniz varsa.

Uyarılar ve önlemler
Bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşun ve tedavi sırasında:
- Tip 1 diyabetiniz varsa (vücudunuz hiç insülin üretmiyorsa). Glyxambi, tip 1 diyabet tedavisinde kullanılmamalıdır.
- Hızlı kilo kaybı, mide bulantısı veya hasta olma, mide ağrısı, aşırı susama, hızlı ve derin nefes alma, kafa karışıklığı, olağandışı uyku hali veya yorgunluk, nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya farklı bir idrar veya ter kokusu. Bu semptomlar "diyabetik ketoasidoz"un bir işareti olabileceğinden hemen bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun - artan düzeylerden dolayı diyabetle karşılaşabileceğiniz nadir, ancak ciddi, bazen yaşamı tehdit eden bir sorun. Testlerde görülen, idrarınızda veya kanınızda "keton cisimleri". Diyabetik ketoasidoz geliştirme riski, uzun süreli açlık, aşırı alkol tüketimi, dehidratasyon veya insülin dozunda ani düşüşler veya büyük cerrahi veya ciddi hastalık nedeniyle daha yüksek insülin ihtiyacı ile artabilir.
- "Sülfonilüre" olarak bilinen diğer diyabet ilaçları (örn. glimepirid, glipizid) alıyorsanız ve/veya insülin kullanıyorsanız. Doktorunuz, bu ilaçları Glyxambi ile birlikte aldığınızda, kan şekerinizin çok düşük olmasını (hipoglisemi) önlemek için dozunuzu azaltmak isteyebilir.
- Pankreas hastalığınız varsa veya olduysa.
- Ciddi böbrek problemleriniz varsa. Doktorunuz günlük dozunuzu sınırlayabilir veya farklı bir ilaç almanızı isteyebilir (ayrıca bkz. bölüm 3, 'Glyxambi nasıl alınır').
- Ciddi karaciğer problemleriniz varsa. Doktorunuz farklı bir ilaç almanızı rica ederiz.
- dehidrasyon riski altındaysanız, örneğin:
  - Hastaysanız, ishal veya ateşiniz varsa veya yiyip içemiyorsanız
  - İdrar üretimini [diüretikler] artıran veya kan basıncını düşüren ilaçlar alıyorsanız
  - 75 yaşın üzerindeyseniz

  Olası belirtiler bölüm 4'te 'dehidrasyon' başlığı altında listelenmiştir. Doktorunuz, çok fazla vücut sıvısı kaybını önlemek için iyileşene kadar Glyxambi almayı bırakmanızı isteyebilir. Dehidrasyonu önlemenin yollarını sorun.

- 75 yaşında veya daha büyükseniz, Glyxambi almaya başlamamalısınız.
- Laboratuvar kan testlerinde görülen, kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin (hematokrit) oranında bir artış varsa (ayrıca bkz. bölüm 4, 'Olası yan etkiler').

Glyxambi tedavisi sırasında aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuzla iletişime geçin:
- Kalıcı, şiddetli mide ağrısı (karın ağrısı) gibi akut pankreatit semptomları geliştirirseniz. Olası belirtiler bölüm 4, 'Olası yan etkiler'de listelenmiştir. Doktorunuzun tedavinizi değiştirmesi gerekebilir.
- Ateşli böbrek veya idrar yolunda ciddi bir enfeksiyonunuz varsa. Doktorunuz sizden İyileşene kadar Glyxambi almayı bırakın.
- Deride kabarma ile karşılaşırsanız, bu büllöz pemfigoid adı verilen bir durumun işareti olabilir. Doktorunuz sizden Glyxambi'yi durdurmanızı isteyebilir.

Cinsel organlarda veya cinsel organlar ile anüs arasındaki bölgede ağrı, hassasiyet, kızarıklık veya şişme gibi bir semptom kombinasyonu geliştirirseniz, ateş veya genel olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal doktorunuzla konuşun. Bu semptomlar, perinenin nekrotizan fasiiti veya deri altındaki dokuyu tahrip eden Fournier kangreni adı verilen nadir fakat ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Fournier'in kangreni derhal tedavi edilmelidir.

Ayak Bakımı
Tüm diyabetik hastalarda olduğu gibi, ayaklarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve sağlık uzmanınız tarafından verilen ayak bakımıyla ilgili diğer tavsiyelere uymanız önemlidir.

Böbrek fonksiyonu
Glyxambi ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli olarak doktorunuz böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol edecektir.

idrar şekeri
Bu ilacın çalışma şekli nedeniyle, bu ilacı alırken idrarınız şeker için pozitif test edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Bu ilaç, bu hastalarda çalışılmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Glyxambi
Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söylemelisiniz:
- insülin veya sülfonilüre gibi diğer anti-diyabetik ilaçlar. Doktorunuz, kan şekeri seviyenizin çok düşmesini önlemek için bu diğer ilaçların dozunu azaltmak isteyebilir.
- Vücudunuzdaki suyu uzaklaştırmak için kullanılan ilaçlar (diüretikler). Doktorunuz sizden Glyxambi almayı bırakmanızı isteyebilir.
- Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) gibi empagliflozin veya linagliptinin vücudunuzdaki yıkımını etkileyebilecek ilaçlar veya tedavi için kullanılan bazı ilaçlar nöbetler (karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin). Glyxambi'nin etkisi azalabilir.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Glyxambi'nin doğmamış çocuğa zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Önlem olarak, hamilelik sırasında bu ilacın kullanımından kaçınılması tercih edilir.

Glyxambi'nin aktif maddelerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Kullanmayın Bu ilacı emziriyorsanız.

Glyxambi'nin insanlarda doğurganlık üzerinde bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanma
Glyxambi'nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde küçük bir etkisi vardır.

Bu ilacı sülfonilüreler veya insülin ile birlikte almak kan şekerinizin çok düşmesine (hipoglisemi) neden olabilir, bu da titreme, terleme ve görme değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Bunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.
Glyxambi alırken semptomlar.

3. Glyxambi nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır
Olağan başlangıç dozu, günde bir kez 10 mg/5 mg Glyxambi (10 mg empagliflozin ve 5 mg linagliptin) film kaplı bir tablettir.

Doktorunuz, dozunuzu günde bir kez 25 mg/5 mg (25 mg empagliflozin ve 5 mg linagliptin) film kaplı bir tablete yükseltmeniz gerekip gerekmediğine karar verecektir. Halihazırda 25 mg empagliflozin ve 5 mg linagliptin'i ayrı tabletler olarak alıyor ve Glyxambi'ye geçiyorsanız, doğrudan Glyxambi 25 mg/5 mg ile başlayabilirsiniz.

Böbrek yetmezliği
Böbrek problemleriniz varsa doktorunuzla konuşun. Doktorunuz dozunuzu sınırlayabilir veya alternatif bir ilaç kullanmaya karar verebilir.

Hkalp yetmezliği
Tşiddetli epatik bozukluğunuz varsa doktorunuzla hkonuşun. Glyxambi tavsiye edilmez ve adoktorunuz alternatif bir ilaç kullanmaya karar mverebilir.

Eyaşlı
TBurada 5 yaş ve üzeri hastalarda çok az deneyim 7bulunmaktadır. 75 yaşın üzerindeki hastalarda nGlyxambi ile tedaviye başlanmalıdır.

Tbu ilacı almak
- Tableti bütün olarak suyla yutunuz. Glyxambi'yi
- yemek olsun veya olmasın alabilirsin. Tableti
- günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz. Ancak, her gün aynı saatte almaya çalışın. Bu, onu almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Ydoktorumuz Glyxambi'yi başka bir anti-diyabetik ilaçla abirlikte reçete edebilir. Sağlığınız için en iyi sonuçları aelde etmek için tüm ilaçları doktorunuzun önerdiği tşekilde almayı unutmayın.

Auygun beslenme ve egzersiz vücudunuzun kan şekerini idaha iyi kullanmasına yardımcı olur. Glyxambi kullanırken ddoktorunuzun önerdiği iet ve egzersiz programına bağlı dkalmanız önemlidir.

bGlyxambi kullanmanız gerekenden daha fla
Bir ilaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını alırsanız, ihemen bir doktorla konuşun veya bir hastaneye gidin. Almak to ilaç paketi seninle.

bGlyxambi'yi almayı unutursanız
WBir tablet almayı unutursanız yapmanız gereken, bir sonraki hdoza kadar geçen süreye bağlıdır:
- Bir sonraki dozunuza 12 saat veya daha fazla zaman varsa, hatırladığınız anda Glyxambi'yi alınız. Ardından bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.
- Bir sonraki doza 12 saatten az bir süre kaldıysa, unuttuğunuz dozu atlayın. Ardından bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.
- Unutulan bir dozu telafi etmek için bu ilacın çift dozunu almayınız.

Glyxambi almayı bırakırsanız
Önce doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmayınız. Glyxambi almayı bıraktığınızda kan şekeri seviyeleriniz yükselebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz hemen bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun:

Nadir görülen diyabetik ketoasidoz (1000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
Bunlar diyabetik ketoasidozun belirtileridir (bkz. aAyrıca bölüm 2, 'Uyarılar ve önlemler'):
– idrarınızda veya kanınızda artan “keton cisimleri” seviyeleri
- hızlı kilo kaybı
- hasta hissetmek veya hasta olmak
- karın ağrısı
- aşırı susuzluk
-hızlı ve derin nefes alma
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- olağandışı uyku hali veya yorgunluk
– nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya idrar veya terinizde farklı bir koku.

Bu, kan şekerinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. beml. Doktorunuz bu ilaçla tedavinizi geçici veya kalıcı olarak durdurmaya karar verebilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin:

Nadiren görülen alerjik reaksiyonlar (100 kişiden t1'ini etkileyebilir)
Bu ilaç, kurdeşen (ürtiker) ve ürtiker dahil ciddi olabilen alerjik reaksiyonlara neden olabilir. syüz, dudaklar, dil ve boğazda nefes alma veya yutma güçlüğüne neden olabilen anjiyoödem). (

bGörülen pankreas iltihabı (pankreatit), nadiren

Bu ilaç genellikle pankreatite neden olabilir. sSıklıkla sırtınıza kadar ulaşabilen kalıcı, şiddetli karın (mide) ağrısı nasıl olur?
ahasta hissetmek veya hasta olmak eşlik eder.
Doktorunuzun tedavinizi değiştirmesi gerekecektir.

LYaygın olarak görülen kan şekeri (hipoglisemi) (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
bGlyxambi'yi sülfonilüre veya nsulin gibi düşük kan cşekerine neden olabilecek başka bir ilaçla birlikte ialırsanız, çok düşük kan şekeri hipoglisemisi alma (riskiniz vardır). Çok düşük kan şekerinin belirtileri içerebilir:
- titreme, terleme, çok endişeli veya şaşkın hissetme, hızlı kalp atışı
- Aşırı açlık, baş ağrısı

Doktorunuz düşük kan şekeri düzeylerini nasıl tedavi edeceğinizi ve yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. Düşük kan şekeri semptomlarınız varsa, glikoz tabletleri, yüksek şekerli atıştırmalıklar yiyin veya meyve suyu için. Mümkünse kan şekerinizi ölçün ve dinlenin.

Sık görülen idrar yolu enfeksiyonu İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri şunlardır:
- idrar yaparken yanma hissi
- bulanık görünen idrar
- pelviste ağrı veya orta sırt ağrısı (böbrekler enfekte olduğunda)

İdrar yapma isteği veya daha sık idrara çıkma bu ilacın çalışma şeklinden kaynaklanabilir, ancak bunlar aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri de olabileceğinden, bu tür belirtilerde bir artış fark ederseniz, doktorunuza da başvurmalısınız.

Nadiren görülen vücut sıvısı kaybı (dehidrasyon) Dehidrasyon belirtileri spesifik değildir, ancak şunları içerebilir:
- olağandışı susuzluk
- ayakta dururken baş dönmesi veya baş dönmesi
- bayılma veya bilinç kaybı

Glyxambi alırken diğer yan etkiler:

Yaygın olarak görülen
- pamukçuk gibi genital maya enfeksiyonu
- iltihaplı burun veya boğaz (nazofarenjit)
- öksürük
- normalden daha fazla idrar yapma veya geçme ihtiyacı daha sık idrar
- kaşıntı
- deri döküntüsü
- artan kan enzimi amilaz
- artmış pankreas enzimi lipazı
- susuzluk

Nadiren görülen
- mesaneyi boşaltırken zorlanma veya ağrı
- Laboratuvar kan testleri, kan yağ seviyelerinde değişiklikler, kırmızı kan hücrelerinin miktarında artış (hematokritte artış) ve böbrek fonksiyonuyla ilgili değişiklikler (filtreleme hızında azalma ve kan kreatininde artış) gösterebilir.

Nadiren görülen
- ağızda ağrı

Sıklık bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
- ciltte kabarma (büllöz pemfigoid)
- perinenin nekrotizan fasiiti veya Fournier kangreni, cinsel organların veya cinsel organlar ile anüs arasındaki bölgenin ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Sarı Kart Şeması
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartını arayın

5. Glyxambi nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı, EXP'den sonra blister ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

Ambalajın hasarlı olduğunu veya kurcalanma belirtileri gösterdiğini fark ederseniz bu ilacı kullanmayınız.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Glyxambi'nin içeriği

Glyxambi 10 mg/5 mg film kaplı tablet

- Aktif maddeler empagliflozin ve linagliptin. Her film kaplı tablet, 10 mg empagliflozin ve 5 mg linagliptin içerir.
- Diğer malzemeler şunlardır:
  Tablet çekirdeği: mannitol (E421), önceden jelatinleştirilmiş nişasta (mısır), mısır nişastası, kopovidon, krospovidon, talk ve magnezyum stearat.
  Film kaplama : hipromelloz, mannitol (E421), talk, titanyum dioksit (E171), makrogol 6000 ve sarı demir oksit (E172).

Glyxambi 25 mg/5 mg film kaplı tablet

- Aktif maddeler empagliflozin ve linagliptindir. Her film kaplı tablet 25 mg empagliflozin ve 5 mg linagliptin.
- Diğer malzemeler şunlardır:
  Tablet çekirdeği: mannitol (E421), önceden jelatinleştirilmiş nişasta (mısır), mısır nişastası, kopovidon, krospovidon, talk ve magnezyum stearat.
  Film kaplama : hipromelloz, mannitol (E421), talk, titanyum dioksit (E171), makrogol 6000 ve demir oksit kırmızısı (E172).

Glyxambi'nin görünüşü ve paketin içeriği

Glyxambi 10 mg/5 mg film kaplı tabletler (tabletler) uçuk sarı, ark üçgen şeklinde, düz yüzlü ve eğimli kenarlıdır. Bir tarafta “10/5” var ve Diğer tarafta Boehringer Ingelheim logosu. Tabletin her bir kenarı 8 mm uzunluğundadır.

Glyxambi 25 mg/5 mg film kaplı tabletler (tabletler) uçuk pembe, ark üçgen şeklinde, düz yüzlü ve eğimli kenarlıdır. Bir tarafında “25/5”, diğer tarafında Boehringer Ingelheim logosu bulunur. Tabletin her bir kenarı 8 mm uzunluğundadır.

Glyxambi, PVC/PVDC/alüminyum delikli birim doz blisterlerde mevcuttur.

Paket boyutları 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 ve 100 x 1 film kaplı tabletlerdir.

Ülkenizde tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Almanya

Üretici firma

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 – 61
59320 Ennigerloh
Almanya

Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Boehringer Ingelheim Ltd.
Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly ve Limited Şirketi
Tel: +44 1256 315 000

Bu broşür en son 05/2021 tarihinde revize edilmiştir..