

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Emtricitabina y Tenofovir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612036.html>

Emtricitabina y Tenofovir

pronunciado como (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Emtricitabina y tenofovir no deben usarse para tratar la infección por el virus de la hepatitis B (VHB; una infección hepática en curso). Informe a su médico si tiene o cree que puede tener el VHB. Su médico puede hacerle una prueba para ver si tiene VHB antes de comenzar su tratamiento con emtricitabina y tenofovir. Si tiene VHB y toma emtricitabina y tenofovir, su condición puede empeorar repentinamente cuando deje de tomar emtricitabina y tenofovir. Su médico lo examinará y ordenará pruebas de laboratorio regularmente durante varios meses después de que deje de tomar emtricitabina y tenofovir para ver si su VHB ha empeorado.

Si está tomando emtricitabina y tenofovir para ayudar a prevenir que contraiga el VIH, su médico le hará una prueba para ver si tiene el VIH antes de comenzar su tratamiento. Informe a su médico si ha tenido alguno de los siguientes síntomas en el último mes o si tiene alguno de los siguientes síntomas mientras toma emtricitabina y tenofovir para ayudar a prevenir que contraiga el VIH: fiebre, cansancio, dolor articular o muscular, sarpullido, sudores, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, cuello hinchado o área de la ingle. Informe a su médico si cree que puede haber estado expuesto al VIH. Emtricitabina y tenofovir no siempre previenen el VIH. Su médico ordenará pruebas de VIH al menos cada 3 meses mientras esté tomando emtricitabina y tenofovir para ver si se ha infectado con el VIH. Emtricitabina y tenofovir solo deben usarse en combinación con otros medicamentos para tratar el VIH. Si emtricitabina y tenofovir se usan solos para tratar el VIH, su condición puede volverse más difícil de tratar.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas antes y durante su tratamiento para verificar la respuesta de su cuerpo a emtricitabina y tenofovir.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando comience el tratamiento con emtricitabina y tenofovir y cada vez que renueve su receta. Lea atentamente la información y consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda.

También puede visitar el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar emtricitabina y tenofovir.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La combinación de emtricitabina y tenofovir (Descovy, Truvada) se usa junto con otros medicamentos para tratar el VIH en adultos y niños que pesan al menos 37 libras (17 kg). La emtricitabina y el tenofovir (Truvada) también se usan junto con prácticas sexuales más seguras (p. ej., uso de condones) para reducir el riesgo de infección por VIH) en adultos y adolescentes de alto riesgo que pesan al menos 77 libras (35 kg). La emtricitabina y el tenofovir pertenecen a una clase de medicamentos llamados inhibidores nucleósidos y nucleótidos de la transcriptasa inversa (INTI). Actúan retardando la propagación del VIH en el cuerpo. Aunque la emtricitabina y el tenofovir no curarán el VIH, estos medicamentos pueden disminuir su probabilidad de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfermedades relacionadas con el VIH, como infecciones graves o cáncer.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La combinación de emtricitabina y tenofovir viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma, con o sin alimentos, una vez al día. Tome emtricitabina y tenofovir aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome emtricitabina y tenofovir exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Si está tomando emtricitabina y tenofovir (Truvada), su médico puede recetarle o recomendarle un suplemento de calcio y vitamina D para tomar durante su tratamiento. Debe tomar estos suplementos según las indicaciones de su médico.

Si su hijo está tomando emtricitabina y tenofovir (Truvada), trague la tableta entera. Informe a su médico si su hijo no puede tragar las tabletas.

Continúe tomando emtricitabina y tenofovir incluso si se siente bien. No deje de tomar emtricitabina y tenofovir sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar emtricitabina y tenofovir,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la emtricitabina y el tenofovir, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de emtricitabina y tenofovir. Pregúntele a su farmacéutico o consulte la Guía del medicamento para obtener una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: medicamentos antivirales como aciclovir (Sitavig, Zovirax), adefovir (Hepsera), cidofovir, ganciclovir (Cytovene), valaciclovir (Valtrex) y valganciclovir (Valcyte); aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve,

naprosina); gentamicina; otros medicamentos para el VIH o el SIDA, incluidos atazanavir (Reyataz, en Evotaz), darunavir (Prezista, en PrezcoBix), didanosina (Videx), emtricitabina (Emtriva, en Atripla, en Complera, en Genvoya, en Odefsey, en Stribild, en Truvada, otros), lamivudina (Epivir, en Combivir, en Epzicom, en Trizivir, otros), lopinavir y ritonavir (Kaletra), tenofovir (Viread, en Atripla, en Stribild, en Truvada, otros); y otros medicamentos para el VIH que contienen emtricitabina y tenofovir (Atripla, Complera, Emtriva, Genvoya, Odefsey, Stribild, Vemlidy, Viread). Si está tomando emtricitabina y tenofovir (Descovy), informe también a su médico si está tomando carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, otros), oxcarbazepina (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, fenitoína (Dilantin, Phenytek), rifabutina (Mycobutin), rifampicina (Rifadin, Rimactane, en Rifamate, en Rifater), rifapentina (Priftin), ritonavir (Norvir) y tipranavir (Aptivus). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

- dígame a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente hierba de San Juan. No debe tomar hierba de San Juan mientras esté tomando emtricitabina y tenofovir (Descovy).
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido las afecciones mencionadas en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, problemas óseos, incluida la osteoporosis (una afección en la que los huesos se adelgazan y debilitan y se rompen con facilidad) o fracturas óseas, cualquier tipo de infección que no desaparece. desaparecer o que va y viene, como tuberculosis (TB; un tipo de infección pulmonar) o citomegalovirus (CMV; una infección viral que puede causar síntomas en personas con sistemas inmunitarios débiles), o enfermedad hepática o renal.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma emtricitabina y tenofovir, llame a su médico. No debe amamantar si está infectada con el VIH o si está tomando emtricitabina y tenofovir.
- Debe saber que mientras toma medicamentos para tratar la infección por el VIH, su sistema inmunológico puede fortalecerse y comenzar a combatir otras infecciones que ya estaban en su cuerpo. Esto puede hacer que usted desarrolle síntomas de esas infecciones. Si tiene síntomas nuevos o que empeoran durante su tratamiento con emtricitabina y tenofovir, asegúrese de informar a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde ese día. No tome más de una dosis en un día. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La emtricitabina y el tenofovir pueden ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- depresión
- ansiedad
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- sueños inusuales
- dolor, ardor u hormigueo en las manos o los pies

- acidez
- pérdida de peso

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los enumerados en las secciones **ADVERTENCIA IMPORTANTE o **PRECAUCIONES ESPECIALES**, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:**

- hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- ronquera
- dificultad para tragar o respirar
- disminución de la micción
- micción difícil, dolorosa o frecuente
- dolor de huesos
- dolor en la parte superior derecha del estómago
- pérdida de apetito
- síntomas parecidos a la gripe
- sangrado o moretones inusuales
- debilidad
- orina de color amarillo oscuro o marrón
- heces de color claro
- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- sensación de frío, especialmente en los brazos o las piernas
- dolor muscular
- latidos del corazón rápidos o irregulares
- mareo
- aturdimiento
- dolor de estómago con náuseas y vómitos
- náuseas
- vómitos

La emtricitabina y el tenofovir pueden ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Tenga a mano un suministro de emtricitabina y tenofovir. No espere hasta que se le acabe el medicamento para volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres comerciales de productos combinados

- [descubrir®](#)(contiene emtricitabina, tenofovir)
- [Truvada®](#)(contiene emtricitabina, tenofovir)

Última revisión - 15/09/2020

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022