

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Emtricitabin och Tenofovir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612036.html>

Emtricitabin och Tenofovir

uttalas som (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

VIKTIG VARNING:

Emtricitabin och tenofovir ska inte användas för att behandla hepatit B-virusinfektion (HBV; en pågående leverinfektion). Tala om för din läkare om du har eller tror att du kan ha HBV. Din läkare kan testa dig för att se om du har HBV innan du påbörjar din behandling med emtricitabin och tenofovir. Om du har HBV och du tar emtricitabin och tenofovir, kan ditt tillstånd plötsligt förvärras när du slutar ta emtricitabin och tenofovir. Din läkare kommer att undersöka dig och beställa laborietester regelbundet i flera månader efter att du slutat ta emtricitabin och tenofovir för att se om ditt HBV har förvärrats.

Om du tar emtricitabin och tenofovir för att förhindra att du får hiv, kommer din läkare att testa dig för att se om du har hiv innan du påbörjar behandlingen. Tala om för din läkare om du har haft något av följande symtom under den senaste månaden eller om du har något av följande symtom när du tar emtricitabin och tenofovir för att förhindra att du får HIV: feber, trötthet, led- eller muskelsmär, hudutslag, nattsvettningar, kräkningar, diarré, huvudvärk, halsont, svullen nacke eller ljumskar. Tala om för din läkare om du tror att du kan ha blivit utsatt för hiv. Emtricitabin och tenofovir förebygger inte alltid hiv. Din läkare kommer att beställa hiv-tester minst var tredje månad medan du tar emtricitabin och tenofovir för att se om du har blivit smittad med hiv. Emtricitabin och tenofovir ska endast användas i kombination med andra läkemedel för att behandla HIV. Om emtricitabin och tenofovir används enbart för att behandla HIV, kan ditt tillstånd bli svårare att behandla.

Håll alla möten med din läkare och laboriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester före och under din behandling för att kontrollera din kropps svar på emtricitabin och tenofovir.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med emtricitabin och tenofovir och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta emtricitabin och tenofovir.

hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av emtricitabin och tenofovir (Descovy, Truvada) används tillsammans med andra mediciner för att behandla HIV hos vuxna och barn som väger minst 37 pund (17 kg). Emtricitabin och tenofovir (Truvada) används också tillsammans med säkrare sex (t.ex. kondom användning) för att minska risken för HIV-infektion) hos vuxna och tonåringar med hög risk som väger minst 77 pund (35 kg). Emtricitabin och tenofovir är i en klass av läkemedel som kallas nukleosid- och nukleotid-omvända transkriptashämmare (NRTI). De verkar genom att bromsa spridningen av HIV i kroppen. Även om emtricitabin och tenofovir inte kommer att bota HIV, kan dessa mediciner minska din chans att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och HIV-relaterade sjukdomar som allvarliga infektioner eller cancer.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av emtricitabin och tenofovir kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis, med eller utan mat, en gång om dagen. Ta emtricitabin och tenofovir vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta emtricitabin och tenofovir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du tar emtricitabin och tenofovir (Truvada), kan din läkare ordinera eller rekommendera ett kalcium- och D-vitamintillskott att ta under din behandling. Du bör ta dessa kosttillskott enligt anvisningar från din läkare.

Om ditt barn tar emtricitabin och tenofovir (Truvada), svälj tabletten hel. Tala om för din läkare om ditt barn inte kan svälja tablettarna.

Fortsätt att ta emtricitabin och tenofovir även om du mår bra. Sluta inte ta emtricitabin och tenofovir utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerar för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar emtricitabin och tenofovir,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot emtricitabin och tenofovir, andra läkemedel eller något av innehållsämnen i emtricitabin och tenofovir tablett. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antivirala läkemedel som acyklovir (Sitavig, Zovirax), adefovir (Hepsera), cidofovir, ganciklovir (Cytoven), valacyklovir (Valtrex) och valganciklovir (Valcyte); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve,

Naprosyn); gentamicin; andra mediciner mot HIV eller AIDS inklusive atazanavir (Reyataz, i Evotaz), darunavir (Prezista, i PrezcoBix), didanosin (Videx), emtricitabin (Emtriva, i Atripla, i Complera, i Genvoya, i Odefsey, i Stribild, i Truvada, andra), lamivudin (Epivir, i Combivir, i Epzicom, i Trizivir, andra), lopinavir och ritonavir (Kaletra), tenofovir (Viread, i Atripla, i Stribild, i Truvada, andra); och andra HIV-läkemedel som innehåller emtricitabin och tenofovir (Atripla, Complera, Emtriva, Genvoya, Odefsey, Stribild, Vemlidy, Viread). Om du tar emtricitabin och tenofovir (Descovy) berätta också för din läkare om du tar karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra), oxkarbazepin (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, fenytoin (Dilantin, Pheninytek), rifabutin (Mycobutin) , rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater), rifapentin (Priftin), ritonavir (Norvir) och tipranavir (Aptivus). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

- berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört. Du ska inte ta johannesört medan du tar emtricitabin och tenofovir (Descovy).
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING, benproblem inklusive osteoporos (ett tillstånd där benen blir tunna och svaga och lätt går sönder) eller benfrakturer, någon typ av infektion som inte försvinner bort eller som kommer och går såsom tuberkulos (TB; en typ av lunginfektion) eller cytomegalovirus (CMV; en virusinfektion som kan orsaka symtom hos personer med svagt immunförsvar), eller lever- eller njursjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar emtricitabin och tenofovir, kontakta din läkare. Du ska inte amma om du är infekterad med HIV eller om du tar emtricitabin och tenofovir.
- du bör veta att medan du tar mediciner för att behandla HIV-infektion, kan ditt immunförsvar bli starkare och börja bekämpa andra infektioner som redan fanns i din kropp. Detta kan få dig att utveckla symtom på dessa infektioner. Om du får nya eller förvärrade symtom under din behandling med emtricitabin och tenofovir, var noga med att berätta för din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det den dagen. Ta inte mer än en dos på en dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Emtricitabin och tenofovir kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- depression
- ångest
- svårt att somna eller att sova
- ovanliga drömmar
- smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter

- halsbränna
- viktminskning

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i avsnitten VIKTIG VARNING eller SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vristar eller underben
- heshet
- svårigheter att svälja eller andas
- minskad urinering
- svår, smärtsam eller frekvent urinering
- skelettsmärta
- smärta i övre högra delen av magen
- aptitlöshet
- influensaliknande symtom
- ovanlig blödning eller blåmärken
- svaghet
- mörkgul eller brun urin
- ljusa tarmrörelser
- gulfärgning av huden eller ögonen
- kyla, särskilt i armar eller ben
- träningsvärk
- snabba eller oregelbundna hjärtslag
- yrsel
- yrsel
- ont i magen med illamående och kräkningar
- illamående
- kräkningar

Emtricitabin och tenofovir kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Ha tillgång till emtricitabin och tenofovir. Vänta inte tills du får slut på medicin för att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

randnamn på kombinationsprodukter

- Descovy®(innehåller Emtricitabine, Tenofovir)
- Truvada®(innehåller Emtricitabine, Tenofovir)

Senast reviderad - 2020-09-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022