

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Emtricitabine en Tenofovir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612036.html>

## Emtricitabine en Tenofovir

uitgesproken als (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

### BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Emtricitabine en tenofovir mogen niet worden gebruikt voor de behandeling van hepatitis B-virusinfectie (HBV; een aanhoudende leverinfectie). Vertel het uw arts als u HBV heeft of denkt te hebben. Uw arts kan u testen om te zien of u HBV heeft voordat u begint met uw behandeling met emtricitabine en tenofovir. Als u HBV heeft en u emtricitabine en tenofovir gebruikt, kan uw toestand plotseling verslechteren als u stopt met het gebruik van emtricitabine en tenofovir. Uw arts zal u onderzoeken en enkele maanden nadat u bent gestopt met het gebruik van emtricitabine en tenofovir regelmatig laboratoriumtests bestellen om te zien of uw HBV is verergerd.

Als u emtricitabine en tenofovir gebruikt om te voorkomen dat u hiv krijgt, zal uw arts u testen om te zien of u hiv heeft voordat u met uw behandeling begint. Vertel het uw arts als u de afgelopen maand een van de volgende symptomen heeft gehad of als u een van de volgende symptomen heeft tijdens het gebruik van emtricitabine en tenofovir om te voorkomen dat u hiv krijgt: koorts, vermoeidheid, gewrichts- of spierpijn, huiduitslag, nacht zweten, braken, diarree, hoofdpijn, keelpijn, gezwollen nek of liesstreek. Vertel het uw arts als u denkt dat u aan hiv bent blootgesteld. Emtricitabine en tenofovir voorkomen niet altijd hiv. Uw arts zal ten minste elke 3 maanden een hiv-test bestellen terwijl u emtricitabine en tenofovir gebruikt om te zien of u met hiv bent geïnfecteerd. Emtricitabine en tenofovir mogen alleen worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van hiv. Als emtricitabine en tenofovir alleen worden gebruikt om hiv te behandelen, kan uw aandoening moeilijker te behandelen worden.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op emtricitabine en tenofovir te controleren.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met emtricitabine en tenofovir en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van emtricitabine en tenofovir.

## hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van emtricitabine en tenofovir (Descovy, Truvada) wordt samen met andere medicijnen gebruikt om hiv te behandelen bij volwassenen en kinderen die minstens 17 kg wegen. Emtricitabine en tenofovir (Truvada) worden ook gebruikt in combinatie met veiligere seks (bijv. condoomgebruik) om het risico op HIV-infectie te verminderen) bij risicovolle volwassenen en tieners die ten minste 35 kg wegen. Emtricitabine en tenofovir behoren tot een klasse van geneesmiddelen die nucleoside- en nucleotide-reverse-transcriptaseremmers (NRTI's) worden genoemd. Ze werken door de verspreiding van hiv in het lichaam te vertragen. Hoewel emtricitabine en tenofovir hiv niet genezen, kunnen deze medicijnen uw kans op het ontwikkelen van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) en hiv-gerelateerde ziekten zoals ernstige infecties of kanker verkleinen.

## hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van emtricitabine en tenofovir wordt geleverd als tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of zonder voedsel. Neem emtricitabine en tenofovir elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem emtricitabine en tenofovir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Als u emtricitabine en tenofovir (Truvada) gebruikt, kan uw arts u tijdens uw behandeling een calcium- en vitamine D-supplement voorschrijven of aanbevelen. U dient deze supplementen in te nemen zoals voorgeschreven door uw arts.

Als uw kind emtricitabine en tenofovir (Truvada) gebruikt, slik de tablet dan in zijn geheel door. Vertel het uw arts als uw kind de tabletten niet kan doorslikken.

Ga door met het innemen van emtricitabine en tenofovir, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van emtricitabine en tenofovir zonder met uw arts te overleggen.

## andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

## hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

### Voordat u emtricitabine en tenofovir inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor emtricitabine en tenofovir, voor andere medicijnen of voor één van de bestanddelen van emtricitabine en tenofovir-tabletten. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: antivirale medicijnen zoals aciclovir (Sitavig, Zovirax), adefovir (Hepsera), cidofovir, ganciclovir (Cytovene), valaciclovir (Valtrex) en valganciclovir (Valcyte); aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve,

naprosyn); gentamicine; andere medicijnen tegen hiv of aids, waaronder atazanavir (Reyataz, in Evotaz), darunavir (Prezista, in PrezcoBix), didanosine (Videx), emtricitabine (Emtriva, in Atripla, in Complera, in Genvoya, in Odefsey, in Stribild, in Truvada, anderen), lamivudine (Epivir, in Combivir, in Epzicom, in Trizivir, anderen), lopinavir en ritonavir (Kaletra), tenofovir (Viread, in Atripla, in Stribild, in Truvada, anderen); en andere hiv-medicatie die emtricitabine en tenofovir bevatten (Atripla, Complera, Emtriva, Genvoya, Odefsey, Stribild, Vemlidy, Viread). Als u emtricitabine en tenofovir (Descovy) gebruikt, vertel het dan ook aan uw arts als u carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, anderen), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, fenytoïne (Dilantin, Phenytek), rifabutine (Mycobutine) gebruikt. , rifampicine (Rifadin, Rimactaan, in Rifamaat, in Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir) en tipranavir (Aptivus). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid. U mag geen sint-janskruid gebruiken terwijl u emtricitabine en tenofovir (Descovy) gebruikt.
- vertel het uw arts als u de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN genoemde aandoeningen heeft of ooit heeft gehad, botproblemen, waaronder osteoporose (een aandoening waarbij de botten dun en zwak worden en gemakkelijk breken) of botbreuken, elke vorm van infectie die niet overgaat weg of die komt en gaat, zoals tuberculose (tbc; een type longinfectie) of cytomegalovirus (CMV; een virale infectie die symptomen kan veroorzaken bij mensen met een zwak immuunsysteem), of lever- of nierziekte.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u emtricitabine en tenofovir gebruikt, neem dan contact op met uw arts. U mag geen borstvoeding geven als u met hiv bent geïnfecteerd of als u emtricitabine en tenofovir gebruikt.
- u moet weten dat terwijl u medicijnen gebruikt om een hiv-infectie te behandelen, uw immuunsysteem sterker kan worden en andere infecties die al in uw lichaam aanwezig waren, kan gaan bestrijden. Dit kan ertoe leiden dat u symptomen van die infecties ontwikkelt. Als u nieuwe of verergerende symptomen krijgt tijdens uw behandeling met emtricitabine en tenofovir, vertel dit dan aan uw arts.

## hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

### wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt die dag. Neem niet meer dan één dosis per dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

**Emtricitabine en tenofovir kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:**

- depressie
- ongerustheid
- moeite met inslapen of doorslapen
- ongebruikelijke dromen
- pijn, brandend of tintelend gevoel in handen of voeten

- maagzuur
- gewichtsverlies

**Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de rubrieken BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of roep medische noodhulp in:**

- zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen
- heesheid
- moeite met slikken of ademen
- verminderd plassen
- moeilijk, pijnlijk of frequent urineren
- bot pijn
- pijn in de rechterbovenhoek van de maag
- verlies van eetlust
- griepachtige symptomen
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- zwakheid
- donkergele of bruine urine
- lichtgekleurde stoelgang
- geel worden van de huid of ogen
- het koud hebben, vooral in de armen of benen
- spierpijn
- snelle of onregelmatige hartslag
- duizeligheid
- duizeligheid
- maagpijn met misselijkheid en braken
- misselijkheid
- braken

Emtricitabine en tenofovir kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

## wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

## n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

## wat moet ik nog meer weten?

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Houd een voorraad emtricitabine en tenofovir bij de hand. Wacht niet tot uw medicatie op is om uw recept bij te vullen.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

## randnamen van combinatieproducten

- Descovy®(bevat emtricitabine, tenofovir)
- Truvada®(bevat emtricitabine, tenofovir)

Laatst herzien - 15-09-2020

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022