

الأنشطة التي يمكن أن تضر نفسك أو الآخرين. تسمى هذه السلوكيات اضطرابات السيطرة على الانفعالات ويمكن أن تشمل إدمان القمار أو الإفراط في الأكل أو الإنفاق أو الدافع الجنسي المرتفع بشكل غير طبيعي أو زيادة الأفكار أو المشاعر الجنسية. **قد يحتاج طبيبك إلى مراجعة علاجاتك.**

نظراً لأنه سيتم تناول أقراص Entacapone مع أدوية ليفودوبا الأخرى ، يرجى أيضاً قراءة منشورات العبوة الخاصة بهذه الأدوية بعناية.

قد تحتاج جرعة الأدوية الأخرى لعلاج مرض باركنسون إلى تعديل عند بدء تناول إنتاكابون. اتبع التعليمات التي قدمها لك طبيبك.

المتلازمة الخبيثة للذهان (NMS) هي رد فعل خطير ولكنه نادر لأدوية معينة ، وقد يحدث بشكل خاص عند التوقف فجأة عن Entacapone وأدوية أخرى لعلاج مرض باركنسون أو يتم تقليل الجرعة فجأة. لأعراض NMS ، انظر القسم 4 (الآثار الجانبية المحتملة). قد ينصحك طبيبك بالتوقف ببطء عن العلاج باستخدام Entacapone وأدوية أخرى لعلاج مرض باركنسون.

قد يسبب Entacapone الذي يتم تناوله مع ليفودوبا النعاس وقد يؤدي إلى النوم فجأة في بعض الأحيان. إذا حدث هذا ، فلا يجوز لك القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات (انظر "القيادة واستخدام الآلات").

الأطفال والمراهقون

الخبرة مع Entacapone في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً محدودة. لذلك ، لا ينصح باستخدام Entacapone في الأطفال.

الأدوية الأخرى و Entacapone

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية أو الأدوية العشبية.

على وجه الخصوص ، يرجى إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أيًا مما يلي:

• ريميبتيرول ، إيزوبرينالين ، أدرينالين ، نورادرينالين ، دوبامين ، دوبوتامين ، ألفا ميتيل دوبا ، ابومورفين

• مضادات الاكتئاب: مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل أميتريبتيلين ، ديسيبيرامين) ، مابروتيلين ، فينلافاكسين ، باروكستين ، مثبطات مونوامين أوكسيداز القابلة للعكس من النوع أ (مثل موكلوبميد) الوارفارين (يستخدم لتسييل الدم)
• مكملات الحديد. قد يجعل Entacapone من الصعب عليك هضم الحديد. لذلك ، لا تتناول Entacapone ومكملات الحديد في نفس الوقت. بعد أخذ واحد منهم ، انتظر ما لا يقل عن 2 إلى 3 ساعات قبل أخذ الآخر.

الحمل والرضاعة والخصوبة

لا تستخدم Entacapone أثناء الحمل أو إذا كنت مرضعة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقد أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل ، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

السياقة واستخدام الماكينات قد يؤدي تناول Entacapone مع ليفودوبا إلى خفض ضغط الدم ، مما قد يجعلك تشعر بالدوار أو الدوار. كن حذراً بشكل خاص عند القيادة أو عند استخدام الأدوات أو الآلات.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يجعلك Entacapone الذي يتم تناوله مع ليفودوبا تشعر بالنعاس الشديد ، أو يتسبب في نومك فجأة في بعض الأحيان.

لا تقم بالقيادة أو تشغيل الآلات إذا كنت تعاني من هذه الآثار الجانبية.

يحتوي Entacapone على السكرور

إذا أخبرك طبيبك أن لديك حساسية تجاه بعض السكريات ، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا المنتج الطبي.

3. كيف تأخذ Entacapone

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

يتم تناول Entacapone مع الأدوية التي تحتوي على ليفودوبا (إما مستحضرات ليفودوبا / كاربيدوبا أو مستحضرات ليفودوبا / بنسيرازيد). يمكنك أيضاً استخدام أدوية أخرى لعلاج مرض باركنسون في نفس الوقت.

الجرعة الموصى بها من Entacapone هي قرص واحد 200 مجم كل جرعة من ليفودوبا. الجرعة القصوى الموصى بها هي 10 أقراص يومياً ، أي 2000 مجم من Entacapone. يمكن تناول هذا الدواء مع الطعام أو بدونه.

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى

إذا كنت تخضع لغسيل الكلى لأن لديك مشاكل في الكلى ، فقد يخبرك طبيبك بزيادة الوقت بين الجرعات.

نشرة العبوة: معلومات للمريض

إنتاكابون 200 مجم أقراص ملبسة بالفيلم

إنتاكابون

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى. إذا كانت لديك أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
• تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا تنقلها للآخرين. فهو قد يضرهم ، حتى لو كانت أعراض مرضهم هي نفس أعراضك.

3. إذا أصبت بأي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

ما هو في هذه النشرة

1. ما هو Entacapone وما هي دواعي استخدامه.
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ Entacapone.
3. كيف تأخذ Entacapone.
4. الآثار الجانبية المحتملة.
5. كيفية تخزين Entacapone.
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1. ما هو Entacapone وما هي دواعي استخدامه

تحتوي أقراص Entacapone على entacapone وتستخدم مع ليفودوبا لعلاج مرض باركنسون. يساعد Entacapone ليفودوبا في تخفيف أعراض مرض باركنسون. ليس لـ Entacapone أي تأثير على تخفيف أعراض مرض باركنسون إلا إذا تم تناوله مع ليفودوبا.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ

• إنتاكابون

لا تأخذ Entacapone:

• إذا كان لديك حساسية من entacapone أو أي من الآخرين مكونات هذا الدواء (مدرجة في القسم 6).
• تشمل أعراض الحساسية ضيق التنفس ، أزيزاً أو صعوبة في التنفس تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم ، طفح جلدي ، حكة أو خلايا على الجلد
إذا كنت تعاني من ورم القواتم ، وهو ورم في الغدة الكظرية (غدة تقع بالقرب من الكلية) لأن هذا قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم الشديد.

إذا كنت تتناول بعض مضادات الاكتئاب المعروفة

باسم مثبطات مونوامين أوكسيداز غير الانتقائية (MAOIs). تشمل الأمثلة فينيلزين وتراييلسيبرومين (اسأل طبيبك أو الصيدلي عما إذا كان يمكن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب مع Entacapone)

إذا كنت تتناول مثبطات مونوأمين أوكسيداز القابلة

للعكس من النوع أ (مثل موكلوبميد) مع نوع مثبطات مونوامين أوكسيداز ب (تشمل الأمثلة سيليجيلين) إذا كنت تعاني من مرض في الكبد

• إذا كنت قد عانيت في أي وقت مضى من رد فعل نادر للأدوية المضادة للذهان تسمى المتلازمة الخبيثة للذهان (NMS). انظر القسم 4 من هذه النشرة (الآثار الجانبية المحتملة) للتعرف على أعراض NMS إذا كنت قد عانيت من اضطراب عضلي نادر يسمى انحلال الريبيدات الذي لم ينتج عن

• إصابة. يسبب انحلال الريبيدات الألم والحنان وضعف العضلات ، والحساسية للضغط ، وقد يؤدي إلى مشاكل في الكلى.

المحاذير والإحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول

Entacapone:

• إذا أصبت بنوبة قلبية أو أي نوبة قلبية أخرى أمراض القلب

• إذا كنت تتناول دواء قد يسبب

دواراً أو خفة الرأس (انخفاض ضغط الدم) عند النهوض من كرسي أو سرير
• إذا كنت تعاني من أي ألم عضلي غير مبرر ، أو رقة أو ضعف ، أو حساسية للضغط إذا كنت تعاني من الإسهال لفترات طويلة ، فاستشر طبيبك لأنه قد يكون علامة على التهاب القولون (الأمعاء الغليظة أو الأمعاء)

إذا كنت تعاني من الإسهال ، يوصى بمراقبة وزنك

لتجنب فقدان الوزن الزائد المحتمل

إذا كنت تعاني من فقدان الشهية المتزايد والضعف والإرهاق وفقدان الوزن خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. قد يفكر طبيبك في إجراء تقييم طبي عام بما في ذلك اختبار وظائف الكبد.

أخبر طبيبك إذا لاحظت أنت أو عائلتك / مقدم الرعاية أنك تطوردواغ أو اشتهاً للتصرف بطرق غير معتادة بالنسبة لك أو أنك لا تستطيع مقاومة الدافع أو الدافع أو الإغراء للقيام ببعض

| Mylan | | Date of Final | Date of Issue | Page Count |
|---|---------------------|--|--|----------------------------|
| | | يوم / شهر / سنة | يوم / شهر / سنة | 1 من 2 |
| Date Time of Creation | 12:46 12/04/21 | Client Market | المملكة المتحدة | Adobe InDesign 15.1 برنامج |
| Vendor Job No. | 600714 | Product Description | أشعل. (B / F) 200 TABS ENTACAPONE مجم جيجابايت 1 | |
| Artwork Proof No. | 1 | New Material Code | 75079324 | |
| Pharma Code | | Barcode Information | | |
| Product Render ID No. | | AM Number | PL 04569/1188 | |
| Main Font Type - 1 | مايريديرو | Registered Code | 400505399.400505398 | |
| Main Font Type - 2 | | Packaging Size | Ltd - FDF 4 Jadoherla - IN Mylan Laboratories | |
| Mini Font Size | 10 الفون | Mfg. Lic. No. / Code No. | | |
| Reason for Revision / Reason | تغيير في النص | No. of Printed Colors | 1 | |
| | | Printed Colors CMYK \ PMS Coated \ PMS Color Bridge Coated | أسود 100% | |
| | | Non Printed Colors | خط الموت | |
| Artwork Implementation | | Equivalent with CMYK (Pastones Ref. Code) | غير متوفر | |
| Color Change / Replacement | | Material or Construction | ورق تريابيني آي تي سي 40 gsm | |
| Approval | | Design & Style | توريد Lea في شكل مطوي بالحجم المقترح | |
| LABEL CONTROL \ BUSINESS DEVELOPMENT \ REGULATORY \ MARKETING | | | | |
| Approval | Prepared by | Checked by | Approved by | |
| | Regulatory Affairs | Production | Packaging Technical Services | Quality Assurance |
| Revision History | Digital Signature | Digital Signature | Digital Signature | Digital Signature |
| | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات |
| تمودج- 20-12-00_000647341 | | | | |

إذا كنت تأخذ Entacapone أكثر مما يجب في حالة تناول جرعة زائدة ، استشر طبيبك أو أقرب مستشفى في الحال. تشمل الأعراض الارتباك ، وقلة النشاط ، والشعور بالنعاس ، وانخفاض قوة العضلات ، وتغير لون الجلد ، والشرى(خلايا النحل).

إذانسيت أن تأخذ Entacapone

إذانسيت تناول قرص Entacapone بجرعة ليفودوبا ، فيجب عليك مواصلة العلاج عن طريق تناول قرص Entacapone التالي مع جرعة ليفودوبا التالية. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض قرص منسي.

إذاتوقفت عن تناول إنتاكابون

لا تتوقف عن تناول Entacapone ما لم يخبرك طبيبك بذلك. عند التوقف ، قد يحتاج طبيبك إلى إعادة ضبط جرعة الأدوية الأخرى الخاصة بك لعلاج مرض باركنسون. قد يؤدي إيقاف إنتاكابون وأدوية أخرى لعلاج مرض باركنسون فجأة إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها. انظر القسم 2 من هذه النشرة (تحذيرات واحتياطات).

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. عادة ما تكون الآثار الجانبية التي يسببها Entacapone خفيفة إلى معتدلة.

غالباً ما تحدث بعض الآثار الجانبية بسبب زيادة تأثيرات علاج ليفودوبا وهي أكثر شيوعاً في بداية العلاج. إذا واجهت مثل هذه التأثيرات في بداية العلاج بـ Entacapone ، يجب عليك الاتصال بطبيبك الذي قد يقرر تعديل جرعتك من ليفودوبا.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي من الآثار الجانبية التالية:

• نادراً ما يجعلك تناول Entacapone مع ليفودوبا تشعر بالنعاس الشديد أثناء النهار ، وبسبب لك النوم فجأة ،

• المتلازمة الخبيثة للذهان (NMS) هي رد فعل حاد نادر للأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات الجهاز العصبي ويمكن أن تحدث عند التوقف عن تناول هذه الأدوية أو إيقافها فجأة. يتميز بالتعب ، وارتعاش العضلات ، والرجفة ، والاضطراب ، والارتباك ، والغيبوبة ، وارتفاع درجة حرارة الجسم ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وعدم استقرار ضغط الدم ،

• اضطراب عضلي حاد نادر (انحلال الربيدات) يسبب الألم والحنان وضعف العضلات والحساسية للضغط وقد يؤدي إلى مشاكل في الكلى.

• عدم القدرة على مقاومة الدافع للقيام بعمل قد يكون ضاراً ، والذي قد يشمل:

- * دافع قوي للمقاومة بشكل مفرط على الرغم من العواقب الشخصية أو العائلية الخطيرة
- * تغيير أو زيادة الاهتمام الجنسي والسلوك الذي يثير قلقك أو للآخرين ، على سبيل المثال ، الدافع الجنسي المتزايد
- * التسوق أو الإنفاق المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه
- * الأكل بنهم (تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة) أو الأكل القهري (تناول طعام أكثر من المعتاد وأكثر مما هو مطلوب لإشباع جوعك)

أخبر طبيبك إذا واجهت أيًا من هذه السلوكيات ؛ سيناقشون طرق إدارة أو تقليل هذه الأعراض.

• النوبة القلبية (تشمل الأعراض ألاماً في الصدر يمكن أن تشعره وكأنه ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل ذراعك الأيسر والركبة وضيق في التنفس والقلق والشعور بالدوخة والغثيان (الشعور بالغثيان) أو القيء (كونه مريضاً). هذا عرض جانبي غير شائع (قد يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص).

• التهاب القولون (التهاب القولون ، وتشمل الأعراض الإسهال المطول أو المستمر) أو التهاب الكبد (التهاب الكبد (مع اصفرار الجلد وبياض العينين. تواتر هذه الآثار الجانبية غير معروف (لا يمكن تقديره من البيانات المتاحة)

أعراض جانبية أخرى:

شائع جداً (قد تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص):

- حركات لا يمكن السيطرة عليها مع صعوبة في أداء الحركات الإرادية (خلل الحركة)
- الشعور بالغثيان (الغثيان)
- تلون البول باللون البني المحمر غير المؤذي

مشترك (قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص):

- الحركات المفرطة (فرط الحركة) ، تفاقم أعراض مرض باركنسون ، تقلصات العضلات لفترات طويلة (خلل التوتر العضلي)
- المرض (القيء) ، الإسهال ، آلام البطن ، الإمساك ، جفاف الفم
- الدوخة ، التعب ، زيادة التعرق ، السقوط
- الهلوسة (رؤية / سماع / الشعور / شم رائحة أشياء ليست موجودة بالفعل) ، والأرق ، والأحلام الواضحة ، والارتباك

• أحداث أمراض القلب أو الشرايين (مثل ألم الصدر والذبحة الصدرية)

نادر (قد تظهر لدى حتى 1 من كل 1000 شخص):

- طفح جلدي يتميز باحمرار أو تنوعات على الجلد
- نتائح غير طبيعية في اختبارات وظائف الكبد

نادر جداً (قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10000 شخص):

- الهياج
- قلة الشهية وفقدان الوزن
- قشعريرة

غير معروف (لا يمكن تقدير التردد من البيانات المتاحة):

- تغير لون الجلد والشعر واللحية والأظافر

عندما يتم إعطاء Entacapone بجرعات أعلى:

الجرعات من 1400 إلى 2000 مجم يومياً ، تكون الآثار الجانبية التالية أكثر شيوعاً:

- حركات لا يمكن السيطرة عليها مع صعوبة في أداء الحركات الإرادية (خلل الحركة)
- الشعور بالغثيان (الغثيان)
- وجع بطن

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر موقع ويب مخطط البطاقة الصفراء www.mhra.gov.uk/yellowcard. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية ، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية تخزين Entacapone

احفظ هذا الدواء بعيداً عن أنظار ومتناول أيدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق ، الكرتون ، الزجاجة بعد EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يتطلب هذا الدواء أي شروط تخزين خاصة.

لحزمة الزجاجة فقط: بمجرد فتحه ، استخدم في غضون 100 يوم.

لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ماذا يحتوي Entacapone:

- المادة الفعالة هي إنتاكابون. يحتوي كل قرص على 200 ملغ من إنتاكابون.
- المكونات الأخرى في قلب القرص هي السليلوز ، الجريزوفولين ، مانيتول ، هيدروكسي بروبيل سلولوز ، بديل منخفض ، ستيرات المغنيسيوم ، زيت نباتي مهدرج.

- يحتوي طلاء الفيليم على هيدروكسي بروبيل ، وثاني أكسيد التيتانيوم (E171) ، والجلسرين ، وستيرات المغنيسيوم ، وأكسيد الحديد الأصفر (E172) ، والسكروز ، وبولي سوربات 80 ، وأكسيد الحديد الأحمر (E172).

كيف يبدو Entacapone وما هي محتويات العبوة

أقراص 200 Entacapone ملغ المغلفة بالفيليم هي أقراص برتقالية فاتحة ، بيضاوية الشكل ، محدبة من الوجهين ، مغلفة بفيلم منقوش عليها "EE200" على جانب واحد من الجهاز اللوحي و "M" على الجانب الآخر. يتم تعبئتها في بثور وزجاجات وعلب كرتونية تحتوي على زجاجات متعددة.

تتكون عبوات الفقاعات من فيلم PVdC / PE / PVC الشفاف الشفاف على جانب واحد وورق الألمنيوم المقوى المطلي بورنيش مانع التسرب الحراري على الجانب الآخر يحتوي على 30 أو 60 أو 100 أو 200 أو 300 أو 400 قرص ، أو عبوة جرعة وحدة مثقبة تحتوي على أقراص 100x1.

تتكون عبوات الزجاجات من زجاجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بيضاء اللون مع غطاء لولبي أبيض من البولي بروبيلين (PP) يحتوي على 30 أو 50 أو 60 أو 100 أو 250 أو 500 قرص.

كرتونة تحتوي على 200 أو 300 أو 400 قرص بحجم 4 أو 6 أو 8 عبوات سعة 50 قرصاً. تتكون الزجاجات من زجاجة بيضاء اللون من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) مع غطاء لولبي أبيض غير شفاف من مادة البولي بروبيلين (PP).

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب ترخيص التسويق

ميلان ، بوترز بار ، هيرتفوردشاير ، EN6 1TL ، المملكة المتحدة.

الصانع

مختبرات جبرارد ، 35/36 منطقة بالدويل الصناعية ، طريق جرانج ، دبلن 13 ، أيرلندا.
المجر. 1. Komárom. Mylan utca H-2900.
Mylan Hungary Kft.

تم تعديل هذه النشرة لآخر مرة في 12/2020

2409635
75079324

| Mylan | | Date of Final | يوم / شهر / سنة | Date of Issue | يوم / شهر / سنة | Page Count |
|---|--|--|---|---|----------------------------|---------------------|
| Date/Time of Creation | 12:46 12/04/21 | Track-Wise PR No. | 2409635 | Software \ Ver. No. | برنامج Adobe InDesign 15.1 | 2 من 2 |
| Vendor Job No. | 600714 | Affiliate New Code | 2409635 | أشعل. ENTACAPONE TABS 200 (B / F) مجم جيجايابت V1 | | |
| Artwork Proof No. | 1 | Alt. Subscribed Code | 1949066 | | | |
| Prims Code | غير متوفر | Barcode Information | غير متوفر | Actual A/W Size | | |
| Product Render ID No. | غير متوفر | MA Number | PL04569/1188 | الحجم المفتوح - 400 × 170 مم | | |
| Main Font Type - 1 | مايريدبرو | SAP or SPC Code | 400505399.400505398 | الحجم المطوي - 40 × 170 مم | | |
| Main Font Type - 2 | غير متوفر | Packaging Site | Ltd - FDF 4 Jagdcherla - INE Mylan Laboratories | Other Sizes (if any) | | |
| Min. Font Size | 0.9 | Mfg. Lic. No. \ Code No. | غير متوفر | Pitch After Every | غير متوفر | |
| Reason for Revision / Assurance | تغيير في النص | No. of Printed Colors | 1 | Eye \ Sensor Mark | غير متوفر | |
| Artwork Specifications (✓) (Application software is applicable) | New Component | Printed Colors CMYK \ PMS Coated \ PMS Color Bridge Coated | 100% أسود | Eye \ Sensor Mark | غير متوفر | |
| | After Consumption of Existing (subscribed) stock | Non Printed Colors | خط الموت | Eye \ Sensor Mark | غير متوفر | |
| Materials to Construction | ورق تترابيني أي تي سي 40 gsm | Equivalent with CMYK (Pantone Ref. Code) | غير متوفر | | | |
| Design & Style | توريدات Lea et al في شكل مطوي بالحجم المقترح | Prepared By | LABEL CONTROL \ BUSINESS DEVELOPMENT \ REGULATORY \ MARKETING | Checked By | Approved By | Quality Assurance |
| Signature | Digital Signature | Digital Signature | Digital Signature | Digital Signature | Digital Signature | Digital Signature |
| Revision History | 06.04.2021 - مشاركة Kld | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات | التاريخ / الملاحظات |
| نموذج-20-12-00_000647341 | | | | | | |