



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente

Entacapone 200 mg

mga tabletang pinahiran ng pelikula
entacapone

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.
- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

3. Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito

- Ano ang Entacapone at para saan ito ginagamit.
- Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Entacapone.
Paano kumuha ng Entacapone.
- Mga posibleng epekto.
- Paano mag-imbak ng Entacapone.
- Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon.

1. Ano ang Entacapone at para saan ito ginagamit

Ang mga entacapone tablet ay naglalaman ng entacapone at ginagamit kasama ng levodopa upang gamutin ang sakit na Parkinson. Tinutulungan ng Entacapone ang levodopa sa pag-alis ng mga sintomas ng sakit na Parkinson. Ang Entacapone ay walang epekto sa pag-alis ng mga sintomas ng sakit na Parkinson maliban kung iniinom kasama ng levodopa.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha

• Entacapone

Huwag uminom ng Entacapone:

- kung ikaw ay allergic sa entacapone o alinman sa iba pa sangkap ng gamot na ito (nakalista sa Seksyon 6).
Ang mga sintomas ng allergy ay kinabibilangan ng igsig ng paghinga, paghinga o kahirapan sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila o iba pang bahagi ng katawan, pantal, pangangati o pamamantal sa balat kung mayroon kang phaeochromocytoma , isang tumor ng adrenal gland (isang glandula na nakaupo malapit sa bato) dahil maaari itong magpataas ng panganib ng matinding altapresyon kung umiinom ka ng ilang antidepressant na kilala bilang non-selective monoamine oxidase inhibitors (MAOIs).
Kasama sa mga halimbawa ang phenelzine at tranlycypromine (magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang iyong antidepressive na gamot ay maaaring inumin kasama ng Entacapone)
kung umiinom ka ng reversible monoamine oxidase inhibitors type A (tulad ng moclobemide) kasama ng monoamine oxidase inhibitors type B (kabilang sa mga halimbawa ang selegiline) kung mayroon kang sakit sa atay
- kung nakaranas ka na ng isang bihirang reaksiyon sa mga antipsychotic na gamot na tinatawag na neuroleptic malignant syndrome (NMS). Tingnan ang Seksyon 4 ng leaflet na ito (Posibleng side effect) para sa mga sintomas ng NMS kung nakaranas ka na ng isang bihirang sakit sa kalamnan na tinatawag na rhabdomyolysis na hindi sanhi ng
- pinsala. Ang rhabdomyolysis ay nagdudulot ng pananakit, panlalambot at panghihina ng mga kalamnan, pagiging sensitibo sa presyon, at maaaring humantong sa mga problema sa bato.

Mga babala at pag-iingat

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Entacapone:

- kung nagkaroon ka na ng atake sa puso o anumang iba pa mga sakit sa puso
kung umiinom ka ng gamot na maaaring magdulot pagkahilo o pagkahilo (mababang presyon ng dugo) kapag bumangon mula sa upuan o kama
kung nakakaranas ka ng anumang hindi maipaliwanag na pananakit ng kalamnan, lambot o panghihina, o sensitivity sa pressure kung nakakaranas ka ng matagal na pagtatae kumunsulta sa iyong doktor dahil maaaring ito ay tanda ng pamamaga ng colon (malaking bituka o bituka)
kung nakakaranas ka ng pagtatae, inirerekomenda ang pagsubaybay sa iyong timbang upang maiwasan ang potensyal na labis na pagbaba ng timbang
kung nakakaranas ka ng pagtaas ng pagkawala ng gana, panghihina, pagkahapo at pagbaba ng timbang sa loob ng medyo maikling panahon. Maaaring isaalang-alang ng iyong doktor ang paggawa ng pangkalahatang medikal na pagsusuri kabilang ang pagsubok sa iyong function ng atay.

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo o ng iyong pamilya/ tagapag-alaga na nagkakaroon ka ng mga pagnanasa o pananakit na kumilos sa mga paraan na hindi karaniwan para sa iyo o hindi mo mapaglabanan ang udyok, pagmamaneho o tukso na gawin ang ilang

mga aktibidad na maaaring makapinsala sa iyong sarili o sa iba. Ang mga gawi na ito ay tinatawag na impulse control disorders at maaaring kabilangan ng nakakahumaling na pagsusugal, labis na pagkain o paggastos, isang abnormal na mataas na pagnanasa sa pakikipagtalik o pagtaas ng mga iniisip o damdaming sekswal. **Maaaring kailanganin ng iyong doktor na suriin ang iyong mga paggamot.**

Dahil ang mga Entacapone tablet ay iinum kasama ng iba pang mga gamot na levodopa, mangyaring basahin nang mabuti ang mga leaflet ng pakete ng mga gamot na ito.

Ang dosis ng iba pang mga gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson ay maaaring kailangang ayusin kapag sinimulan mong uminom ng Entacapone. Sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa iyo ng iyong doktor.

Ang Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) ay isang seryoso ngunit bihirang reaksiyon sa ilang partikular na gamot, at maaaring mangyari lalo na kapag ang Entacapone at iba pang mga gamot para sa paggamot sa Parkinson's disease ay biglang itinigil o ang dosis ay biglang nabawasan. Para sa mga sintomas ng NMS tingnan ang Seksyon 4 (Posibleng side effect). Maaaring payuhan ka ng iyong doktor na dahan-dahang ihinto ang paggamot sa Entacapone at iba pang mga gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson.

Ang entacapone na kinuha kasama ng levodopa ay maaaring maging sanhi ng pag-aantok at maaaring maging sanhi kung minsan ay bigla kang makatulog. Kung mangyari ito, hindi ka dapat magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina (tingnan ang "Pagmamaneho at paggamit ng mga makina").

Mga bata at kabataan

Ang karanasan sa Entacapone sa mga pasyenteng wala pang 18 taong gulang ay limitado. Samakatuwid, ang paggamit ng Entacapone sa mga bata ay hindi inirerekomenda.

Iba pang mga gamot at Entacapone

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay umiinom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta o mga herbal na gamot.

Sa partikular, mangyaring sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod:

- rimiterole, isoprenaline, adrenaline, noradrenaline, dopamine, dobutamine, alpha-methylidopa, apomorphine
- antidepressants: tricyclic antidepressants (tulad ng amitriptyline, desipramine), maprotiline, venlafaxine, paroxetine, reversible monoamine oxidase inhibitors type A (tulad ng moclobemide)
- warfarin (ginagamit para payat ang dugo)
- mga pandagdag sa bakal. Ang Entacapone ay maaaring maging mas mahirap para sa iyo na matunaw ang bakal. Samakatuwid, huwag uminom ng Entacapone at iron supplement nang sabay. Pagkatapos kunin ang isa sa mga ito, maghintay ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago kunin ang isa pa.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong

Huwag gumamit ng Entacapone sa panahon ng pagbubuntis o kung ikaw ay nagpapasuso.

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina Ang entacapone na kinuha kasama ng levodopa ay maaaring magbababa ng iyong presyon ng dugo, na maaaring magpapahina sa iyong ulo o mahilo. Maging partikular na maingat kapag nagmamaneho ka o kapag gumagamit ka ng mga tool o makinarya.

Bilang karagdagan, ang Entacapone na kinuha kasama ng levodopa ay maaaring makadama sa iyo ng labis na pag-aantok, o kung minsan ay bigla kang makatulog.

Huwag magmaneho o magpatakbo ng makinarya kung nararanasan mo ang mga side effect na ito.

Ang Entacapone ay naglalaman ng sucrose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago kunin ang produktong paggamot na ito.

3. Paano uminom ng Entacapone

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Ang Entacapone ay iniinom kasama ng mga gamot na naglalaman ng levodopa (alinman sa mga paghahanda ng levodopa/carbidopa o mga paghahanda ng levodopa/benserazide). Maaari ka ring gumamit ng iba pang mga gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson sa parehong oras.

Ang inirerekomendang dosis ng Entacapone ay isang 200 mg na tableta sa bawat dosis ng levodopa. Ang maximum na inirerekomendang dosis ay 10 tablet bawat araw, ibig sabihin, 2,000 mg ng Entacapone. Ang gamot na ito ay maaaring inumin nang may pagkain o walang.

Mga pasyenteng may problema sa bato

Kung ikaw ay tumatanggap ng dialysis dahil mayroon kang mga problema sa bato, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na taasan ang oras sa pagitan ng mga dosis.

Mylan				Date of Final	dd / mm / yy	Date of Issue	dd / mm / yy	Page Count	1 ng 2
Date/Time of Creation	12/04/21 12:46	Track-Wise PR No.	2409635	Client Market	United Kingdom	Software / Ver. No.	Adobe InDesign 15.1		
Vendor Job No.	600714	Affiliate New Code	2409635	Product Description	LIT. (B/F) ENTACAPONE TABS 200 mg GB V1				
Artwork Proof No.	1	Aff. Superseded Code	1949066	New Material Code		Actual A/w Size	Bukas na Sukat - 170 x 400 mm		
Pharma Code	NA	Barcode Information	NA	ITF Barcode	75079324	Other Sizes (if any)	Laki ng nakatiklop - 170 x 40 mm		
Product Render ID No.	NA	MA Number	PL 04569/1188	Superseded Code	75068959	Pitch After Every	NA		
Main Font Type - 1	Myraid Pro	SAP or SPC Code	400505398, 400505399	Component Type	Nakalimbag na Literatura	Eye / Sensor Mark	NA		
Main Font Type - 2	NA	Packaging Site	Mylan Laboratories Ltd - FDF 4 (Badherla - IN)	No. of Printed Colors	1	ITF Barcode Size	NA		
Min. Font Size	10 pt	Mfg. Lic. No. / Code No.	NA	Printed Colors CMYK / PMS Coated / PMS Color Bridge Coated					
Reason for Revision / Issuance	Pagbabago sa text			Non Printed Colors					
Artwork Implementation Schedule, (✓) whichever is applicable	New Component			Equivalent with CMYK (Pantones Ref. Code)					
	Immediately (Stock of superseded component to be destroyed, if applicable)			Material of Construction	40 gsm ITC Tribeni Paper				
	Others (specify)								
LABEL CONTROL / BUSINESS DEVELOPMENT / REGULATORY / MARKETING				Prepared By	Checked By	Approved By			
Sign Offs	Digital Signature			Packaging Technical Services		Production	Regulatory Affairs		Quality Assurance
				Name Sign	Name Sign	Name Sign	Name Sign	Name Sign	
Revision History	06.04.2021 - Kld share Petsa / Puna Petsa / Puna							Petsa / Puna Petsa / Puna Petsa / Puna Petsa / Puna	
FORM-000647341_00-12-20									

Kung uminom ka ng mas maraming Entacapone kaysa sa dapat mo Kung sakaling ma-overdose, kumunsulta sa iyong doktor o sa pinakamalapit na ospital**kaagad**. Kasama sa mga sintomas ang pagkalito, pagbaba ng aktibidad, pakiramdam ng inaantok, pagbaba ng tono ng kalamnan, pagkawalan ng kulay ng balat at urticaria (mga pantal).

Kung nakalimutan mong uminom ng Entacapone

Kung nakalimutan mong inumin ang Entacapone tablet kasama ang iyong levodopa na dosis, dapat mong ipagpatuloy ang paggamot sa pamamagitan ng pagkuha ng susunod na Entacapone tablet kasama ang iyong susunod na levodopa na dosis. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang tableta.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Entacapone

Huwag ihinto ang pag-inom ng Entacapone maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Kapag huminto, maaaring kailanganin ng iyong doktor na muling ayusin ang dosis ng iyong iba pang mga gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson. Ang biglaang paghinto ng Entacapone at iba pang mga gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson ay maaaring magresulta sa mga hindi gustong epekto. Tingnan ang Seksyon 2 ng leaflet na ito (Mga babala at pag-iingat).

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. Kadalasan ang mga side effect na dulot ng Entacapone ay banayad hanggang katamtaman.

Ang ilan sa mga side effect ay kadalasang sanhi ng tumaas na epekto ng levodopa therapy at pinakakaraniwan sa simula ng paggamot. Kung nakakaranas ka ng mga ganitong epekto sa simula ng paggamot sa Entacapone dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor na maaaring magpasya na ayusin ang iyong dosis ng levodopa.

Sabihin sa iyong doktor kung nakakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto:

- Ang entacapone na kinuha kasama ng levodopa ay maaaring madalang na makaramdam ng sobrang antok sa araw, at maging sanhi ng biglaang pagkakatulog,
- Ang Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) ay isang bihirang malubhang reaksyon sa mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga karamdaman ng nervous system at maaaring mangyari kapag ang mga gamot na ito ay itinigil o itinigil nang biglaan. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng paninigas, pagkibot ng kalamnan, pangingingin, pagkabalisa, pagkalito, pagkawala ng malay, mataas na temperatura ng katawan, pagtaas ng rate ng puso at hindi matatag na presyon ng dugo,

- Isang bihirang malubhang sakit sa kalamnan (rhabdomyolysis) na nagdudulot ng pananakit, panlalambot at panghihina ng mga kalamnan, pagiging sensitibo sa presyon, at maaaring humantong sa mga problema sa bato,
- Kawalan ng kakayahang labanan ang udyok na magsagawa ng aksyon na maaaring makapinsala, na maaaring kabilang ang:
 - * malakas na salpok na sumugal nang labis sa kabila ng malubhang kahihinatnan sa personal o pamilya
 - * binago o nadagdagan ang sekswal na interes at pag-uugali na may malaking pag-aalala sa iyo o sa iba, halimbawa, isang tumaas na pagnanasa sa sex
 - * hindi mapigil na labis na pamimili o paggastos
 - * binge eating (pagkain ng maraming pagkain sa maikling panahon) o compulsive eating (pagkain ng mas maraming pagkain kaysa sa normal at higit pa sa kinakailangan upang matugunan ang iyong gutom)

Sabihin sa iyong doktor kung nararanasan mo ang alinman sa mga pag-uugaling ito; tatalakayin nila ang mga paraan ng pamamahala o pagbabawas ng mga sintomas na ito.

- Atake sa puso (kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng dibdib na parang naglalakbay sa ibang bahagi ng iyong katawan tulad ng iyong kaliwang braso, panga at leeg, igsi sa paghinga, pagkabalisa, pakiramdam na magaan ang ulo at pagduduwal (pakiramdam ng sakit) o pagsusuka (pagiging may sakit). Ito ay isang hindi karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

- Pamamaga ng colon (colitis; kasama sa mga sintomas ang matagal o patuloy na pagtatae) o pamamaga ng atay (hepatitis) na may pagdidilaw ng balat at puti ng mga mata. Ang dalas ng mga side effect na ito ay hindi alam (hindi matantya mula sa magagamit na data)

Iba pang mga side effect:

Very common(maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao):

- hindi nakokontrol na mga paggalaw na nahihirapan sa pagsasagawa ng mga boluntaryong paggalaw (dyskinesias)

• nakakaramdam ng sakit (pagduduwal)

- hindi nakakapinsalang mapula-pula-kayumangging pagkawalan ng kulay ng ihi

Karaniwan(maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao):

- labis na paggalaw (hyperkinesias), paglala ng mga sintomas ng Parkinson's disease, prolonged muscle cramps (dystonia)
- pagkakaroon ng sakit (pagsusuka), pagtatae, pananakit ng tiyan, paninigas ng dumi, tuyong bibig
- pagkahilo, pagkapagod, pagtaas ng pagpapawis, pagbagsak
- mga guni-guni (nakikita/naririnig/nararamdaman/nakakaamoy ng mga bagay na wala talaga), kawalan ng tulog, matingkad na panaginip, at pagkalito
- mga kaganapan sa sakit sa puso o arterya (hal. pananakit ng dibdib, angina)

Bihira(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao):

- mga pantal na nailalarawan sa pamumula o mga bukol sa balat
- abnormal na mga resulta sa mga pagsusuri sa function ng atay

Napakabihirang(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 tao):

- pagkabalisa
- pagbaba ng gana, pagbaba ng timbang
- mga pantal

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data):

- pagkawalan ng kulay ng balat, buhok, balbas at mga kuko

Kapag ang Entacapone ay ibinigay sa mas mataas na dosis: Sa mga dosis na 1,400 hanggang 2,000 mg bawat araw, ang mga sumusunod na epekto ay mas karaniwan:

- hindi nakokontrol na mga paggalaw na nahihirapan sa pagsasagawa ng mga boluntaryong paggalaw (dyskinesias)

• nakakaramdam ng sakit (pagduduwal)

- sakit sa tiyan

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng website ng Yellow Card Scheme www.mhra.gov.uk/yellowcard. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Entacapone

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa label, karton, bote pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon ng imbakan.

*Para sa bottle pack lamang:*Sa sandaling bukas na gamitin sa loob ng 100 araw.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Entacapone:

- Ang aktibong sangkap ay entacapone. Ang bawat tablet ay naglalaman ng 200 mg ng entacapone.
- Ang iba pang mga sangkap sa core ng tablet ay cellulose, microcrystalline, mannitol, hydroxypropylcellulose, low-substituted, magnesium stearate, hydrogenated vegetable oil.
- Ang film-coating ay naglalaman ng hypromellose, titanium dioxide (E171), glycerin, magnesium stearate, iron oxide yellow (E172), sucrose, polysorbate 80, iron oxide red (E172).

Ano ang hitsura ng Entacapone at mga nilalaman ng pack

Ang Entacapone 200 mg na film-coated na tablet ay light orange, oval-shaped, biconvex, film coated na mga tablet na may debossed na "EE200" sa isang gilid ng tablet at "M" sa kabilang panig. Naka-pack ang mga ito sa mga paltos, bote at karton na naglalaman ng maraming bote.

Binubuo ang mga blister pack ng malinaw na transparent PVC/PE/PVdC film sa isang gilid at hard tempered aluminum foil na pinahiran ng heat seal lacquer sa kabilang panig na naglalaman ng 30, 60, 100, 200, 300 o 400 na mga tablet, o isang butas-butang na blister unit dose pack na naglalaman ng 100x1 na mga tablet.

Ang mga pack ng bote ay binubuo ng puting kulay na high-density polyethylene (HDPE) na bote na may puting opaque polypropylene (PP) screw cap na naglalaman ng 30, 50, 60, 100, 250 o 500 na mga tablet.

Mga karton na naglalaman ng 200, 300, o 400 na tablet bilang 4, 6 o 8 na bote ng 50 tablet. Binubuo ang mga bote ng puting kulay na high-density polyethylene (HDPE) na bote na may puting opaque polypropylene (PP) screw cap.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing

Mylan, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, United Kingdom.




Manufacturer

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ireland.
Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan utca 1.Hungary.

Huling binago ang leaflet na ito noong 12/2020

2409635

75079324

Mylan				Date of Final	dd / mm / yy	Date of Issue	dd / mm / yy	Page Count	2 ng 2
Date/Time of Creation	12/04/21 12:46	Track-Wise PR No.	2409635	Client Market	United Kingdom	Software / Ver. No.	Adobe InDesign 15.1		
Vendor Job No.	600714	Affiliate New Code	2409635	Product Description	LIT. (B/F) ENTACAPONE TABS 200 mg GB V1				
Artwork Proof No.	1	Aff. Superseded Code	1949066						
Pharma Code	NA	Barcode Information	NA	New Material Code	75079324	Actual A/w Size	Bukas na Sukat - 170 x 400 mm		
Product Render ID No.	NA	MA Number	PL 04569/1188	ITF Barcode		Other Sizes (if any)	Laki ng nakatiklop - 170 x 40 mm		
Main Font Type - 1	Myraid Pro	SAP or SPC Code	400505398, 400505399	Superseded Code	75068959	Pitch After Every	NA		
Main Font Type - 2	NA	Packaging Site	Mylan Laboratories Ltd - FDF4 (adcherla - IN)	Component Type	Nakalimbag na Literatura	Eye / Sensor Mark	NA		
Min. Font Size	10 pt	Mfg. Lic. No. / Code No.	NA	No. of Printed Colors	1	ITF Barcode Size	NA		
Reason for Revision / Issuance	Pagbabago sa text			Printed Colors CMYK / PMS Coated / PMS Color Bridge Coated					
				Non Printed Colors					
Artwork Implementation Schedule, (✓) whichever is applicable	New Component			Equivalent with CMYK (Pantones Ref. Code)					
	Immediately (Stock of superseded component to be destroyed, if applicable)			Material of Construction	40 gsm ITC Tribeni Paper				
After Consumption of Existing (superseded) stock			Design & Style		Ibigay ang Lea et sa Folded Form bilang Iminungkahing Sukat				
Others (specify)									
LABEL CONTROL / BUSINESS DEVELOPMENT / REGULATORY / MARKETING				Prepared By	Checked By	Approved By			
Sign Offs				Packaging Technical Services		Production	Regulatory Affairs	Quality Assurance	
	Digital Signature	Digital Signature	Digital Signature	Digital Signature	Name Sign dd/mm/yy	Name Sign dd/mm/yy	Name Sign dd/mm/yy	Name Sign dd/mm/yy	Name Sign dd/mm/yy
Revision History	06.04.2021 - Kld share Petsa / Puna Petsa / Puna Petsa / Puna			Petsa / Puna Petsa / Puna Petsa / Puna		Petsa / Puna Petsa / Puna Petsa / Puna Petsa / Puna			
FORM-000647341_00-12-20				Petsa / Puna					