

Source : Drugs.com

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

TABLETAS MIGRIL

Sustancia(s) activa(s):CAFEÍNA / CLORHIDRATO DE CICLIZINA / TARTRATO DE ERGOTAMINA

(26,25 cm)

No se requiere código neutral en las ilustraciones del folleto.

cuarto pliegue

(26,25 cm)

3er pliegue

(26,25 cm)

segundo pliegue

(26,25 cm)

1er pliegue

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

MIGRIL® TABLETAS

Tartrato de Ergotamina 2mg, Clorhidrato de Ciclizina 50mg e
Hidrato de Cafeína 100mg

Lea todo el prospecto detenidamente
antes de empezar a tomar este
medicamento.

- Conserve este prospecto. Es posible
que deba volver a leerlo mientras recibe
su tratamiento.

- Si tiene más preguntas, consulte
a su médico o
farmacéutico.

- Este medicamento le ha sido
recetado. No lo transmita a otros.

Puede hacerles daño, incluso si sus
síntomas son los mismos que los suyos.

- Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso
no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

En este folleto:

1. Qué es Migril® Comprimidos y para qué se utiliza

2. Antes de tomar Migril® Comprimidos

3. Cómo usar Migril® Comprimidos

4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Migril® Comprimidos

6. Más información

1. Qué es Migril® Comprimidos y para qué se utiliza

octavo pliegue

(26,25 cm)

séptimo pliegue

(26,25 cm)

sexto pliegue

(26,25 cm)

quinto pliegue

(26,25 cm)

El nombre de su medicamento es Migril® Tabletas; estos comprimidos pertenecen a un grupo
de medicamentos denominados vasoconstrictores y antieméticos. Los vasoconstrictores
causan el estrechamiento de los vasos sanguíneos y los antieméticos evitan que se sienta y se
sienta mal.

Migril® Comprimidos se utiliza en el tratamiento de las migrañas para
aliviar los síntomas y evitar que el ataque empeore.

2. Antes de tomar Migril® Tabletas No
debe tomar Migril® Tabletas si:

- es alérgico (hipersensible) al tartrato de ergotamina, al clorhidrato de
ciclizina, al hidrato de cafeína o a cualquiera de los demás componentes de
este medicamento (ver sección 6, Información adicional)

- padece una enfermedad renal o hepática
- sufre de angina de pecho, enfermedad coronaria o presión arterial alta
- sufre de arteritis temporal
- padece una afección denominada porfiria que afecta al hígado, la piel o la sangre
- tiene problemas con su circulación o calambres como dolores en la pierna causados por mala circulación
- tiene una tiroides hiperactiva (hipertiroidismo)
- está tomando medicamentos utilizados para tratar infecciones bacterianas (p. ej., quinupristina, dalfopristim, azitromicina, eritromicina o claritromicina)
- está tomando medicamentos utilizados para tratar infecciones virales (inhibidores de la proteasa, por ejemplo, amprenavir, ritonavir, nelfinavir o indinavir)
- está tomando medicamentos utilizados para tratar infecciones fúngicas (p. ej., ketoconazol o itraconazol)
- está tomando medicamentos utilizados para tratar las úlceras (p. ej., cimetidina)
- está embarazada, desea quedarse embarazada o está amamantando. Las tabletas Migril® no se recomiendan para niños.

Hable con su médico o farmacéutico si:

- usted tiene hepatitis

-
-
-
-
-
-
-

tienes anemia

tiene problemas con su corazón tiene

una obstrucción en el intestino tiene

una glándula prostática inflamada

sufre de glaucoma (presión alta en el globo ocular) tiene

problemas para orinar

eres mayor

Tomar otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Los siguientes medicamentos pueden afectar o verse afectados por el tratamiento con

Comprimidos Migril®:

- betabloqueantes: medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca o la angina de pecho y pueden haber sido prescritos para el tratamiento de las migrañas
- otros medicamentos utilizados para tratar las migrañas (por ejemplo, zolmitriptán, almotriptán, sumatriptán, rizatriptán, frovatriptán). Es importante no tomar estos medicamentos durante 24 horas después de tomar Migril® Tabletas y no tomar Migril® Tabletas durante 6 horas después de tomar cualquiera de estos medicamentos.

- eletriptán (utilizado para tratar las migrañas). Es importante no tomar este medicamento durante 24 horas después de tomar Migril® Tabletas y no tomar Migril® Tabletas durante 24 horas después de tomar eletriptán.

- saquinavir (usado en el tratamiento del VIH y otras infecciones virales)

- metronidazol (usado para tratar ciertos tipos de infecciones)

- mexiletina (usada para tratar irregularidades del corazón)

- disulfiram (utilizado para tratar la dependencia del alcohol)

- litio (utilizado para tratar la enfermedad maníaco depresiva)

- clotrimazol y fluconazol (utilizados para tratar infecciones fúngicas)

- fenitoína (utilizada en el tratamiento de la epilepsia)

- trinitrato de glicerilo (utilizado para aliviar la angina)

- diazepam (usado para tratar la ansiedad o el insomnio)

- atropina (utilizada para tratar el espasmo intestinal o como premedicación antes de la anestesia)

- anticonceptivo oral (La Píldora), inyecciones de hormonas o tratamiento de reemplazo hormonal (TRH)

- medicamentos utilizados para tratar las sibilancias (p. ej., teofilina) y descongestionantes (p. ej., fenilefrina o pseudoefedrina)

- medicamentos utilizados para tratar la depresión (por ejemplo, nefazodona, fluoxetina y fluvoxamina), antidepresivos tricíclicos (por ejemplo, dotiepina, amitriptilina) e inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO, por ejemplo, fenelzina)

- otros medicamentos utilizados para tratar infecciones bacterianas como las quinolonas (p. ej., ciprofloxacino) o las tetraciclinas.

Toma de Migril® Tabletas con alimentos y bebidas

- Se debe evitar el jugo de toronja mientras se toman estas tabletas, ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios.

- **No fume ni beba alcohol mientras toma este medicamento. Embarazo y lactancia**

No debe tomar Migril® Tabletas si está embarazada, desea quedar embarazada o está amamantando.

Conducción y uso de maquinaria

Es posible que estos comprimidos le produzcan somnolencia. No conduzca ni maneje maquinaria si está afectado.

Información importante sobre algunos de los componentes de Migril® Tabletas

Este medicamento contiene lactosa y glucosa. Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento).

103819/4

PRODUCTO DE LA CAJA DE VERIFICACIÓN DE

LA OBRA DE ARTE:

CLIENTE :

CÓDIGO FP:

UBICACIÓN DE LA PLANTA :

DIMENSIONES :

FARMACODIGO No. :

CÓDIGO SAP No. :

TAMAÑO DE FUENTE DE TEXTO:

NOMBRE DE ARCHIVO:

SOFTWARE :

TIPOGRAFÍAS :

OBRA (DETALLES)

RECIBIDO EL :

REVISIÓN DE LA PRUEBA:

Negro

Migril Comprimidos - 100 Comprimidos

Wockhardt España

FP2128

Daman (Kadaiya)

(ancho) 177 x (alto) 210 mm

2587

222744

7 puntos

Tabletas Migril_Folleto_103819-3.ai

Adobe Illustrator CS5

Arial Regular / Negrita 25 de julio y

3 de agosto de 2017

R 1er PDF enviado el - 3 DE AGOSTO. 2017 R

2do PDF enviado el - 8 DE AGOSTO. 2017

CONTROL DE CAMBIOS: Cambios de versión debido a cambios en:

Tamaño/Diseño

Regulador

No regulatorio

Cambios en detalle: • Modificación del texto ('metabisulfato' a 'metabisulfato');

'sulfosuccinato' a 'sulfosuccinato' y se eliminó la palabra adicional 'tomar' del punto n.º 6)

También debe buscar ayuda médica de inmediato si:

- si nota coloración azulada, frialdad, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies
- si tiene dolor de cabeza la mayoría de los días y solo se alivia tomando más de este medicamento.

Debe informar a su médico o farmacéutico si presenta alguno de los siguientes efectos adversos:

- dolores de cabeza, náuseas, vómitos, boca seca
- estreñimiento, dolores de estómago, diarrea
- somnolencia, mareos (incluyendo vértigo)
- confusión, ansiedad o depresión
- experimentar alucinaciones
- trastornos del sueño, incluido el insomnio
- dificultad para orinar
- calambres musculares, dolores en las articulaciones o dolor en las piernas
- dolor en el abdomen e hinchazón en una pierna
- hinchazón de la piel o picazón
- frialdad y palidez de manos y pies u hormigueo
- una sensación de picazón en la piel o entumecimiento
- coloración amarillenta de la piel y sensación general de debilidad
- visión borrosa o cualquier otro trastorno visual (que no crea que esté relacionado con su migraña).

Otros efectos secundarios que se han informado incluyen:

- un aumento o disminución de la presión arterial, desmayos
- pulso rápido y débil, latidos cardíacos lentos o irregulares, o aumento de la sensación de los latidos del corazón

1er pliegue

(26,25 cm)

segundo pliegue

(26,25 cm)

3er pliegue

(26,25 cm)

cuarto pliegue

(26,25 cm)

6. Más información

Aspecto de los comprimidos de Migril® y contenido del envase Cada comprimido redondo blanco está marcado con una línea ranurada, CP y 'A4A' en el mismo lado. Estos están disponibles en botellas de 100 tabletas.

Otros formatos

Para escuchar o solicitar una copia de esta información en Braille, letra grande o audio, llame gratis al: 0800 198 5000 (solo en el Reino Unido)

quinto pliegue

Composición de Migril® Tabletas

Los principios activos son: tartrato de ergotamina 2 mg, clorhidrato de ciclizina 50 mg e hidrato de cafeína 100 mg.

Los demás componentes son: lactosa, almidón de maíz, glucosa líquida y glucosa, amaranto, sulfosuccinato de dioctilo y sodio, gelatina, metabisulfato de sodio y estearato de magnesio.

(26,25 cm)

Como puede ocurrir con cualquier medicamento, algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica. Si experimenta alguno de los siguientes, busque ayuda médica de inmediato:

- sarpullido, picazón, dificultad para respirar.

Los medicamentos no deben desecharse en aguas residuales o residuos domésticos. Pregúntele a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

sexto pliegue

Al igual que todos los medicamentos, Migril® Tabletas puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. No exceda la dosis máxima ni tome los comprimidos con más frecuencia de lo que se indica en este prospecto, esto podría provocar dependencia de este medicamento, así como otros efectos adversos graves.

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.

- No almacenar a más de 25°C. Conservar en el envase original no

transfiera sus tabletas a otro contenedor.

- No tome este medicamento después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta o si muestra signos de deterioro, como decoloración. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes.

(26,25 cm)

4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Migril® Comprimidos

Esté preparado para dar la siguiente información: Nombre del producto

Número de referencia

Tabletas Migril

29831/0090

Este es un servicio proporcionado por el Real Instituto Nacional para Personas Ciegas. Titular de la autorización de comercialización:

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Reino Unido.

Fabricante:

CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Reino Unido.

séptimo pliegue

Si olvidó tomar Migril® Comprimidos

Si olvida una dosis, tome otra tan pronto como lo recuerde. Si es casi la hora de su próxima dosis, entonces no tome la dosis olvidada. NUNCA tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Programa de Tarjeta Amarilla en www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

(26,25 cm)

Si ha tomado más Migril® Comprimidos del que debiera

Si usted (otra persona o un niño) toma más comprimidos de los que debe, póngase en contacto con el servicio de urgencias del hospital más cercano o con su médico inmediatamente. Lleve siempre consigo el recipiente, aunque esté vacío.

glaucoma de ángulo cerrado

Reducción del suministro de sangre o coagulación en las arterias del cuerpo o bloqueo cerebral de las arterias del corazón.

dolor en el pecho o dificultad para respirar

engrosamiento de los tejidos de los pulmones

temblores y convulsiones

gangrena

fiebre azulada de la

piel

Cambios en la sangre que causan una tendencia a sangrar o magullarse fácilmente.

Número de licencia del producto: PL 29831/0090 Este

folleto fue revisado por última vez en 08/2015.

Migril® es una marca registrada de CP Pharmaceuticals Limited ©1998

103819/4

222744

octavo pliegue

Tome siempre Migril® Comprimidos como le haya indicado su médico. Su médico decidirá la dosis adecuada para usted; esto estará en la etiqueta del farmacéutico. Compruébelo con cuidado, le dirá cuántos comprimidos debe tomar y con qué frecuencia.

Es importante que no tome más de la dosis acordada con su médico.

- La dosis habitual para adultos es un comprimido lo antes posible después de los primeros signos de migraña.
- En algunos casos, pueden ser necesarias dosis adicionales de medio a un comprimido a intervalos de media hora.
- No tome más de 4 tabletas durante un ataque y no más de 3 tabletas en un período de 24 horas, debe dejar un espacio de al menos 4 días antes de tomar más tabletas.
- No tome más de 6 tabletas en una semana.

- No tome más de dos cursos de Migril® Tabletas en un mes. No tome Migril® Tabletas de forma regular o para prevenir un ataque de migraña. El uso regular puede provocar dependencia y 'dolores de cabeza de rebote' que, a su vez, pueden llevarlo a tomar tabletas con más frecuencia.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(26,25 cm)

3. Cómo usar Migril® Comprimidos

Más información

Siempre consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que la información que se muestra en esta página se aplica a sus circunstancias personales.