

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

הזרקת Ertapenem מבוטא בתור (er" ta pen' em)

היי האם נרשמה תרופה זו?

הזרקת Ertapenem משמשת לטיפול בזיהומים חמורים מסוימים, כולל דלקת ריאות ודרכי השתן, עור, כף רגל סוכרתית, זיהומים גינקולוגיים, אגן ובטן (אזור הקיבה), הנגרמים על ידי חיידקים. הוא משמש גם למניעת זיהומים בעקבות ניתוח המעי הגס. Ertapenem הוא בקבוצה של תרופות הנקראות אנטיביוטיקה קרבפנם. זה עובד על ידי הרג חיידקים.

אנטיביוטיקה כגון זריקת ertapenem לא תעבוד עבור הצטננות, שפעת או זיהומים ויראליים אחרים. נטילת אנטיביוטיקה כאשר אין בהן צורך מגדילה את הסיכון לחלות מאוחר יותר בזיהום המתנגד לטיפול אנטיביוטי.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

הזרקת Ertapenem מגיעה כאבקה לערבוב עם נוזל להזרקה לווריד (לווריד) או לשריר (לשריר). זה מוזרק (מוזרק לאט) לווריד במשך תקופה של לפחות 30 דקות פעם או פעמיים ביום עד 14 ימים. זה גם יכול להינתן פעם או פעמיים ביום תוך שרירית עד 7 ימים. משך הטיפול תלוי בסוג הזיהום המטופל. הרופא שלך יגיד לך כמה זמן להשתמש בהזרקת ertapenem. לאחר שמצבך ישתפר, הרופא שלך עשוי להחליף אותך לאנטיביוטיקה אחרת שתוכל לקחת דרך הפה כדי להשלים את הטיפול.

אתה יכול לקבל זריקת ertapenem בבית חולים, או שאתה יכול להשתמש בתרופה בבית. אם תשתמש בהזרקת ertapenem בבית, השתמש בה בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא שלך או מספק שירותי בריאות אחר להסביר כל חלק שאינך מבין. השתמש בהזרקת ertapenem בדיוק לפי ההוראות. אין להשתמש יותר או פחות ממנו או להשתמש בו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך.

אם תשתמש בהזרקת ertapenem בבית, הרופא שלך יראה לך כיצד להשתמש בתרופה. ודא שאתה מבין את ההנחיות האלה, ושאל את ספק שירותי הבריאות שלך אם יש לך שאלות כלשהן. שאל את ספק שירותי הבריאות שלך מה לעשות אם יש לך בעיות כלשהן בהזרמת זריקת ertapenem.

אתה אמור להתחיל להרגיש טוב יותר במהלך הימים הראשונים של הטיפול עם הזרקת ertapenem. אם התסמינים שלך לא משתפרים או אם הם מחמירים, התקשר לרופא שלך.

השתמש בהזרקת ertapenem עד שתסיים את המרשם, גם אם אתה מרגיש טוב יותר. אם תפסיק להשתמש בהזרקת ertapenem מוקדם מדי או אם תדלג על מינונים, ייתכן שהזיהום שלך לא יטופל לחלוטין והחיידקים עשויים להיות עמידים לאנטיביוטיקה.

בקש מהרוקח או הרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת זריקת ארטאפנם,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לארטפנם; אנטיביוטיקה אחרת של קרבפנם כמו אימיפנם/צילסטטין (פרימקסין), דוריפנם (דוריבקס) או מרופנם (Merrem); חומרי הרדמה מקומיים כגון (Duranest) (etidocaine), (Marcaine) (bupivacaine, לידוקאין), (Carbocaine, Prolocaine), (mepivacaine), או פרילוקאין (Citanest); צפלוספורינים כגון (Duricef) (cefadroxil), (Ceclor) (cefaclor), או (Keflex) (cephalexin), אנטיביוטיקה אחרת בטא-לקטם כגון פניצילין או אמוקסיצילין (Amoxil, Trimox, Wymox), כל תרופה אחרת, או כל אחד מהמרכיבים בהזרקת ertapenem. שאל את הרוקח שלך או בדוק את פרטי המטופל של היצרן לקבלת רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: פרובנציד (Probalan) או חומצה ולפרואית (Depakene, Depakote). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או יש לך אי פעם נגעים במוח, התקפים או מחלת כליות.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן השימוש בהזרקת ארטאפנם, התקשר לרופא שלך.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

השתמש במנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין להשתמש במינון כפול כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

הזרקת Ertapenem עלולה לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- בחילה
- הקאה
- שלשול
- עצירות

- כאב ראש
- סתירות
- כאב בטן
- חום
- להשתעל
- בלבול
- קושי להירדם או להישאר ישן
- אדמומיות או גירוי באתר ההזרקה
- נפיחות, אדמומיות, צריבה, גירוד או גירוי של הנרתיק
- נפיחות של הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים התחתונות

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה כל אחד מהתסמינים הללו, הפסק להשתמש בהזרקת ertapenem והתקשר לרופא שלך מיד או לקבל טיפול רפואי חירום:

- שלשול חמור (צואה מימית או מדממת) שעלולים להתרחש עם או בלי חום והתכווצויות בטן (עשויים להתרחש עד חודשיים או יותר לאחר הטיפול)
- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- התקפים
- עייפות או חולשה חריגים
- עור חיוור
- דופק מהיר או לא סדיר
- קוצר נשימה
- כאב בחזה

הזרקת Ertapenem עלולה לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

אם תזריק זריקת ertapenem בבית, הרופא שלך יגיד לך כיצד לאחסן את התרופה שלך. אחסן את התרופה רק לפי ההוראות. ודא שאתה מבין כיצד לאחסן את שלך

טיפול תרופתי כמו שצריך.

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help>] <https://www.poisohelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול:

- בחילה
- שלשול
- סתבחות

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך להזרקת ertapenem.

אל תיתן לאף אחד אחר להשתמש בתרופות שלך. המרשם שלך כנראה אינו ניתן למילוי חוזר. אם עדיין יש לך תסמינים של זיהום לאחר שסיימת להשתמש בהזרקת ertapenem, התקשר לרופא שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- אינוואנץ®

מתוקן לאחרונה - 15/02/2017

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022