



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [エルタペネム注射](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

## エルタペネム注射

(er "ta pen'em) と発音します

### なぜこの薬が処方されているのですか？

エルタペネム注射は、肺炎や尿路、皮膚、糖尿病性足、婦人科、骨盤、腹部（胃の領域）の感染症など、細菌によって引き起こされる特定の重篤な感染症の治療に使用されます。また、結腸直腸手術後の感染症の予防にも使用されます。エルタペネムは、カルバペネム系抗生物質と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それはバクテリアを殺すことによって働きます。

エルタペネム注射などの抗生物質は、風邪、インフルエンザ、またはその他のウイルス感染症には効果がありません。必要のないときに抗生物質を服用すると、抗生物質治療に抵抗する感染症にかかるリスクが高まります。

### わあ、この薬を使うべきですか？

エルタペネム注射は、静脈内（静脈内）または筋肉内（筋肉内）に注射される液体と混合される粉末として提供されます。それは、少なくとも30分の期間にわたって1日1回または2回、最大14日間、静脈内に注入（ゆっくりと注入）されます。また、1日1回または2回、筋肉内に最大7日間投与することもできます。治療期間は、治療する感染症の種類によって異なります。医師は、エルタペネム注射の使用期間を教えてください。あなたの状態が改善した後、あなたの医者はあなたがあなたの治療を完了するためにあなたが口から取ることができる別の抗生物質にあなたを切り替えるかもしれません。

あなたは病院でエルタペネム注射を受けるかもしれません、あるいはあなたは家で薬を使うかもしれません。自宅でエルタペネム注射を使用する場合は、毎日ほぼ同じ時間に使用してください。処方ラベルの指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または他の医療提供者に依頼してください。指示どおりにエルタペネム注射を使用してください。それを多かれ少なかれ使用したり、医師の処方よりも頻繁に使用したりしないでください。

自宅でエルタペネム注射を使用する場合は、医療提供者が薬の使用方法を説明します。これらの指示を理解していることを確認し、質問がある場合は医療提供者に尋ねてください。エルタペネム注射の注入に問題がある場合は、医療提供者に何をすべきか尋ねてください。

エルタペネム注射による治療の最初の数日間は気分が良くなるはずですが、症状が改善しない、または悪化した場合は、医師にご相談ください。

気分が良くなったとしても、処方完了するまでエルタペネム注射を使用してください。エルタペネム注射の使用をすぐにやめたり、服用をスキップしたりすると、感染症が完全に治療されず、細菌が抗生物質に耐性を持つようになる可能性があります。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

### エルタペネム注射を受ける前に、

- エルタペネムにアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。イミペネム/シラスタチン（プリマキシン）、ドリペネム（ドリペネム）、またはメロペネム（メレム）などの他のカルバペネム抗生物質。ピピバカイン（マルカイン）、エチドカイン（デュラネスト）、リドカイン、メピバカイン（カルボカイン、プロロカイン）、またはプリロカイン（シタネスト）などの局所麻酔薬。セファクロル（Ceclor）、セファドロキシル（Duricef）、またはセファレキシン（Keflex）などのセファロスポリン、ペニシリンまたはアモキシシリン（Amoxil、Trimox、Wymox）などの他のベータラクタム抗生物質、その他の薬剤、またはエルタペネム注射の成分。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、製造元の患者情報を確認してください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：プロベネシド（プロバラン）またはバルプロ酸（デパケン、デパコート）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 脳の病変、発作、または腎臓病があるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。エルタペネム注射を使用しているときに妊娠した場合は、医師に連絡してください。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

### 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は覚えてきたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。逃したものを補うために2回分を使用しないでください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

エルタペネム注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 便秘

- 頭痛
- めまい
- 胃痛
- 熱
- 咳
- 錯乱
- 眠りにつくことや眠り続けることの難しさ
- 注射部位の発赤または炎症
- 腫の腫れ、発赤、灼熱感、かゆみ、または炎症
- 手、足、足首、または下肢の腫れ

**いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、エルタペネム注射の使用を中止し、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。**

- 発熱や腹痛の有無にかかわらず発生する可能性のある重度の下痢（水様性または血便）（治療後2か月以上経過すると発生する可能性があります）
- じんましん
- 発疹
- かゆみ
- 呼吸困難または嚔下困難
- 発作
- 異常な倦怠感または脱力感
- 薄い肌
- 速いまたは不規則な心拍
- 呼吸困難
- 胸痛

エルタペネム注射は他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## **この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？**

自宅でエルタペネム注射を行う場合は、医療提供者が薬の保管方法を教えてくれます。指示通りにのみ薬を保管してください。保存方法を理解していることを確認してください

適切に薬。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門にお問い合わせください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。 <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

- 吐き気
- 下痢
- めまい

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、エルタペネム注射に対する体の反応を確認するために、特定の臨床検査を命じることがあります。

他の人にあなたの薬を使わせないでください。あなたの処方箋はおそらく詰め替え可能ではありません。エルタペネム注射の使用を終了した後も感染の症状が続く場合は、医師に連絡してください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- インバンツ®

最終改訂日-2017年2月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日