

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Injeção de Ertapenem

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

Injeção de ertapenem

pronunciado como (er" ta pen'em)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de ertapenem é usada para tratar certas infecções graves, incluindo pneumonia e infecções do trato urinário, pele, pé diabético, infecções ginecológicas, pélvicas e abdominais (área do estômago), causadas por bactérias. Também é usado para a prevenção de infecções após cirurgia colorretal. Ertapenem está em uma classe de medicamentos chamados antibióticos carbapenem. Funciona matando as bactérias.

Antibióticos como a injeção de ertapenem não funcionam para resfriados, gripes ou outras infecções virais. Tomar antibióticos quando não são necessários aumenta o risco de contrair uma infecção mais tarde que resista ao tratamento com antibióticos.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de ertapenem vem como um pó para ser misturado com líquido a ser injetado por via intravenosa (na veia) ou intramuscular (no músculo). É infundido (injetado lentamente) por via intravenosa durante um período de pelo menos 30 minutos uma ou duas vezes ao dia por até 14 dias. Também pode ser administrado uma ou duas vezes ao dia por via intramuscular por até 7 dias. A duração do tratamento depende do tipo de infecção a ser tratada. O seu médico irá dizer-lhe durante quanto tempo deve utilizar a injeção de ertapenem. Depois que sua condição melhorar, seu médico pode mudar para outro antibiótico que você pode tomar por via oral para completar seu tratamento.

Você pode receber injeção de ertapenem em um hospital ou pode usar a medicação em casa. Se você estiver usando injeção de ertapenem em casa, use-o aproximadamente no mesmo horário todos os dias. Siga as instruções na etiqueta da receita com cuidado e peça ao seu médico ou outro profissional de saúde para explicar qualquer parte que você não entenda. Use a injeção de ertapenem exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Se você estiver usando a injeção de ertapenem em casa, seu médico lhe mostrará como usar o medicamento. Certifique-se de que compreende estas instruções e pergunte ao seu médico se tiver alguma dúvida. Pergunte ao seu médico o que fazer se tiver algum problema com a injeção de ertapenem.

Você deve começar a se sentir melhor durante os primeiros dias de tratamento com injeção de ertapenem. Se os seus sintomas não melhorarem ou se piorarem, ligue para o seu médico.

Use a injeção de ertapenem até terminar a prescrição, mesmo que se sinta melhor. Se você parar de usar a injeção de ertapenem muito cedo ou se pular doses, sua infecção pode não ser completamente tratada e as bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar a injeção de ertapenem,

- informe o seu médico e farmacêutico se tem alergia ao ertapenem; outros antibióticos carbapenêmicos, como imipenem/cilastatina (Primaxin), doripenem (Doribax) ou meropenem (Merrem); anestésicos locais tais como bupivacaína (Marcaína), etidocaína (Duranest), lidocaína, mepivacaína (Carbocaína, Prolocaína) ou prilocaína (Citanest); cefalosporinas, como cefaclor (Ceclor), cefadroxil (Duricef) ou cefalexina (Keflex), outros antibióticos beta-lactâmicos, como penicilina ou amoxicilina (Amoxil, Trimox, Wymox), quaisquer outros medicamentos ou qualquer um dos ingredientes da injeção de ertapenem. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do paciente do fabricante para obter uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: probenecida (Probalan) ou ácido valpróico (Depakene, Depakote). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se você tem ou já teve lesões cerebrais, convulsões ou doença renal.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto estiver usando a injeção de ertapenem, ligue para o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Use a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não use uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de ertapenem pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- vômito
- diarreia
- constipação

- dor de cabeça
- tontura
- dor de estômago
- febre
- tosse
- confusão
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- vermelhidão ou irritação no local da injeção
- inchaço, vermelhidão, queimação, coceira ou irritação da vagina
- inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, pare de utilizar a injeção de ertapenem e contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- diarreia grave (fezes aquosas ou com sangue) que pode ocorrer com ou sem febre e cólicas estomacais (pode ocorrer até 2 meses ou mais após o tratamento)
- urticária
- irritação na pele
- coceira
- dificuldade em respirar ou engolir
- convulsões
- cansaço ou fraqueza incomum
- pele pálida
- batimentos cardíacos rápidos ou irregulares
- falta de ar
- dor no peito

A injeção de ertapenem pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Se você for injetar a injeção de ertapenem em casa, seu médico lhe dirá como armazenar sua medicação. Armazene sua medicação apenas conforme indicado. Certifique-se de entender como armazenar seus

medicação corretamente.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de overdose podem incluir:

- náusea
- diarreia
- tontura

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo à injeção de ertapenem.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Sua receita provavelmente não é recarregável. Se você ainda tiver sintomas de infecção após terminar de usar a injeção de ertapenem, ligue para o seu médico.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Invanz®

Última revisão - 15/02/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022