

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Ertapenem-injektion

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

## Ertapenem injektion

uttalas som (er" ta pen' em)

### hur är denna medicin utskriven?

Ertapenem-injektion används för att behandla vissa allvarliga infektioner, inklusive lunginflammation och urinvägar, hud, diabetiska fot, gynekologiska, bäcken- och buken (magområdet) infektioner, som orsakas av bakterier. Det används också för att förebygga infektioner efter kolorektal kirurgi. Ertapenem är i en klass av läkemedel som kallas karbapenem-antibiotika. Det fungerar genom att döda bakterier.

Antibiotika som injektion med ertapenem fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att ta antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

### hur ska detta läkemedel användas?

Ertapenem-injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven) eller intramuskulärt (i en muskel). Det infunderas (injiceras långsamt) intravenöst under en period av minst 30 minuter en eller två gånger om dagen i upp till 14 dagar. Det kan också ges en eller två gånger om dagen intramuskulärt i upp till 7 dagar. Behandlingens längd beror på vilken typ av infektion som behandlas. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska använda ertapenem-injektion. När ditt tillstånd har förbättrats kan din läkare byta till ett annat antibiotikum som du kan ta genom munnen för att slutföra behandlingen.

Du kan få ertapenem-injektion på ett sjukhus, eller så kan du använda medicinen hemma. Om du kommer att använda ertapenem-injektion hemma, använd den vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller annan vårdgivare att förklara någon del du inte förstår. Använd ertapenem injektion exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer eller mindre av det eller använd det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du kommer att använda ertapenem-injektion hemma, kommer din läkare att visa dig hur du använder medicinen. Se till att du förstår dessa anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor. Fråga din vårdgivare vad du ska göra om du har problem med att infundera ertapenem-injektion.

Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med ertapeneminjektion. Om dina symtom inte förbättras eller om de blir värre, kontakta din läkare.

Använd ertapenem injektion tills du avslutar receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar använda ertapenem-injektion för tidigt eller om du hoppar över doser kanske din infektion inte behandlas fullständigt och bakterierna kan bli resistenta mot antibiotika.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

#### **användningsområdena för detta läkemedel**

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### **bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?**

#### **Innan du tar ertapenem-injektion,**

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ertapenem; andra karbapenemantibiotika såsom imipenem/cilastatin (Primaxin), doripenem (Doribax) eller meropenem (Merrem); lokalanestetika såsom bupivakain (Marcaine), etidokain (Duranest), lidokain, mepivakain (karbokain, prolokain) eller prilokain (Citanest); cefalosporiner såsom cefaclor (Ceclor), cefadroxil (Duricef) eller cefalexin (Keflex), andra betalaktamantibiotika som penicillin eller amoxicillin (Amoxil, Trimox, Wymox), andra mediciner eller någon av ingredienserna i ertapenem-injektion. Fråga din apotekspersonal eller kontrollera tillverkarens patientinformation för en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: probenecid (Probalan) eller valproinsyra (Depakene, Depakote). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har hjärnskador, kramper eller njursjukdomar.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du använder ertapenem-injektion, kontakta din läkare.

### **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

#### **hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?**

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Använd inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

### **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Ertapeneminjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- illamående
- kräkningar
- diarre
- förstoppning

- huvudvärk
- yrsel
- magont
- feber
- hosta
- förvirring
- svårt att somna eller att sova
- rodnad eller irritation på injektionsstället
- svullnad, rodnad, sveda, klåda eller irritation i slidan
- svullnad av händer, fötter, vristar eller underben

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, sluta använda ertapenem-injektion och kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:**

- svår diarré (vattnig eller blodig avföring) som kan uppstå med eller utan feber och magkramper (kan uppstå upp till 2 månader eller mer efter din behandling)
- nässel-feber
- utslag
- klåda
- svårigheter att andas eller svälja
- anfall
- ovanlig trötthet eller svaghet
- blek hud
- snabba eller oregelbundna hjärtslag
- andnöd
- bröstsmärta

Ertapeneminjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

## **hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?**

Om du ska injicera ertapenem-injektion hemma, kommer din läkare att berätta för dig hur du ska förvara din medicin. Förvara din medicin endast enligt anvisningarna. Se till att du förstår hur du förvarar din

medicinering på rätt sätt.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

## n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

### Symtom på överdosering kan inkludera:

- illamående
- diarre
- yrsel

## hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på ertapenem-injektion.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på. Om du fortfarande har symtom på infektion efter att du slutat använda ertapenem-injektion, kontakta din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## rand namn

- Invanz®

Senast reviderad - 2017-02-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists  
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering  
för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022