

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

حقن إرتابينيم تنطق باسم (إيه "تا بين" إم)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم حقن Ertapenem لعلاج بعض أنواع العدوى الخطيرة ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والمسالك البولية والجلد والقدم السكرية والتهابات أمراض النساء والحوض والبطن (منطقة المعدة) التي تسببها البكتيريا. كما أنها تستخدم للوقاية من الالتهابات بعد جراحة القولون والمستقيم. ينتمي Ertapenem إلى فئة من الأدوية تسمى المضادات الحيوية carbapenem. يعمل عن طريق قتل البكتيريا.

لن تعمل المضادات الحيوية مثل حقن الإرتابينيم مع نزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي عدوى فيروسية أخرى. يؤدي تناول المضادات الحيوية عندما لا تكون هناك حاجة إليها إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي حقن Ertapenem على شكل مسحوق يخلط مع سائل ليحقن عن طريق الوريد (في الوريد) أو في العضل (في العضلات). يتم تسريبه (حقنه ببطء) عن طريق الوريد لمدة لا تقل عن 30 دقيقة مرة أو مرتين يومياً لمدة تصل إلى 14 يوماً. يمكن أيضاً إعطاؤه مرة أو مرتين يومياً في العضل لمدة تصل إلى 7 أيام. يعتمد طول العلاج على نوع العدوى التي يتم علاجها. سيخبرك طبيبك بمدة استخدام حقن الإرتابينيم. بعد أن تتحسن حالتك ، قد يحولك طبيبك إلى مضاد حيوي آخر يمكنك تناوله عن طريق الفم لإكمال علاجك.

قد تتلقى حقن الإرتابينيم في المستشفى ، أو يمكنك استخدام الدواء في المنزل. إذا كنت ستستخدم حقنة الإرتابينيم في المنزل ، فاستخدمها في نفس الوقت (الأوقات) تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو مقدم رعاية صحية آخر شرح أي جزء لا تفهمه. استخدم حقن الإرتابينيم تماماً وفقاً للتوجيهات. لا تستخدم أكثر أو أقل منه أو تستخدمه أكثر مما وصفه طبيبك.

إذا كنت ستستخدم حقن الإرتابينيم في المنزل ، فسوف يوضح لك مقدم الرعاية الصحية كيفية استخدام الدواء. تأكد من فهمك لهذه التوجيهات ، واسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما يجب عليك فعله إذا كان لديك أي مشاكل في حقن حقن الإرتابينيم.

يجب أن تبدأ في الشعور بالتحسن خلال الأيام القليلة الأولى من العلاج بحقن الإرتابينيم. إذا لم تتحسن الأعراض الخاصة بك أو إذا ساءت ، اتصل بطبيبك.

استخدم حقن الإرتابينيم حتى تنتهي من الوصفة الطبية ، حتى لو شعرت بتحسن. إذا توقفت عن استخدام حقن الإرتابينيم في وقت قريب جداً أو إذا تخطيت الجرعات ، فقد لا تتم معالجة العدوى بشكل كامل وقد تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل أخذ حقن الإرتابينيم ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الإرتابينيم ؛ المضادات الحيوية الأخرى من carbapenem مثل Doribax (doripenem) ، Primaxin (imipenem / cilastatin) ، أو Merrem (Meropenem) ؛ التخدير الموضعي مثل بوبيفاكاين (ماركين) ، إيتيدوكاين (دورانيست) ، ليدوكاين ، ميبيفاكين (كاربوكاين ، برلوكاين) ، أو بريلوكاين (سيتانيس) ؛ السيفالوسبورينات مثل سيفاكلور (سيكلور) ، سيفادروكسيل (دوريسيف) ، أو سيفالوكسين (كيفليكس) ، مضادات حيوية أخرى من بيتا لكتام مثل البنسلين أو أموكسيسيلين (أموكسيل ، تريموكس ، ويموكس) ، أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات حقن الإرتابينيم. اسأل الصيدلي أو تحقق من معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة للحصول على قائمة بالمكونات.

- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: البروبينسيد (بروبالان) أو حمض الفالبرويك (ديباكين ، ديباكوت). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من آفات دماغية أو نوبات مرضية أو أمراض الكلى.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام حقن الإرتابينيم ، فاتصل بطبيبك.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

استخدم الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب حقن Ertapenem آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- إسهال
- إمساك

- صداع الراس
- دوخة
- آلام في المعدة
- حمى
- سعال
- ارتباك
- صعوبة في النوم أو البقاء نائماً
- احمرار أو تهيج في موقع الحقن
- تورم أو احمرار أو حرقة أو حكة أو تهيج في المهبل
- تورم في اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو أسفل الساقين

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فتوقف عن استخدام حقن الإرتاينيم واتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- الإسهال الشديد (البراز المائي أو الدموي) الذي قد يحدث مع أو بدون حمى وتقلصات في المعدة (قد تحدث حتى شهرين أو أكثر بعد العلاج)
- قشعريرة
- متسرع
- متلهف، متشوق
- صعوبة في التنفس أو البلع
- النوبات
- إرهاق أو ضعف غير عادي
- جلد شاحب
- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة
- ضيق في التنفس
- ألم صدر

قد يسبب حقن Ertapenem آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

إذا كنت ستحقن حقن الإرتاينيم في المنزل ، فسوف يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بكيفية تخزين الدواء. قم بتخزين الأدوية الخاصة بك وفقاً للتوجيهات فقط. تأكد من فهمك لكيفية تخزين ملف

الدواء بشكل صحيح.

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>] إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- غثيان
- إسهال
- دوخة

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك لحقن الإرتابينيم.

لاتدع أي شخص يستخدم الدواء الخاص بك. الوصفة الخاصة بك وربما لا إعادة الملء. إذا استمرت أعراض العدوى بعد الانتهاء من استخدام حقن الإرتابينيم ، فاتصل بطبيبك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- اينفانز®

آخر مراجعة - 2017/02/15

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيدلة النظام الصحي](https://www.ashp.org/)

AHFS® معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 8600 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعهد الوطني للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022