



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → การฉีด Ertapenem

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

## การฉีด Ertapenem

ออกเสียงว่า (er" ta pen 'em)

### hy เป็นยานี้กำหนด?

การฉีด Ertapenem ใช้รักษาโรคติดเชื้อร้ายแรง เช่น โรคปอดบวมและทางเดินปัสสาวะ ผิวน้ำแข็ง เก้าเบาหวาน การติดเชื้อทาง  
บรีเวซ กระดูกเชิงกราน และช่องท้อง (บริเวณท้อง) ที่เกิดจากแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด  
ลำไส้ใหญ่ Ertapenem อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ carbapenem มันทำงานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีด ertapenem จะใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จำเป็นจะ  
เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

### ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

การฉีด Ertapenem มาเป็นผงผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) หรือเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) มันถูกฉีด  
(ฉีดซ้ำๆ) ทางเส้นเลือดในช่วงเวลาอย่างน้อย 30 นาทีวันละครั้งหรือสองครั้งนานถึง 14 วัน นอกจากนี้ยังสามารถให้เข้ากล้ามเนื้อวันละ  
ครั้งหรือสองครั้งนานถึง 7 วัน ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่กำลังได้รับการรักษา แพทย์ของคุณจะบอกคุณ  
ว่าต้องใช้การฉีด ertapenem นานแค่ไหน หลังจากมีอาการของคุณดีขึ้นแล้ว แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนคุณไปใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นที่  
คุณสามารถใช้ทางปากเพื่อรักษาให้เสร็จได้

คุณอาจได้รับการฉีด ertapenem ในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาที่บ้าน หากคุณกำลังจะใช้การฉีด ertapenem ที่บ้าน ให้ใช้ใน  
เวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาของคุณอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ  
ภาพอื่นๆ อธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีด ertapenem ตรงตามที่กำหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์  
ของคุณกำหนด

หากคุณกำลังจะใช้การฉีด ertapenem ที่บ้าน ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใช้ยาให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ  
เข้าใจคำแนะนำเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ  
ของคุณว่าคุณต้องทำอะไรหากคุณมีปัญหาในการฉีด ertapenem

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีด ertapenem หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ  
แพทย์

ใช้การฉีด ertapenem จนกว่าคุณจะสังยาเสร็จ แม้ว่า คุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้การฉีด ertapenem เร็วเกินไปหรือ หากคุณข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

## ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้ใช้อื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## หมวด ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

### ก่อนฉีด ertapenem

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ ertapenem; ยาปฏิชีวนะ carbapenem อื่น ๆ เช่น imipenem/cilastatin (Primaxin), doripenem (Doribax) หรือ meropenem (Merrem); ยาชาเฉพาะที่เช่น bupivacaine (Marcaine), etidocaine (Duranest), lidocaine, mepivacaine (Carbocaine, Prolocaine) หรือ prilocaine (Citanest); cephalosporins เช่น cefaclor (Ceclor), cefadroxil (Duricef) หรือ cephalexin (Keflex) ยาปฏิชีวนะ beta-lactam อื่น ๆ เช่น penicillin หรือ amoxicillin (Amoxil, Trimox, Wymox) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด ertapenem สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมนัดถึงสิ่งต่อไปนี้: probenecid (Probalan) หรือ valproic acid (Depakene, Depakote) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีรอยโรคในสมอง อาการชัก หรือโรคไต
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีด ertapenem ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

## ฉันทควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวดหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

## ฉันทควรทำอย่างไรถ้าฉันทลืมยา?

ใช้ยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

## ผลข้างเคียงของหมวด ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

**การฉีด Ertapenem อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:**

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- ท้องผูก

- ปวดหัว
- อาการเวียนศีรษะ
- อาการปวดท้อง
- ไข้
- ไอ
- ความสับสน
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- แดงหรือระคายเคืองบริเวณที่ฉีด
- บวม แดง แสบร้อน คัน หรือระคายเคืองช่องคลอด
- อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาที่อ่อนล้า

### **ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้การฉีด ertapenem และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:**

- ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นน้ำหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไข้และปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือมากกว่าหลังการรักษาของคุณ)
- ลมพิษ
- ผื่น
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือคลื่นไส้
- อาการชัก
- อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ
- ผิวง่ายช้ำ
- หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ
- หายใจถี่
- อาการเจ็บหน้าอก

การฉีด Ertapenem อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

### **หมวก ฉันทควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?**

หากคุณจะฉีด ertapenem ที่บ้าน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกคุณถึงวิธีเก็บยาของคุณ เก็บยาตามคำแนะนำเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีจัดเก็บ

## ยาอย่างถูกต้อง

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

## ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poissonhelp.org/help> [<https://www.poissonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

## อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- คลื่นไส้
- ท้องเสีย
- อาการเวียนศีรษะ

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด ertapenem

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากใช้การฉีด ertapenem เสร็จสิ้นแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแบรนด์

- อินวานซ์®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้า](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ขอจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สจวณลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ  
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

---

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022