

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Ertapenem Enjeksiyon

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

Ertapenem Enjeksiyon

(er" ta pen' em) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ertapenem enjeksiyonu, bakterilerin neden olduğu pnömoni ve idrar yolu, cilt, diyabetik ayak, jinekolojik, pelvik ve abdominal (mide bölgesi) enfeksiyonları dahil olmak üzere bazı ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Kolorektal cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesinde de kullanılır. Ertapenem, karbapenem antibiyotik adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Bakterileri öldürerek çalışır.

Ertapenem enjeksiyonu gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Gerekmediğinde antibiyotik almak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ertapenem enjeksiyonu, intravenöz (damar içine) veya intramüsküler (kas içine) enjekte edilecek sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. 14 güne kadar günde bir veya iki kez en az 30 dakikalık bir süre boyunca intravenöz olarak infüze edilir (yavaşça enjekte edilir). Ayrıca günde bir veya iki kez kas içinden 7 güne kadar verilebilir. Tedavinin uzunluğu, tedavi edilen enfeksiyonun tipine bağlıdır. Doktorunuz ertapenem enjeksiyonunu ne kadar süreyle kullanacağınızı size söyleyecektir. Durumunuz düzeldikten sonra doktorunuz tedavinizi tamamlamak için ağızdan alabileceğiniz başka bir antibiyotiğe geçiş yapabilir.

Bir hastanede ertapenem enjeksiyonu alabilir veya ilacı evde kullanabilirsiniz. Evde ertapenem enjeksiyonu kullanacaksanız, her gün yaklaşık aynı saatte kullanın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya diğer sağlık uzmanınızdan açıklamasını isteyin. Ertapenem enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Evde ertapenem enjeksiyonu kullanacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl kullanacağınızı size gösterecektir. Bu talimatları anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun. Ertapenem enjeksiyonunu infüze etmede herhangi bir sorun yaşarsanız, sağlık uzmanınıza ne yapacağınızı sorun.

Ertapenem enjeksiyonu ile tedavinin ilk birkaç gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamalısınız. Belirtileriniz düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu arayın.

Kendinizi daha iyi hissetmeniz bile reçeteyi bitirene kadar ertapenem enjeksiyonu kullanın. Ertapenem enjeksiyonunu çok erken kullanmayı bırakırsanız veya dozları atlarsanız, enfeksiyonunuz tamamen tedavi edilemeyebilir ve bakteriler antibiyotiklere dirençli hale gelebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ertapenem enjeksiyonunu almadan önce,

- ertapenem'e alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; imipenem/silastatin (Primaxin), doripenem (Doribax) veya meropenem (Merrem) gibi diğer karbapenem antibiyotikleri; bupivakain (Marcaine), etidokain (Duranest), lidokain, mepivakain (Carbocaine, Prolocaine) veya prilokain (Citanest) gibi lokal anestetikler; Sefaklor (Ceclor), sefadroksil (Duricef) veya sefaleksil (Keflex) gibi sefalosporinler, penisilin veya amoksisilin (Amoxil, Trimox, Wymox) gibi diğer beta-laktam antibiyotikler, diğer ilaçlar veya ertapenem enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi biri. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: probenesid (Probalan) veya valproik asit (Depakene, Depakote). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- doktorunuza beyin lezyonunuz, nöbetiniz veya böbrek hastalığınız olup olmadığını söyleyin.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ertapenem enjeksiyonunu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuza arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda kullanın. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz kullanmayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ertapenem enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- mide bulantısı
- kusma
- ishal
- kabızlık

- baş ağrısı
- baş dönmesi
- karın ağrısı
- ateş
- öksürük
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu
- enjeksiyon bölgesinde kızarıklık veya tahriş
- vajinada şişme, kızarıklık, yanma, kaşıntı veya tahriş
- ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, ertapenem enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- Ateş ve mide krampları (tedaviden sonra 2 ay veya daha fazla bir süre içinde ortaya çıkabilir) ile birlikte veya ateşsiz ortaya çıkabilecek şiddetli ishal (sulu veya kanlı dışkı)
- kurdeşen
- döküntü
- kaşıntı
- nefes alma veya yutma zorluğu
- nöbetler
- olağandışı yorgunluk veya zayıflık
- soluk ten
- hızlı veya düzensiz kalp atışı
- nefes darlığı
- göğüs ağrısı

Ertapenem enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Evde ertapenem enjeksiyonu yapacaksanız, sağlık uzmanınız ilacınızı nasıl saklayacağınızı size söyleyecektir. İlaçlarınızı yalnızca belirtildiği şekilde saklayın. nasıl saklayacağınızı anladığınızdan emin olun.

ilaç düzgün.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

- mide bulantısı
- ishal
- baş dönmesi

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun ertapenem enjeksiyonuna verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. Ertapenem enjeksiyonunu bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuzu arayın.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Invanz®

Son Revize - 02/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022