Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html

Ertapenem Injection

binibigkas bilang (er" ta pen' em)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Ertapenem injection ay ginagamit upang gamutin ang ilang partikular na malalang impeksyon, kabilang ang pneumonia at urinary tract, balat, diabetic foot, gynecological, pelvic, at mga impeksyon sa tiyan (stomach area), na sanhi ng bacteria. Ginagamit din ito para sa pag-iwas sa mga impeksyon pagkatapos ng colorectal surgery. Ang Ertapenem ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na carbapenem antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya.

Ang mga antibiotic tulad ng ertapenem injection ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon sa viral. Ang pag-inom ng mga antibiotic kapag hindi kailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang iniksyon ng Ertapenem ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido upang iturok sa ugat (sa ugat) o intramuscularly (sa isang kalamnan). Ito ay ini-infuse (mabagal na iniksyon) sa intravenously sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto isang beses o dalawang beses sa isang araw hanggang sa 14 na araw. Maaari rin itong ibigay minsan o dalawang beses sa isang araw nang intramuscularly hanggang 7 araw. Ang tagal ng paggamot ay depende sa uri ng impeksyon na ginagamot. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano katagal gamitin ang ertapenem injection. Pagkatapos bumuti ang iyong kondisyon, maaaring ilipat ka ng iyong doktor sa isa pang antibiotic na maaari mong inumin sa pamamagitan ng bibig upang makumpleto ang iyong paggamot.

Maaari kang makatanggap ng ertapenem injection sa isang ospital, o maaari mong gamitin ang gamot sa bahay. Kung gagamit ka ng ertapenem injection sa bahay, gamitin ito sa halos parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng ertapenem injection nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Kung gagamit ka ng ertapenem injection sa bahay, ipapakita sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung paano gamitin ang gamot. Tiyaking naiintindihan mo ang mga direksyong ito, at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang mga problema sa paglalagay ng ertapenem injection.

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may ertapenem injection. Kung ang iyong mga sintomas ay hindi bumuti o kung lumala ang mga ito, tawagan ang iyong doktor.

Gumamit ng ertapenem injection hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Kung huminto ka sa paggamit ng ertapenem injection nang masyadong maaga o kung laktawan mo ang mga dosis, ang iyong impeksiyon ay maaaring hindi ganap na magamot at ang bakterya ay maaaring maging lumalaban sa mga antibiotic.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng ertapenem injection,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa ertapenem; ibang carbapenem antibiotics tulad ng imipenem/cilastatin (Primaxin), doripenem (Doribax), o meropenem (Merrem); lokal na anesthetics tulad ng bupivacaine (Marcaine), etidocaine (Duranest), lidocaine, mepivacaine (Carbocaine, Prolocaine), o prilocaine (Citanest); cephalosporins gaya ng cefaclor (Ceclor), cefadroxil (Duricef), o cephalexin (Keflex), iba pang beta-lactam antibiotics gaya ng penicillin o amoxicillin (Amoxil, Trimox, Wymox), anumang iba pang gamot, o alinman sa mga sangkap sa ertapenem injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang impormasyon ng pasyente ng tagagawa para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: probenecid (Probalan) o valproic acid (Depakene, Depakote). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng mga sugat sa utak, mga seizure, o sakit sa bato.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang gumagamit ng ertapenem injection, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag gumamit ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Ertapenem injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagduduwal
- pagsusuka
- pagtatae
- pagtitibi

- sakit ng ulo
- pagkahilo
- sakit sa tyan
- lagnat
- ubo
- pagkalito
- nahihirapang makatulog o manatiling tulog
- pamumula o pangangati sa lugar ng iniksyon
- pamamaga, pamumula, pagkasunog, pangangati, o pangangati ng ari
- pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, itigil ang paggamit ng ertapenem injection at tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

- matinding pagtatae (matubig o madugong dumi) na maaaring mangyari nang may lagnat o walang lagnat at pananakit ng tiyan (maaaring mangyari hanggang 2 buwan o higit pa pagkatapos ng iyong paggamot)
- mga pantal
- pantal
- nangangati
- kahirapan sa paghinga o paglunok
- mga seizure
- hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan
- maputlang balat
- mabilis o hindi regular na tibok ng puso
- kinakapos na paghinga
- pananakit ng dibdib

Ang Ertapenem injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Kung mag-iinject ka ng ertapenem injection sa bahay, sasabihin sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano iimbak ang iyong gamot. Itabi lamang ang iyong gamot ayon sa itinuro. Tiyaking naiintindihan mo kung paano iimbak ang iyong

gamot nang maayos.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

- pagduduwal
- pagtatae
- pagkahilo

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa iniksyon ng ertapenem.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Ang iyong reseta ay malamang na hindi refillable. Kung mayroon ka pa ring mga sintomas ng impeksyon pagkatapos mong gumamit ng ertapenem injection, tawagan ang iyong doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Invanz®

Huling Binago - 02/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022