

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Injection d'ertapénème

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html>

## Injection d'ertapénem

prononcé comme (er" ta pen'em)

### Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'ertapénem est utilisée pour traiter certaines infections graves, notamment la pneumonie et les infections des voies urinaires, de la peau, du pied diabétique, gynécologiques, pelviennes et abdominales (région de l'estomac), qui sont causées par des bactéries. Il est également utilisé pour la prévention des infections consécutives à une chirurgie colorectale. L'ertapénème appartient à une classe de médicaments appelés antibiotiques carbapénèmes. Il agit en tuant les bactéries.

Les antibiotiques tels que l'injection d'ertapénème ne fonctionneront pas contre le rhume, la grippe ou d'autres infections virales. Prendre des antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires augmente le risque de contracter ultérieurement une infection qui résiste au traitement antibiotique.

### Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'ertapénem se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide à injecter par voie intraveineuse (dans une veine) ou intramusculaire (dans un muscle). Il est perfusé (injecté lentement) par voie intraveineuse sur une période d'au moins 30 minutes une ou deux fois par jour pendant 14 jours maximum. Il peut également être administré une ou deux fois par jour par voie intramusculaire pendant 7 jours maximum. La durée du traitement dépend du type d'infection à traiter. Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser l'injection d'ertapénem. Une fois que votre état s'est amélioré, votre médecin peut vous faire passer à un autre antibiotique que vous pouvez prendre par voie orale pour compléter votre traitement.

Vous pouvez recevoir une injection d'ertapénem dans un hôpital ou vous pouvez utiliser le médicament à la maison. Si vous utilisez l'ertapénème injectable à la maison, utilisez-le à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Utilisez l'injection d'ertapénem exactement comme indiqué. N'en utilisez pas plus ou moins ou utilisez-le plus souvent que prescrit par votre médecin.

Si vous utilisez l'injection d'ertapénem à la maison, votre fournisseur de soins de santé vous montrera comment utiliser le médicament. Assurez-vous de comprendre ces instructions et demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions. Demandez à votre fournisseur de soins de santé ce qu'il faut faire si vous avez des problèmes pour perfuser l'injection d'ertapénem.

Vous devriez commencer à vous sentir mieux au cours des premiers jours de traitement par l'ertapénème injectable. Si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent, appelez votre médecin.

Utilisez l'injection d'ertapénem jusqu'à ce que vous ayez terminé la prescription, même si vous vous sentez mieux. Si vous arrêtez d'utiliser l'injection d'ertapénème trop tôt ou si vous sautez des doses, votre infection peut ne pas être complètement traitée et les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

### **autres utilisations de ce médicament**

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

## **Quelles précautions particulières dois-je suivre ?**

### **Avant de prendre l'injection d'ertapénem,**

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'ertapénème ; d'autres antibiotiques carbapénèmes tels que l'imipénème/cilastatine (Primaxin), le doripénème (Doribax) ou le méropénème (Merrem) ; les anesthésiques locaux tels que la bupivacaïne (Marcaine), l'éthidocaïne (Duranest), la lidocaïne, la mépivacaïne (Carbocaine, Prolocaine) ou la prilocaïne (Citanest); les céphalosporines telles que le céfaclor (Ceclor), le céfadroxil (Duricef) ou la céphalexine (Keflex), d'autres antibiotiques bêta-lactamines tels que la pénicilline ou l'amoxicilline (Amoxil, Trimox, Wymox), tout autre médicament ou l'un des ingrédients de l'injection d'ertapénème. Demandez à votre pharmacien ou consultez les informations patient du fabricant pour obtenir une liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : probénécide (Probalan) ou acide valproïque (Depakene, Depakote). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des lésions cérébrales, des convulsions ou une maladie rénale.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous utilisez l'ertapénème injectable, appelez votre médecin.

## **Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?**

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

## **Que dois-je faire si j'oublie une dose ?**

Utilisez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. N'utilisez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

## **quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?**

**L'injection d'ertapénem peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :**

- nausée
- vomissement
- diarrhée
- constipation

- mal de crâne
- vertiges
- Douleur d'estomac
- fièvre
- la toux
- confusion
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- rougeur ou irritation au site d'injection
- gonflement, rougeur, brûlure, démangeaison ou irritation du vagin
- enflure des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

**Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez d'utiliser l'ertapénème injectable et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :**

- diarrhée sévère (selles liquides ou sanglantes) qui peut survenir avec ou sans fièvre et crampes d'estomac (peut survenir jusqu'à 2 mois ou plus après votre traitement)
- urticaire
- éruption
- démangeaison
- difficulté à respirer ou à avaler
- convulsions
- fatigue ou faiblesse inhabituelle
- peau pâle
- rythme cardiaque rapide ou irrégulier
- essoufflement
- douleur thoracique

L'injection d'ertapénem peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

## **Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?**

Si vous vous injectez l'ertapénem à la maison, votre fournisseur de soins de santé vous dira comment conserver votre médicament. Conservez vos médicaments uniquement comme indiqué. Assurez-vous de comprendre comment stocker votre

médicament correctement.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

## n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

### Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

- nausée
- diarrhée
- vertiges

### Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection d'ertapénem.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. Votre ordonnance n'est probablement pas renouvelable. Si vous avez encore des symptômes d'infection après avoir fini d'utiliser l'injection d'ertapénem, appelez votre médecin.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

## noms rands

- Invanz®

Dernière révision - 15/02/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

---

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022