



[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Estramustina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608046.html>

Estramustina

pronunciado como (es' tra mus' teen)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La estramustina se usa para tratar el cáncer de próstata que ha empeorado o se ha propagado a otras partes del cuerpo. La estramustina pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antimicrotúbulos. Actúa deteniendo el crecimiento y la propagación de las células cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La estramustina viene envasada en cápsulas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma con agua de 3 a 4 veces al día al menos una hora antes o dos horas después de las comidas. No tome estramustina con leche, productos lácteos o alimentos que contengan grandes cantidades de calcio. Tome la estramustina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la estramustina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

La estramustina puede controlar la propagación de su cáncer, pero no lo cura. Pueden pasar hasta 3 meses antes de que su médico pueda determinar si este medicamento es útil para su afección. Asegúrese de decirle a su médico cómo se siente durante su tratamiento con estramustina. Continúe tomando estramustina incluso si se siente bien. No deje de tomar estramustina sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar estramustina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la estramustina, el estradiol, la mostaza nitrogenada o a cualquier otro medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar.
- si está tomando suplementos de calcio o antiácidos que contienen calcio, como Alka-Mints, Tums o Titalac, tómelos al menos 2 horas antes o 2 horas después de la estramustina.

- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un coágulo de sangre, diabetes, presión arterial alta, un derrame cerebral, enfermedad cardíaca congestiva, migrañas, convulsiones, cualquier condición que afecte el equilibrio de calcio y fósforo en su cuerpo, como trastorno paratiroideo, o enfermedad hepática o renal.
- debe saber que la estramustina es solo para uso en hombres. La estramustina puede causar daño fetal. Debe usar un método anticonceptivo eficaz si existe la posibilidad de que su pareja quede embarazada mientras toma estramustina. Las mujeres que están o pueden quedar embarazadas no deben tomar estramustina. Si toma estramustina mientras está embarazada, llame a su médico de inmediato.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La estramustina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- náuseas
- Diarrea
- sensibilidad y agrandamiento de los senos
- calambres en las piernas
- cansancio
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- impotencia (incapacidad para tener o mantener una erección)

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- ronquera
- dificultad para tragar o respirar
- dificultad para respirar
- Dolor de pecho
- mareos o desmayos
- problemas del habla
- dolor de cabeza intenso y repentino
- pérdida repentina parcial o completa de la visión

- debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna
- dolor, enrojecimiento o hinchazón de un brazo o una pierna

La estramustina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guarde las cápsulas de estramustina en el refrigerador.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

En caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la estramustina.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Emcyt®

Última revisión - 15/09/2016

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022