

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Estramustine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608046.html>

## Estramustine

prononcé comme (es' tra mus' teen)

### Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'estramustine est utilisée pour traiter le cancer de la prostate qui s'est aggravé ou s'est propagé à d'autres parties du corps.

L'estramustine appartient à une classe de médicaments appelés agents antimicrotubulaires. Il agit en arrêtant la croissance et la propagation des cellules cancéreuses.

### Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'estramustine se présente sous la forme d'une gélule à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec de l'eau 3 à 4 fois par jour au moins une heure avant ou deux heures après les repas. Ne prenez pas d'estramustine avec du lait, des produits laitiers ou des aliments contenant de grandes quantités de calcium. Prenez de l'estramustine à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'estramustine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

L'estramustine peut contrôler la propagation de votre cancer mais ne le guérit pas. Il peut s'écouler jusqu'à 3 mois avant que votre médecin puisse déterminer si ce médicament est utile pour votre état. Assurez-vous de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par l'estramustine. Continuez à prendre de l'estramustine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre l'estramustine sans en parler à votre médecin.

### autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

### Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

#### Avant de prendre de l'estramustine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'estramustine, à l'estradiol, à la moutarde azotée ou à tout autre médicament.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre.
- si vous prenez des suppléments de calcium ou des antiacides contenant du calcium tels que Alka-Mints, Tums ou Titalac, prenez-les au moins 2 heures avant ou 2 heures après l'estramustine.

- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un caillot sanguin, un diabète, une hypertension artérielle, un accident vasculaire cérébral, une maladie cardiaque congestive, des migraines, des convulsions, toute affection affectant l'équilibre du calcium et du phosphore dans votre corps, comme un trouble parathyroïdien, ou maladie du foie ou des reins.
- vous devez savoir que l'estrामustine est réservée aux hommes. L'estrामustine peut nuire au fœtus. Vous devez utiliser une contraception efficace s'il existe une possibilité que votre partenaire tombe enceinte pendant que vous prenez de l'estrामustine. Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être ne doivent pas prendre d'estrामustine. Si vous prenez de l'estrामustine pendant que vous êtes enceinte, appelez immédiatement votre médecin.

## Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

## Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

## quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

**L'estrामustine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :**

- nausée
- diarrhée
- sensibilité et élargissement des seins
- crampes dans les jambes
- fatigue
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- impuissance (incapacité d'avoir ou de maintenir une érection)

**Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin :**

- gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes
- enrouement
- difficulté à avaler ou à respirer
- essoufflement
- douleur thoracique
- étourdissements ou évanouissement
- problèmes d'élocution
- maux de tête soudains et sévères
- perte soudaine partielle ou complète de la vision

- faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe
- douleur, rougeur ou gonflement d'un bras ou d'une jambe

L'estramustine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

## Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez les gélules d'estramustine au réfrigérateur.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

## Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps à l'estramustine.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

## noms rands

- Emcyt®

Dernière révision - 15/09/2016

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

---

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022