

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602013.html>

## הזרקת Etanercept מבוטא בתור (et a ner' set)

### אזהרה חשובה:

שימוש בזריקת etanercept עשוי להפחית את יכולתך להילחם בזיהום ולהגביר את הסיכון שתקבל זיהום חמור, כולל זיהומים נגיפיים, חיידקיים או פטרייתיים חמורים המתפשטים בכל הגוף. ייתכן שיהיה צורך לטפל בזיהומים אלו בבית חולים ועלולים לגרום למוות. ספר לרופא שלך אם אתה מקבל לעתים קרובות כל סוג של זיהום או אם אתה חושב שיש לך כל סוג של זיהום עכשיו. זה כולל זיהומים קלים (כגון חתכים פתוחים או פצעים), זיהומים שבאים והולכים (כגון כוויות קור) וזיהומים כרוניים שלא חולפים. ספר גם לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם מסוכרת, וירוס כשל חיסוני אנושי (HIV), תסמונת כשל חיסוני נרכש (איידס), או כל מצב אחר המשפיע על מערכת החיסון שלך. עליך גם לספר לרופא שלך אם אתה גר או חיית אי פעם באזורים כמו עמקי הנהר אוהיו ומיסיסיפי שבהם זיהומים פטרייתיים חמורים שכיחים יותר. שאל את הרופא שלך אם אינך יודע אם זיהומים אלה שכיחים באזור שלך. ספר גם לרופא שלך אם אתה נוטל תרופות המפחיתות את פעילות המערכת החיסונית כגון: anakinra; Orencia; abatacept (כנרת); Imuran; azathioprine; סטרואידים כולל דקסמתזון, מתילפרדניזולון (מדרול), פרדניזולון (פרילון) ופרדניזון; או מתוטרקסט (Rheumatrex). anakinra (כנרת); Imuran; azathioprine; סטרואידים כולל דקסמתזון, מתילפרדניזולון (מדרול), פרדניזולון (פרילון) ופרדניזון; או מתוטרקסט (Rheumatrex). anakinra (כנרת); Imuran; azathioprine; סטרואידים כולל דקסמתזון, מתילפרדניזולון (מדרול), פרדניזולון (פרילון) ופרדניזון; או מתוטרקסט (Rheumatrex).

הרופא שלך יעקוב אחר כך לאיתור סימני זיהום במהלך הטיפול וזמן קצר לאחריו. אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים לפני תחילת הטיפול או אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים במהלך או זמן קצר לאחר הטיפול, התקשר לרופא מיד: חולשה; מיוזע; קשיי נשימה; כאב גרון; להשתעל; שיעול ריר דמי; חום; ירידה במשקל; עייפות קיצונית; שלשול; כאב בטן; תסמינים דמויי שפעת; עור חם, אדום או כואב; או סימנים אחרים של זיהום.

ייתכן שאתה נגוע בשחפת (שחפת, סוג של זיהום ריאות) או הפטיטיס B (סוג של מחלת כבד) אך אין לך תסמינים כלשהם של המחלה. במקרה זה, הזרקת etanercept עלולה להגביר את הסיכון שהזיהום שלך יהפוך לחמור יותר ותפתח תסמינים. הרופא שלך יבצע בדיקת עור כדי לראות אם יש לך זיהום בשחפת לא פעיל והוא עשוי להזמין בדיקות דם כדי לראות אם יש לך זיהום הפטיטיס B לא פעיל. במידת הצורך, הרופא שלך ייתן לך תרופה לטיפול בזיהום זה לפני שתתחיל להשתמש בזריקת etanercept. ספר לרופא שלך אם יש לך או היה לך אי פעם שחפת, אם חיית במדינה שבה השחפת נפוצה, או אם היית בסביבה של מישהו שיש לו שחפת. אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים של שחפת, או אם אתה מפתח אחד מהתסמינים הללו במהלך הטיפול, התקשר לרופא שלך מיד:

טונוס שרירים, או חום. כמו כן, התקשר מיד לרופא שלך אם יש לך אחד מהתסמינים האלה של הפטיטיס B או אם אתה מפתח אחד מהתסמינים האלה במהלך או אחרי הטיפול שלך: עייפות יתר, הצהבה של העור או העיניים, אובדן תיאבון, בחילות או הקאות, כאבי שרירים, שתן כהה, יציאות בצבע חימר, חום, צמרמורות, כאבי בטן או פריחה.

חלק מהילדים ובני הנוער שקיבלו זריקת etanercept ותרופות דומות פיתחו סרטן חמור או מסכן חיים כולל לימפומה (סרטן שמתחיל בתאים הנלחמים בזיהום). אם ילדך מפתח כל אחד מהתסמינים הללו במהלך הטיפול שלו, התקשר מיד לרופא שלו: ירידה בלתי מוסברת במשקל; בלוטות נפוחות בצוואר, בבתי השחי או במפשעה; או חבורות קלות או דימום. שוחח עם הרופא של ילדך על הסיכונים במתן זריקת אטנרצפט לילדך.

הרופא או הרוקח שלך יספקו לך את גיליון המידע של היצרן למטופל (מדריך התרופות) כאשר תתחיל בטיפול בהזרקת etanercept ובכל פעם שתמלא מחדש את המרשם שלך. קרא את המידע בעיון ושאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן. אתה יכול גם לבקר באתר מינהל המזון והתרופות (FDA).

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm] /Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm  
או באתר היצרן לקבלת מדריך התרופות. (http://www.fda.gov)

שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים בשימוש בזריקת etanercept.

## היי האם נרשמה תרופה זו?

משמש לבד או עם תרופות אחרות כדי להקל על הסימפטומים של הפרעות אוטואימוניות מסוימות (מצבים שבהם המערכת החיסונית תוקפת חלקים בריאים בגוף וגורמת לכאב, נפיחות ונזקים) כולל Etanercept

- דלקת מפרקים שגרונית (מצב שבו הגוף תוקף את המפרקים של עצמו, גורם לכאב, נפיחות ואובדן תפקוד) אצל מבוגרים,
- דלקת מפרקים פסוריאטית (מצב הגורם לכאבי פרקים ונפיחות וקשקשים על העור) אצל מבוגרים,
- דלקת מפרקים אידיופטית נעורים (JIA); מצב הפוגע בילדים בו הגוף תוקף את המפרקים של עצמו, גורם לכאב, נפיחות, אובדן תפקוד ועיכובים בגדילה והתפתחות) בילדים מגיל שנתיים ומעלה,
- אנקילוזינג ספונדיליטיס (מצב שבו הגוף תוקף את מפרקי עמוד השדרה ואזורים אחרים וגורם לכאב ולנזק למפרקים),
- פסוריאזיס פלאק כרוני (מחלת עור שבה נוצרים כתמים אדומים וקשקשים באזורים מסוימים בגוף) במבוגרים וילדים מגיל 4 ומעלה שפסוריאזיס שלהם חמורה מכדי לטפל בתרופות מקומיות בלבד.

חומר בגוף הגורם לדלקת, TNF- $\alpha$  פועל על ידי חסימת פעולת ה-TNF (הוא בקבוצת תרופות הנקראות מעכבי גורם גידול נמק Etanercept)

## כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

הזרקת Etanercept מגיעה כתמיסה (נוזל) במזרק מלא מראש ובמכשיר הזרקה אוטומטי, וכאבקה לערבוב עם נוזל שסופק. Etanercept מוזרק תת עורית (מתחת לעור). זה מוזרק בדרך כלל פעם בשבוע. כאשר הזרקת etanercept משמשת לטיפול בפסוריאזיס פלאק כרונית, ניתן להזריק אותה פעמיים בשבוע במהלך 3 החודשים הראשונים של הטיפול ולאחר מכן פעם בשבוע לאחר 3 החודשים הראשונים. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. השתמש ב-etanercept בדיוק לפי ההוראות. אין להשתמש יותר או פחות ממנו או להשתמש בו לעתים קרובות יותר ממה שנקבע על ידי הרופא שלך.

תקבל את המנה הראשונה שלך של זריקת etanercept במשרד רופא. לאחר מכן, תוכל להזריק את התרופה בעצמך בבית או לגרום לחבר או קרוב משפחה לבצע את ההזרקות. בקש מהרופא או הרוקח שלך להראות לך או לאדם שיבצע את ההזרקות כיצד להזריק אתנרצפט. קרא את ההוראות הכתובות שמגיעות עם הזרקת etanercept לפני הזרקת התרופה.

בבקבוקונים של הזרקת etanercept עשויים להכיל מספיק תרופות ליותר ממנה אחת. אם נותרה מספיק תרופה בבקבוקון למנה מלאה, הנח את הבקבוקון במקרר בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ-4 שעות לאחר ערבובו. אתה יכול לאחסן את הבקבוקון של זריקת etanercept עד 14 ימים לאחר ערבוב זה, אם נותרה מספיק תרופה למנה מלאה. עם זאת, אין לשלב את התוכן של שניים או יותר בבקבוקונים של הזרקת etanercept כדי ליצור מנה מלאה. אתה גם לא צריך לערבב כל תרופות אחרות עם הזרקת etanercept.

אם התרופה שלך מגיעה במזרק מלא מראש או במכשיר הזרקה אוטומטי, השתמש בכל מזרק או התקן פעם אחת בלבד והזריק את כל התמיסה במזרק או במכשיר. גם אם נותרה תמיסה כלשהי במזרק או במכשיר, אל תשתמש בה שוב. השלך מחטים משומשות, מזרקים והתקנים במיכל עמיד לנקב. שוחח עם הרופא או הרוקח שלך לגבי אופן השלכת המיכל העמיד לנקב.

אם אתה משתמש במזרק מלא מראש, התקן הזרקה אוטומטי או בבקבוקון שהיה בקירור, הנח את המזרק, המכשיר או הבקבוקון על משטח שטוח ואפשר לו להתחמם לטמפרטורת החדר למשך 15-30 דקות לפני שאתה מוכן להזריק את התרופה. אל תנסה לחמם את התרופה על ידי חימום במיקרוגל, הנחתה במים חמים או בכל שיטה אחרת.

אין לנער מזרק, התקן הזרקה אוטומטי, או בבקבוקון המכילים etanercept. היזהר לא להפיל את המכשיר על משטח קשיח מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר, למזרק או למחט.

הסתכל תמיד על תמיסת etanercept לפני ההזרקה. בדקו שתאריך התפוגה לא חלף ושהנוזל צלול וחסר צבע. הנוזל עשוי להכיל חלקיקים לבנים קטנים, אך לא אמור להכיל חלקיקים גדולים או צבעוניים. אין להשתמש במזרק או בעט מינון אם הוא סדוק או שבור, אם פג תוקפו, או אם הנוזל עכור או מכיל חלקיקים גדולים או צבעוניים.

המקום הטוב ביותר להזריק את הזרקת etanercept הוא החלק הקדמי של הירכיים האמצעיות שלך. אתה יכול גם להזריק את התרופה בבטן התחתונה מתחת לטבור שלך, למעט האזור בגובה של 2 אינץ' (5 ס"מ) סביב הטבור. אם מישהו אחר נותן לך את הזריקה, אותו אדם יכול גם להזריק את התרופה לזרועותיך העליונות. אם Etanercept מוזרק לזרועות העליונות או לקיבה, יש למתוח את העור באזור כדי ליצור משטח יציב להזרקה. בחר אתר אחר עבור כל הזרקה. אין להזריק לאזור שבו העור רך, חבול, אדום, קשה או שבו יש צלקות או סימני מתיחה. אם יש לך פסוריאזיס, אל תזריק לעור אדום, עבה, מורם או קשקשי.

הזרקת Etanercept עשויה לעזור לשלוט במצבך אך לא תרפא אותו. המשך להשתמש בזריקת etanercept גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק להשתמש ב-etanercept מבלי לדבר עם הרופא שלך.

## השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

### יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

#### לפני השימוש בהזרקת etanercept,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לאטנרצפט או לכל תרופה אחרת. אם תשתמש במזרק הממולא מראש או במכשיר ההזרקה האוטומטית, ספר לרופא שלך אם אתה או האדם שיזריק את התרופה עבורך אלרגי לגומי או לטקס.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד לציין את התרופות המפורטות בסעיף אזהרה חשובה, תרופות לסוכרת וציקלופוספמיד (ציטוקסן). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או היו לך אי פעם התקפים; מחלה המשפיעה על מערכת העצבים שלך, כגון טרשת נפוצה (טרשת נפוצה; אובדן קואורדינציה, חולשה וחוסר תחושה עקב נזק עצבי); מיאליטיס רוחבי (דלקת של חוט השדרה שעלולה לגרום לתחושות חריגות, אובדן תחושה או אובדן יכולת להזיז את פלג הגוף התחתון); דלקת עצב הראייה (דלקת בעצב השולחת מסרים מהעין למוח); בעיות דימום; מחלת כבד, או אי ספיקת לב.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם אתה נכנס להריון בזמן השימוש ב-etanercept, התקשר לרופא שלך. אם אתה משתמש בזריקת etanercept במהלך ההריון שלך, הקפד לדבר עם הרופא של תינוקך על כך לאחר לידת תינוקך. ייתכן שהתינוק שלך יצטרך לקבל חיסונים מסוימים מאוחר מהרגיל.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה משתמש ב-etanercept.
- אין לך חיסונים כלשהם במהלך הטיפול שלך ב-etanercept מבלי לדבר עם הרופא שלך. אם ילדך יטופל בזריקת etanercept, שוחח עם הרופא שלו לגבי חיסונים שיש לתת לפני תחילת הטיפול. במידת האפשר, יש לתת לילדכם את כל החיסונים הדרושים לילדים בגילו לפני תחילת הטיפול.
- אם אתה חשוף לאבעבועות רוח בזמן השימוש ב-etanercept, התקשר לרופא מיד.

### האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

### כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

הזריק את המנה שהוחמצה ברגע שאתה זוכר אותה. אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הרגיל של המינון. אין להזריק מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

### התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

## עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף Etanercept

- אדמומיות, גירוד, כאב או נפיחות באתר ההזרקה
- כאב ראש
- בחילה
- הקאה
- צרבת
- כאב בטן
- חולשה
- להשתעל

**תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה נתקל באחת מתופעות הלוואי הבאות או מאלה המוזכרות בסעיף האזהרה החשובה, התקשר לרופא מיד או קבל עזרה רפואית חירום:**

- התקפים
- סימון
- מדמם
- עור חיוור
- עור מעורר שלפוחיות
- פריחה
- כוורות
- עקצוץ

- נפיחות של העיניים, הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון, הידיים, הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים התחתונות
- קשיי נשימה או בליעה
- פריחה בפנים ובזרועות שמחמירה בשמש
- חוסר תחושה או נימול
- בעיות ראייה
- חולשה בידיים או ברגליים
- סחרחורת
- כתמים אדומים, קשקשים או בליטות מלאות מוגלה על העור

מבוגרים המקבלים זריקת אטנרצפט עשויים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח לימפומה, לוקמיה (סרטן שמתחיל בתאי הדם הלבנים), סרטן העור וסוגים אחרים של סרטן מאשר מבוגרים שאינם מקבלים תרופה זו. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים בקבלת זריקת etanercept.

הזרקת Etanercept עלולה לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן השימוש בתרופה זו.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

## צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן את הזרקת etanercept במקרר אך לא להקפיא. שמור את הבקבוקונים, המזרקים המלאים מראש או התקני ההזרקה בקרטון המקורי שלהם כדי להגן עליהם מפני אור. אם ערבבת בקבוקון של אבקת etanercept עם הנוזל שסופק, תוכל לאחסן את התמיסה במקרר עד 14 ימים.

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>] למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>] אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

## צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך לאטנרצפט.

לפני ביצוע בדיקות מעבדה כלשהי, ספר לרופא שלך ולצוות המעבדה שאתה משתמש ב-etanercept.

אל תיתן לאף אחד אחר להשתמש בתרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

## שמות רנד

• אנברל®

מתוקן לאחרונה - 15/07/2018

[למד כיצד לצטט דף זה](#)

[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022