



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Injeção de Etanercept

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602013.html>

Injeção de Etanercept

pronunciado como (et a ner' set)

AVISO IMPORTANTE:

O uso de injeção de etanercept pode diminuir sua capacidade de combater infecções e aumentar o risco de você contrair uma infecção grave, incluindo infecções virais, bacterianas ou fúngicas graves que se espalham por todo o corpo. Essas infecções podem precisar ser tratadas em um hospital e podem causar a morte. Informe o seu médico se você costuma ter algum tipo de infecção ou se acha que pode ter algum tipo de infecção agora. Isso inclui infecções menores (como cortes abertos ou feridas), infecções que vêm e vão (como herpes labial) e infecções crônicas que não desaparecem. Informe também o seu médico se você tem ou já teve diabetes, vírus da imunodeficiência humana (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) ou qualquer outra condição que afete seu sistema imunológico. Você também deve informar o seu médico se você mora ou já viveu em áreas como os vales dos rios Ohio e Mississippi, onde infecções fúngicas graves são mais comuns. Pergunte ao seu médico se você não sabe se essas infecções são comuns em sua área. Informe também o seu médico se estiver a tomar medicamentos que diminuam a actividade do sistema imunitário, tais como: abatacept (Orencia); anakinra (Kineret); azatioprina (Imuran); esteróides incluindo dexametasona, metilprednisolona (Medrol), prednisolona (Prelone) e prednisona; ou metotrexato (Rheumatrex). anakinra (Kineret); azatioprina (Imuran); esteróides incluindo dexametasona, metilprednisolona (Medrol), prednisolona (Prelone) e prednisona; ou metotrexato (Rheumatrex). anakinra (Kineret); azatioprina (Imuran); esteróides incluindo dexametasona, metilprednisolona (Medrol), prednisolona (Prelone) e prednisona; ou metotrexato (Rheumatrex).

O seu médico irá monitorizá-lo quanto a sinais de infecção durante e logo após o seu tratamento. Se tiver algum dos seguintes sintomas antes de iniciar o tratamento ou se sentir algum dos seguintes sintomas durante ou logo após o tratamento, contacte o seu médico imediatamente: fraqueza; sudorese; dificuldade para respirar; dor de garganta; tosse; tosse com muco sanguinolento; febre; perda de peso; Cansaço extremo; diarreia; dor de estômago; sintomas como os da gripe; pele quente, vermelha ou dolorida; ou outros sinais de infecção.

Você pode estar infectado com tuberculose (TB, um tipo de infecção pulmonar) ou hepatite B (um tipo de doença hepática), mas não apresenta nenhum sintoma da doença. Neste caso, a injeção de etanercept pode aumentar o risco de a sua infecção se tornar mais grave e desenvolver sintomas. O seu médico irá realizar um teste cutâneo para ver se você tem uma infecção por TB inativa e pode solicitar exames de sangue para ver se você tem uma infecção inativa por hepatite B. Se necessário, o seu médico irá dar-lhe medicamentos para tratar esta infeção antes de começar a utilizar a injeção de etanercept. Informe o seu médico se tem ou já teve TB, se viveu num país onde a TB é comum ou se esteve perto de alguém com TB. Se tiver algum dos seguintes sintomas de TB, ou se desenvolver algum destes sintomas durante o tratamento, contacte o seu médico imediatamente:

tônus muscular ou febre. Contacte também o seu médico imediatamente se tiver algum destes sintomas de hepatite B ou se desenvolver algum destes sintomas durante ou após o tratamento: cansaço excessivo, amarelecimento da pele ou dos olhos, perda de apetite, náuseas ou vômitos, dores musculares, urina escura, evacuações cor de barro, febre, calafrios, dor de estômago ou erupção cutânea.

Algumas crianças e adolescentes que receberam injeção de etanercepte e medicamentos semelhantes desenvolveram cânceres graves ou com risco de vida, incluindo linfoma (câncer que começa nas células que combatem a infecção). Se o seu filho desenvolver algum destes sintomas durante o tratamento, contacte o seu médico imediatamente: perda de peso inexplicável; glândulas inchadas no pescoço, axilas ou virilha; ou hematomas ou sangramentos fáceis. Fale com o médico do seu filho sobre os riscos de administrar a injeção de etanercepte ao seu filho.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com injeção de etanercepte e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre os riscos do uso de injeção de etanercepte.

por que este medicamento é prescrito?

O etanercepte é usado sozinho ou com outros medicamentos para aliviar os sintomas de certos distúrbios autoimunes (condições em que o sistema imunológico ataca partes saudáveis do corpo e causa dor, inchaço e danos), incluindo:

- artrite reumatóide (condição em que o corpo ataca suas próprias articulações, causando dor, inchaço e perda de função) em adultos,
- artrite psoriática (condição que causa dor nas articulações e inchaço e escamas na pele) em adultos,
- artrite idiopática juvenil (AIJ; uma condição que afeta crianças em que o corpo ataca suas próprias articulações, causando dor, inchaço, perda de função e atrasos no crescimento e desenvolvimento) em crianças de 2 anos de idade ou mais,
- espondilite anquilosante (uma condição na qual o corpo ataca as articulações da coluna e outras áreas causando dor e danos nas articulações),
- psoríase crônica em placas (uma doença de pele na qual manchas vermelhas e escamosas se formam em algumas áreas do corpo) em adultos e crianças com 4 anos de idade ou mais cuja psoríase é muito grave para ser tratada apenas com medicamentos tópicos.

O etanercepte está em uma classe de medicamentos chamados inibidores do fator de necrose tumoral (TNF). Funciona bloqueando a ação do TNF, uma substância no corpo que causa inflamação

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de etanercept vem como uma solução (líquida) em uma seringa pré-cheia e um dispositivo de injeção automático, e como um pó a ser misturado com um líquido fornecido. O etanercept é injetado por via subcutânea (sob a pele). Geralmente é injetado uma vez por semana. Quando a injeção de etanercept é usada para tratar a psoríase em placas crônica, pode ser injetada duas vezes por semana durante os primeiros 3 meses de tratamento e depois uma vez por semana após os primeiros 3 meses. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use etanercept exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Você receberá sua primeira dose de injeção de etanercept em um consultório médico. Depois disso, você pode injetar a medicação em casa ou pedir a um amigo ou parente que faça as injeções. Peça ao seu médico ou farmacêutico para mostrar a você ou à pessoa que irá aplicar as injeções como injetar etanercept. Leia as instruções escritas que acompanham a injeção de etanercept antes de injetar o medicamento.

Os frascos de injeção de etanercept podem conter medicação suficiente para mais de uma dose. Se houver medicamento suficiente no frasco para uma dose completa, coloque o frasco na geladeira o mais rápido possível, mas o mais tardar 4 horas após a mistura. Você pode armazenar o frasco de injeção de etanercept por até 14 dias depois de misturá-lo, se houver medicamento suficiente para uma dose completa. No entanto, você não deve combinar o conteúdo de dois ou mais frascos de injeção de etanercepte para fazer uma dose completa. Você também não deve misturar outros medicamentos com injeção de etanercept.

Se a sua medicação vier em uma seringa pré-cheia ou dispositivo de injeção automática, use cada seringa ou dispositivo apenas uma vez e injete toda a solução na seringa ou dispositivo. Mesmo que ainda haja alguma solução na seringa ou dispositivo, não a use novamente. Descarte as agulhas, seringas e dispositivos usados em um recipiente resistente a perfurações. Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre como eliminar o recipiente resistente a perfurações.

Se estiver usando uma seringa preenchida, um dispositivo de injeção automático ou um frasco que foi refrigerado, coloque a seringa, dispositivo ou frasco em uma superfície plana e deixe-o aquecer até a temperatura ambiente por 15 a 30 minutos antes de estar pronto para injetar o medicamento. Não tente aquecer o medicamento aquecendo-o no micro-ondas, colocando-o em água quente ou por qualquer outro método.

Não agite uma seringa, dispositivo de injeção automática ou frasco que contenha etanercept. Tenha cuidado para não deixar cair o dispositivo em uma superfície dura, pois isso pode danificar o dispositivo, a seringa ou a agulha.

Sempre observe a solução de etanercept antes de injetá-la. Verifique se o prazo de validade não passou e se o líquido está límpido e incolor. O líquido pode conter pequenas partículas brancas, mas não deve conter partículas grandes ou coloridas. Não use uma seringa ou caneta doseadora se estiver rachada ou quebrada, se estiver vencida ou se o líquido estiver turvo ou contiver partículas grandes ou coloridas.

O melhor local para injetar a injeção de etanercept é na parte da frente das coxas. Você também pode injetar o medicamento na parte inferior do estômago abaixo do umbigo, exceto na área de 5 centímetros ao redor do umbigo. Se outra pessoa está lhe dando a injeção, essa pessoa também pode injetar a medicação em seus braços. Se o etanercept for injetado na parte superior do braço ou no estômago, a pele na área deve ser esticada para criar uma superfície firme para a injeção. Escolha um local diferente para cada injeção. Não injete em uma área onde a pele esteja sensível, machucada, vermelha, dura ou onde haja cicatrizes ou estrias. Se você tem psoríase, não injete em pele vermelha, espessa, elevada ou escamosa.

A injeção de etanercept pode ajudar a controlar sua condição, mas não a cura. Continue a usar a injeção de etanercept mesmo que se sinta bem. Não pare de usar etanercept sem falar com seu médico.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar a injeção de etanercept,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao etanercept ou a qualquer outro medicamento. Se você estiver usando a seringa pré-cheia ou o dispositivo de injeção automático, informe ao seu médico se você ou a pessoa que vai injetar o medicamento para você é alérgico a borracha ou látex.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar os medicamentos listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, medicamentos para diabetes e ciclofosfamida (Cytosan). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se tem ou já teve convulsões; uma doença que afeta o sistema nervoso, como esclerose múltipla (EM; perda de coordenação, fraqueza e dormência devido a danos nos nervos); mielite transversa (inflamação da medula espinhal que pode causar sensações anormais, perda de sensibilidade ou perda da capacidade de mover a parte inferior do corpo); neurite óptica (inflamação do nervo que envia mensagens do olho para o cérebro); problemas de sangramento; doença hepática ou insuficiência cardíaca.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a utilizar etanercept, contacte o seu médico. Se você usar injeção de etanercept durante a gravidez, certifique-se de conversar com o médico do seu bebê sobre isso após o nascimento do bebê. Seu bebê pode precisar receber certas vacinas mais tarde do que o habitual.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a utilizar etanercept.
- não tome nenhuma vacina durante o seu tratamento com etanercept sem falar com o seu médico. Se seu filho for tratado com injeção de etanercept, converse com seu médico sobre as vacinas que devem ser administradas antes do início do tratamento. Se possível, seu filho deve receber todas as vacinas necessárias para crianças de sua idade antes de iniciar o tratamento.
- se estiver exposto à varicela enquanto estiver a utilizar etanercept, contacte o seu médico imediatamente.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Injete a dose esquecida assim que se lembrar. Se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue com o esquema posológico habitual. Não injete uma dose dupla para compensar uma dose perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O etanercept pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- vermelhidão, coceira, dor ou inchaço no local da injeção
- dor de cabeça
- náusea
- vômito
- azia
- dor de estômago
- fraqueza
- tosse

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você sentir algum dos seguintes efeitos colaterais ou aqueles mencionados na SEÇÃO DE ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES, ligue para o seu médico imediatamente ou procure ajuda médica de emergência:

- convulsões
- contusão
- sangramento
- pele pálida
- pele com bolhas
- irritação na pele
- urticária
- coceira
- inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta, braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas
- dificuldade em respirar ou engolir
- erupção cutânea no rosto e braços que piora ao sol
- dormência ou formigamento
- problemas de visão
- fraqueza nos braços ou pernas
- tontura
- manchas vermelhas e escamosas ou inchaços cheios de pus na pele

Adultos que recebem injeção de etanercept talvez tenham maior risco de desenvolver linfoma, leucemia (câncer que começa nos glóbulos brancos), câncer de pele e outros tipos de câncer do que os adultos que não recebem esse medicamento. Converse com seu médico sobre os riscos de receber injeção de etanercepte.

A injeção de etanercept pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao usar este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene a injeção de etanercept na geladeira, mas não congele. Mantenha os frascos, seringas pré-cheias ou dispositivos de injeção em suas embalagens originais para protegê-los da luz. Se misturou um frasco de pó de etanercept com o líquido fornecido, pode guardar a solução no frigorífico até 14 dias.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo ao etanercept.

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a utilizar etanercept.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Enbrel®

Última revisão - 15/07/2018

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022