

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602013.html>

## حقن Etanercept تنطق باسم (et a ner 'set)

### تحذير هام:

قد يقلل استخدام حقن etanercept من قدرتك على مكافحة العدوى ويزيد من خطر إصابتك بعدوى خطيرة ، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية الشديدة التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم. قد تحتاج هذه العدوى إلى العلاج في المستشفى وقد تسبب الوفاة. أخبر طبيبك إذا كنت غالباً ما تصاب بأي نوع من العدوى أو إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاباً بأي نوع من العدوى الآن. وهذا يشمل الالتهابات البسيطة (مثل الجروح المفتوحة أو القروح) ، والالتهابات التي تأتي وتذهب (مثل قروح البرد) والالتهابات المزمنة التي لا تختفي. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت مصاباً أو سبق أن أصبت بداء السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو أي حالة أخرى تؤثر على جهاز المناعة لديك. يجب عليك أيضاً إخبار طبيبك إذا كنت تعيش أو عشت في مناطق مثل وديان نهر أوهايو والميسيسيبي حيث تنتشر العدوى الفطرية الشديدة. اسأل طبيبك إذا كنت لا تعرف ما إذا كانت هذه العدوى شائعة في منطقتك. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تتناول أدوية تقلل من نشاط جهاز المناعة مثل: أباتاسيب (Orencia) ؛ أناكينرا (كينريت) ؛ أزاثيوبيرين (إيموران) ؛ الستيرويدات بما في ذلك ديكساميثازون ، ميثيل بريدنيزولون (ميدرول) ، بريدنيزولون (بريلون) وبريدنيزون ؛ أو ميثوتريكسات (روماتريكس). أناكينرا (كينريت) ؛ أزاثيوبيرين (إيموران) ؛ الستيرويدات بما في ذلك ديكساميثازون ، ميثيل بريدنيزولون (ميدرول) ، بريدنيزولون (بريلون) وبريدنيزون ؛ أو ميثوتريكسات (روماتريكس). أناكينرا (كينريت) ؛ أزاثيوبيرين (إيموران) ؛ الستيرويدات بما في ذلك ديكساميثازون ، ميثيل بريدنيزولون (ميدرول) ، بريدنيزولون (بريلون) وبريدنيزون ؛ أو ميثوتريكسات (روماتريكس).

سيراقبك طبيبك بحثاً عن علامات العدوى أثناء العلاج وبعده بفترة قصيرة. إذا كان لديك أي من الأعراض التالية قبل بدء العلاج أو إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية أثناء العلاج أو بعده بفترة قصيرة ، فاتصل بطبيبك على الفور: ضعف؛ التعرق. صعوبة في التنفس؛ التهاب الحلق؛ سعال؛ السعال مع المخاط الدموي. حمى؛ فقدان الوزن؛ التعب الشديد؛ إسهال؛ آلام في المعدة بأعراض تشبه أعراض الانفلونزا؛ جلد دافئ أو أحمر أو مؤلم. أو علامات أخرى للعدوى.

قد تكون مصاباً بالسل (نوع من عدوى الرئة) أو التهاب الكبد B (نوع من أمراض الكبد) ولكن ليس لديك أي أعراض للمرض. في هذه الحالة ، قد يزيد حقن etanercept من خطر أن تصبح العدوى أكثر خطورة وستظهر عليك الأعراض. سيجري طبيبك اختباراً للجلد لمعرفة ما إذا كنت مصاباً بعدوى السل غير النشطة وقد يطلب منك إجراء اختبارات الدم لمعرفة ما إذا كان لديك عدوى غير نشطة بالتهاب الكبد بي. إذا لزم الأمر ، سيعطيك طبيبك دواء لعلاج هذه العدوى قبل البدء في استخدام حقن etanercept. أخبر طبيبك إذا كنت مصاباً بالسل أو سبق أن أصبت به ، أو إذا كنت تعيش في بلد ينتشر فيه مرض السل ، أو إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بالسل. إذا كان لديك أي من الأعراض التالية لمرض السل ، أو إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض أثناء العلاج ، فاتصل بطبيبك على الفور:

توتر العضلات أو الحمى. اتصل أيضاً بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي من أعراض التهاب الكبد B أو إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض أثناء أو بعد العلاج: التعب المفرط ، اصفرار الجلد أو العينين ، فقدان الشهية ، الغثيان أو القيء ، آلام في العضلات ، بول داكن ، حركات الأمعاء بلون الطين ، حمى ، قشعريرة ، آلام في المعدة ، أو طفح جلدي.

أصيب بعض الأطفال والمراهقين الذين تلقوا حقن إيتانرسبت وأدوية مماثلة بسرطانات شديدة أو مهددة للحياة بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية (سرطان يبدأ في الخلايا التي تقاوم العدوى). إذا ظهر على طفلك أي من هذه الأعراض أثناء علاجه ، فاتصل بطبيبك على الفور: فقدان الوزن غير المبرر ؛ تورم الغدد في الرقبة أو الإبط أو الفخذ. أو سهولة حدوث كدمات أو نزيف. تحدث إلى طبيب طفلك حول مخاطر إعطاء حقنة etanercept لطفلك.

سيعطيك طبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج بحقن etanercept وفي كل مرة تقوم بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA)

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm] <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء.

تحدث إلى طبيبك حول مخاطر استخدام حقن etanercept.

## لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم Etanercept بمفرده أو مع أدوية أخرى لتخفيف أعراض بعض اضطرابات المناعة الذاتية (الحالات التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الأجزاء الصحية من الجسم ويسبب الألم والتورم والضرر) بما في ذلك:

- التهاب المفاصل الروماتويدي (حالة يهاجم فيها الجسم مفاصله ، مما يسبب الألم والتورم وفقدان الوظيفة) عند البالغين ،
- التهاب المفاصل الصدفي (حالة تسبب آلام المفاصل وتورمها وقشور على الجلد) عند البالغين ،
- التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب (JIA ؛ حالة تؤثر على الأطفال حيث يهاجم الجسم مفاصله ، مما يتسبب في الألم والتورم وفقدان الوظيفة وتأخير النمو والتطور) عند الأطفال بعمر سنتين وما فوق ،
- التهاب الفقار اللاصق (حالة يهاجم فيها الجسم مفاصل العمود الفقري ومناطق أخرى مسببة الألم وتلف المفاصل) ،
- الصدفية اللويحية المزمنة (مرض جلدي تتشكل فيه بقع حمراء متقشرة على بعض مناطق الجسم) عند البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما فوق والذين تكون الصدفية لديهم شديدة للغاية بحيث لا يمكن علاجها بالأدوية الموضعية وحدها.

ينتمي Etanercept إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات عامل نخر الورم (TNF). وهو يعمل عن طريق منع عمل عامل نخر الورم ، وهي مادة في الجسم تسبب الالتهاب

## كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي حقن Etanercept كمحلول (سائل) في حقنة مملوءة مسبقاً وجهاز حقن أوتوماتيكي ، وكمسحوق يخلط مع سائل مزود. يتم حقن Etanercept تحت الجلد (تحت الجلد). عادة ما يتم حقنها مرة واحدة في الأسبوع. عند استخدام حقن etanercept لعلاج الصدفية المزمنة ، يمكن حقنها مرتين في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج ثم مرة واحدة في الأسبوع بعد الأشهر الثلاثة الأولى. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. استخدم etanercept تماماً وفقاً للتوجيهات. لا تستخدم أكثر أو أقل منه أو تستخدمه أكثر مما وصفه طبيبك.

ستتلقى جرعتك الأولى من حقن etanercept في عيادة الطبيب. بعد ذلك ، يمكنك حقن الدواء بنفسك في المنزل أو جعل صديق أو قريب يقوم بالحقن. اطلب من طبيبك أو الصيدلي أن يوضح لك أو للشخص الذي سيجري الحقن كيفية حقن etanercept. اقرأ التعليمات المكتوبة التي تأتي مع حقن etanercept قبل حقن الدواء.

قد تحتوي قوارير حقن etanercept على أدوية كافية لأكثر من جرعة واحدة. إذا كان هناك ما يكفي من الدواء في القارورة للحصول على جرعة كاملة ، ضع القارورة في الثلاجة في أسرع وقت ممكن ، ولكن في موعد لا يتجاوز 4 ساعات بعد خلطها. يمكنك تخزين قنينة حقن etanercept لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد مزجها إذا كان هناك دواء كافٍ متبقي لجرعة كاملة. ومع ذلك ، لا يجب الجمع بين محتويات قارورتين أو أكثر من حقن etanercept للحصول على جرعة كاملة. يجب أيضاً عدم خلط أي أدوية أخرى مع حقن etanercept.

إذا كان الدواء الخاص بك يأتي في حقنة مملوءة مسبقاً أو جهاز حقن أوتوماتيكي ، فاستخدم كل حقنة أو جهاز مرة واحدة فقط وحقن كل المحلول في المحقنة أو الجهاز. حتى إذا كان لا يزال هناك بعض المحلول المتبقي في المحقنة أو الجهاز ، فلا تستخدمه مرة أخرى. تخلص من الإبر والمحاقن والأجهزة المستعملة في وعاء مقاوم للثقب. تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي حول كيفية التخلص من الحاوية المقاومة للثقب.

إذا كنت تستخدم حقنة مملوءة مسبقاً ، أو جهاز حقن تلقائي ، أو قنينة تم تبريدها ، ضع المحقنة أو الجهاز أو القارورة على سطح مستو واتركها دافئة لدرجة حرارة الغرفة لمدة 15-30 دقيقة قبل أن تكون جاهزاً لذلك حقن الدواء. لا تحاول تدفئة الدواء عن طريق تسخينه في الميكروويف أو وضعه في ماء ساخن أو بأي طريقة أخرى.

لا تهز حقنة أو جهاز حقن أوتوماتيكي أو قنينة تحتوي على etanercept. احرص على عدم إسقاط الجهاز على سطح صلب لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو المحقنة أو الإبرة.

انظر دائماً إلى محلول etanercept قبل حقنه. تأكد من أن تاريخ انتهاء الصلاحية لم يمر وأن السائل صافٍ وديم اللون. قد يحتوي السائل على جزيئات بيضاء صغيرة ، ولكن لا ينبغي أن يحتوي على جزيئات كبيرة أو ملونة. لا تستخدم حقنة أو قلم جرعات إذا كان متصدعاً أو مكسوراً ، أو إذا انتهت صلاحيته ، أو إذا كان السائل معكراً أو يحتوي على جزيئات كبيرة أو ملونة.

أفضل مكان لحقن حقن etanercept هو الجزء الأمامي من الفخذين الأوسطين. يمكنك أيضاً حقن الدواء في أسفل معدتك أسفل السرة ، باستثناء المنطقة التي تبلغ 2 بوصة (5 سم) حول السرة. إذا أعطاك شخص آخر الحقنة ، فيمكن لهذا الشخص أيضاً حقن الدواء في أعلى ذراعيك. إذا تم حقن etanercept في الذراعين أو المعدة العلويين ، فيجب شد الجلد في المنطقة لإنشاء سطح صلب للحقن. اختر موقعاً مختلفاً لكل حقنة. لا تحقن في منطقة يكون فيها الجلد رقيقاً أو به كدمات أو أحمر أو قاسي أو حيث توجد ندوب أو علامات تمدد. إذا كنت مصاباً بالصدفية ، فلا تحقن في جلد أحمر أو سميك أو مرتفع أو متقشر.

قد يساعد حقن Etanercept في التحكم في حالتك ولكنه لن يعالجها. استمر في استخدام حقن etanercept حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن استخدام etanercept دون التحدث إلى طبيبك.

## هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

## قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

### قبل استخدام حقن etanercept ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من etanercept أو أي أدوية أخرى. إذا كنت ستستخدم المحقنة المعبأة مسبقاً أو جهاز الحقن الأوتوماتيكي ، أخبر طبيبك إذا كنت أنت أو الشخص الذي سيحقن الدواء من أجلك لديك حساسية من المطاط أو اللاتكس.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر الأدوية المدرجة في قسم تحذير هام ، وأدوية مرض السكري ، وسيكلوفوسفاميد ( سيتوكسان). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من نوبات صرع. مرض يؤثر على جهازك العصبي ، مثل التصلب المتعدد (مرض التصلب العصبي المتعدد ؛ فقدان التنسيق والضعف والخدر بسبب تلف الأعصاب) ؛ التهاب النخاع المستعرض (التهاب النخاع الشوكي الذي قد يسبب أحاسيس غير طبيعية أو فقدان الإحساس أو فقدان القدرة على تحريك الجزء السفلي من الجسم) ؛ التهاب العصب البصري (التهاب العصب الذي يرسل رسائل من العين إلى الدماغ) ؛ مشاكل النزيف أمراض الكبد أو قصور القلب.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام etanercept ، فاتصل بطبيبك. إذا كنت تستخدم حقنة etanercept أثناء الحمل ، فتأكد من التحدث إلى طبيب طفلك حول هذا الأمر بعد ولادة طفلك. قد يحتاج طفلك إلى تلقي بعض التطعيمات في وقت متأخر عن المعتاد.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تستخدم etanercept.
- لاتأخذ أي لقاحات أثناء علاجك بـ etanercept دون التحدث إلى طبيبك. إذا كان طفلك سيُعالج بحقنة etanercept ، فتحدث إلى طبيبه حول التطعيمات التي يجب إعطاؤها قبل بدء العلاج. إذا أمكن ، يجب إعطاء طفلك جميع التطعيمات اللازمة للأطفال في سنه قبل بدء العلاج.
- إذا تعرضت لجذري الماء أثناء استخدام etanercept ، فاتصل بطبيبك على الفور.

## قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

## قبعة يجب أن أفعالها إذا نسيت جرعة؟

احقن الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تحقن جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

## قد يسبب Etanercept آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- احمرار أو حكة أو ألم أو تورم في موقع الحقن
- صداع الرأس
- غثيان
- التقيؤ
- حرقة من المعدة
- آلام في المعدة
- ضعف
- سعال

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من الآثار الجانبية التالية أو تلك المذكورة في قسم التحذير المهم ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على مساعدة طبية طارئة:

- النوبات
- كدمات
- نزيف
- جلد شاحب
- تقرحات الجلد
- متسرع
- قشعريرة
- متلهف، متشوق
- تورم في العينين أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الذراعين أو اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو أسفل الساقين
- صعوبة في التنفس أو البلع
- طفح جلدي على الوجه والذراعين يزداد سوءاً في الشمس
- خدر أو وخز
- مشاكل في الرؤية
- ضعف في الذراعين أو الساقين
- دوخة
- بقع حمراء متقشرة أو نتوءات مليئة بالصديد على الجلد

قد يكون البالغون الذين يتلقون حقن etanercept أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم (السرطان الذي يبدأ في خلايا الدم البيضاء) وسرطان الجلد وأنواع السرطان الأخرى أكثر من البالغين الذين لا يتلقون هذا الدواء. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تلقي حقن etanercept.

قد يسبب حقن Etanercept آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء استخدام هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).  
<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> ]<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزين حقن etanercept في الثلاجة ولكن لا تجمد. احتفظ بالقوارير أو المحاقن المعبأة مسبقاً أو أجهزة الحقن في علبة الكرتونية الأصلية لحمايتها من الضوء. إذا قمت بخلط قنينة من مسحوق etanercept مع السائل المتوفر ، يمكنك تخزين المحلول في الثلاجة لمدة تصل إلى 14 يوماً.

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>) /<http://goo.gl/c4Rm4p>] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.  
<http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>]

## ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

## قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك لـ etanercept.

قبل إجراء أي اختبار معمل ، أخبر طبيبك وموظفي المختبر أنك تستخدم etanercept.

لا تدع أي شخص يستخدم الدواء الخاص بك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحصار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

• إنرييل®

آخر مراجعة - 15/07/2018

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



### إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022