



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → การฉีดอีทาเนอร์เซปต์

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602013.html>

การฉีดอีทาเนอร์เซปต์

ออกเสียงว่า (et a ner 'set)

คำเตือนที่สำคัญ:

การใช้การฉีดอีทาเนอร์เซปต์อาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อราที่รุนแรงซึ่งแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านี้อาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจทำให้เสียชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชืชนิดใดๆ หรือหากคุณคิดว่าตอนนี้คุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติดเชื้อที่เป็นๆ หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อเรื้อรังที่ไม่หายไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ไวรัสโรคมุมคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรคมุมคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา (AIDS) หรือภาวะอื่นใดที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ นอกจากนี้ คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากเคยอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่น หุบเขาแม่น้ำโอไฮโอและมิสซิสซิปปี ที่มีการติดเชื้อราชนิดรุนแรงมากกว่าปกติ ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่ทราบว่าติดเชื้อเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในพื้นที่ของคุณหรือไม่ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากกำลังใช้ยาที่ลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเช่นสิ่งต่อไปนี้:

abatacept (Orencia); อนุทินะ (Kineret); อะซาไรโอพรีน (อีมูริน); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; หรือเมโรเทรกเซต (รุมาทริกซ์) อนุทินะ (Kineret); อะซาไรโอพรีน (อีมูริน); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; หรือเมโรเทรกเซต (รุมาทริกซ์) อนุทินะ (Kineret); อะซาไรโอพรีน (อีมูริน); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; หรือเมโรเทรกเซต (รุมาทริกซ์)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก่อนเริ่มการรักษา หรือหากพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในระหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: อ่อนแอ; เหนื่อยออก; หายใจลำบาก; เจ็บคอ; ไอ; ไอมีเสมหะเป็นเลือด ไข้; ลดน้ำหนัก; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ท้องเสีย; อาการปวดท้อง; อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ผิวบวม แดง หรือเจ็บปวด หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

คุณอาจติดเชื้อวัณโรค (วัณโรคปอดชนิดหนึ่ง) หรือตับอักเสบบี (โรคตับชนิดหนึ่ง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ การฉีดอีทาเนอร์เซปต์อาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นและคุณจะมีอาการ แพทย์ของคุณจะทำการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อ TB หรือไม่ และอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ หากจำเป็น แพทย์จะให้ยารักษาการติดเชื้อนี้แก่คุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การฉีดอีทาเนอร์เซปต์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หากเคยอาศัยอยู่ในประเทศที่มักมีเชื้อวัณโรค หรือเคยอยู่ใกล้คนที่ เป็นวัณโรค หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของวัณโรค หรือหากมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที:

กล้ามเนื้อหรือมีไข้ ไทรอยด์แพทยของคุณทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้ของโรคตับอักเสบบีหรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างหรือหลังการรักษา: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวน้ำหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระเป็นสีนวล มีไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง หรือผื่นขึ้น

เด็กและวัยรุ่นบางคนที่ได้รับการฉีด etanercept และยาที่คล้ายคลึงกันพัฒนาเป็นมะเร็งที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ) หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมที่คอ ไต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือไข้หรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดยาอีเทนเนอร์เซ็ปต์ให้กับบุตรของท่าน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์ และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พุดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์

hy เป็นยานี้กำหนด?

Etanercept ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการของความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติบางอย่าง (เงื่อนไขที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีสุขภาพดีและทำให้เกิดอาการปวด บวม และเสียหาย) ได้แก่:

- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทำให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทำงาน) ในผู้ใหญ่
- โรคข้ออักเสบสะเท็ดเงิน (เงื่อนไขที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อและบวมและเกล็ดบนผิวหนัง) ในผู้ใหญ่
- โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA; ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อเด็กที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทำให้เกิดอาการปวด บวม สูญเสียการทำงาน และการเจริญเติบโตและการพัฒนาล่าช้า) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป
- ankylosing spondylitis (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความเสียหายของข้อต่อ)
- โรคสะเท็ดเงินจากคราบพลาครีอริง (โรคผิวหนังที่มีผื่นเป็นสะเก็ดสีแดงก่อตัวขึ้นในบางพื้นที่ของร่างกาย) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปที่โรคสะเท็ดเงินรุนแรงเกินกว่าจะรักษาด้วยยาเฉพาะที่

Etanercept อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง tumor-necrosis factor (TNF) ทำงานโดยการปิดกั้นการทำงานของ TNF ซึ่งเป็นสารในร่างกายที่ทำให้เกิดการอักเสบ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

การฉีด Etanercept มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในหลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าและอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ และเป็นผงสำหรับผสมกับของเหลวที่ให้มา Etanercept ถูกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) มักจะฉีดสัปดาห์ละครั้ง เมื่อใช้การฉีด etanercept เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินจากคราบปลัคเรื้อรัง อาจฉีดสัปดาห์ละสองครั้งในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา และสัปดาห์ละครั้งหลังจาก 3 เดือนแรก ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่เข้าใจ ใช้ etanercept ตรงตามที่กำกับไว้ อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

คุณจะได้รับการฉีดอีเทนเนอร์เซปต์ครั้งแรกในสำนักงานแพทย์ หลังจากนั้นคุณสามารถฉีดยาเองที่บ้านหรือให้เพื่อนหรือญาติ ฉีดยาได้ ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือผู้ที่จะทำการฉีดถึงวิธีการฉีดอีเทนเนอร์เซปต์ อ่านคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับการฉีด etanercept ก่อนที่คุณจะฉีดยา

ขวดยาฉีด etanercept อาจมียาเพียงพอสำหรับยามากกว่าหนึ่งขนาด หากมียาเหลืออยู่ในขวดเพียงพอสำหรับขนาดยาที่สมบูรณ์ ให้วางขวดในตู้เย็นโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังจากที่คุณผสม คุณอาจเก็บขวดยาฉีดอีเทนเนอร์เซปต์ไว้ได้นานถึง 14 วัน หลังจากที่คุณผสมยา หากยังมียาเหลือเพียงพอสำหรับการใช้ยาครบขนาด อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรรวมเนื้อหาของขวด etanercept สองขวดหรือมากกว่าเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้รับยาที่สมบูรณ์ คุณไม่ควรผสมยาอื่น ๆ กับการฉีดอีเทนเนอร์เซปต์

หากยาของคุณมาในกระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ ให้ใช้กระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์แต่ละอันเพียงครั้งเดียวและฉีดสารละลายทั้งหมดในกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ แม้ว่าจะยังมีสารละลายเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ก็ตาม อย่าใช้อีก กิ่งเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ พูดคุ้ยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

หากคุณกำลังใช้กระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ หรือขวดยาที่แช่เย็นแล้ว ให้วางกระบอกฉีดยา อุปกรณ์ หรือขวดเล็กลงบนพื้นผิวเรียบและปล่อยให้อุ่นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15-30 นาที ก่อนที่คุณจะพร้อม ฉีดยา. อย่าพยายามอุ่นยาด้วยการอุ่นในไมโครเวฟ แช่น้ำร้อน หรือด้วยวิธีอื่นใด

ห้ามเขย่ากระบอกฉีดยา อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ หรือขวดที่มีสารอีเทนเนอร์เซปต์ ระวังอย่าวางอุปกรณ์ลงบนพื้นผิวที่แข็ง เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ กระบอกฉีดยา หรือเข็มเสียหายได้

ดูสารละลาย etanercept ก่อนฉีดเสมอ ตรวจสอบว่ายังไม่ผ่านวันหมดอายุและของเหลวมีความใสและไม่มีสี ของเหลวอาจมีอนุภาคสีขาวขนาดเล็ก แต่ไม่ควรมีอนุภาคขนาดใหญ่หรือมีสี อย่าใช้กระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาหากมีรอยแตกหรือหัก หากหมดอายุ หรือหากของเหลวขุ่นหรือมีอนุภาคขนาดใหญ่หรือมีสี

สถานที่ที่ดีที่สุดในการฉีด etanercept คือบริเวณด้านหน้าของต้นขาตรงกลางของคุณ คุณยังสามารถฉีดยาในท้องส่วนล่างของคุณใต้สะดือของคุณ ยกเว้นบริเวณสะดือของคุณ 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) หากมีคนอื่นฉีดยาให้คุณ บุคคลนั้นก็สามารถฉีดยาที่ต้นแขนของคุณได้ หากฉีด etanercept ไปที่ต้นแขนหรือหน้าท้อง ผิวหนังในบริเวณนั้นจะต้องถูกยึดออกเพื่อสร้างพื้นผิวที่แน่นสำหรับการฉีด เลือกไซต์อื่นสำหรับการฉีดแต่ละครั้ง ห้ามฉีดเข้าไปในบริเวณที่ผิวหนังอ่อนนุ่ม มีรอยฟกช้ำ แดง แข็ง หรือบริเวณที่มีรอยแผลเป็นหรือรอยแตกหลาย หากคุณมีโรคสะเก็ดเงิน อย่าฉีดเข้าไปในผิวหนังที่มีสีแดง หยาบ ขูดขึ้น หรือมีสะเก็ด

การฉีด Etanercept อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ใช้การฉีด etanercept ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้ etanercept โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สำหรับยา

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอีเทนเนอร์เซ็ปต์หรือยาอื่นๆ หากคุณจะใช้หลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ ให้แจ้งแพทย์หากคุณหรือผู้ที่ฉีดยาให้คุณแพ้ยางหรือน้ำยางขึ้น
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ยาสำหรับโรคเบาหวาน และไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cytosan) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก โรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS; สูญเสียการประสานงาน ความอ่อนแอ และอาการชาเนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาท) myelitis ตามขวาง (การอักเสบของไขสันหลังที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกผิดปกติ, สูญเสียความรู้สึก, หรือสูญเสียความสามารถในการขยับร่างกายส่วนล่าง); โรคประสาทอักเสบแก้วน้ำแสง (การอักเสบของเส้นประสาทที่ส่งข้อความจากตาไปยังสมอง); ปัญหาเลือดออก; โรคตับหรือภาวะหัวใจล้มเหลว
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้อีเทนเนอร์เซ็ปต์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ หากคุณใช้การฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์ระหว่างตั้งครรภ์ อย่าลืมปรึกษาแพทย์ของการเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่มีการคลอดออกมาแล้ว ลูกของคุณอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนช้ากว่าปกติ
- หากคุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้อีเทนเนอร์เซ็ปต์
- ไม่มีการฉีดวัคซีนใด ๆ ระหว่างการรักษาด้วย etanercept โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากบุตรของท่านจะได้รับการรักษาด้วยการฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่ควรได้รับก่อนเริ่มการรักษา ถ้าเป็นไปได้ ลูกของคุณควรได้รับวัคซีนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเด็กในวัยเดียวกันก่อนเริ่มการรักษา
- หากคุณเป็นโรคอีสุกอีใสขณะใช้อีเทนเนอร์เซ็ปต์ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที

ฉันทควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันทควรทำอย่างไรถ้าฉันทลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยาฉันทสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Etanercept อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- แดง คัน ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด
- ปวดหัว
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- อิจฉาริษยา
- อาการปวดท้อง
- ความอ่อนแอ
- ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้หรือที่กล่าวถึงในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน:

- อาการชัก
- ช้ำ
- เลือดออก
- ผิวน้ำเหลือง
- ผิวน้ำเหลือง
- ผื่น
- ลมพิษ
- อาการคัน
- อาการบวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- ผดผื่นตามใบหน้าและแขนที่ทำแดด
- ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า
- ปัญหาการมองเห็น
- แขนหรือขาอ่อนแรง
- อาการเวียนศีรษะ
- ผื่นแดง ตกสะเก็ด หรือตุ่มหนองบนผิวหนัง

ผู้ใหญ่ที่ได้รับการฉีด etanercept อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อม้าน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว) มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งประเภทอื่นๆ มากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับยาฉีด พุดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์

การฉีด Etanercept อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันทันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยาฉี?

เก็บยาฉีไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บยาฉี etanercept ไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง เก็บขวดยา กระบอกรัดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้า หรืออุปกรณ์ฉีดในกล่องเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสง หากคุณผสมขวดยาอีทานเซอร์เซพต์กับของเหลวที่นำมา คุณอาจเก็บสารละลายไว้ในตู้เย็นได้นานถึง 14 วัน

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อกฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poissonhelp.org/help> [<https://www.poissonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกรถพยาบาลทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันทันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อการได้รับ etanercept

ก่อนทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกำลังใช้ etanercept

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเก็บใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Enbrel®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2018

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เมเทสตา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022