



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 依那西普注射液

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602013.html>

## 依那西普注射液

发音为 (et a ner' set)

### 重要警告:

使用依那西普注射剂可能会降低您抵抗感染的能力并增加您感染严重感染的风险, 包括传播到全身的严重病毒、细菌或真菌感染。这些感染可能需要在医院进行治疗, 并可能导致死亡。如果您经常感染任何类型的感染, 或者您认为您现在可能感染任何类型的感染, 请告诉您的医生。这包括轻微感染 (例如开放性伤口或疮)、来来去去的感染 (例如唇疱疹) 和不会消失的慢性感染。如果您患有或曾经患有糖尿病、人类免疫缺陷病毒 (HIV)、获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 或任何其他影响您的免疫系统的疾病, 请告诉您的医生。如果您居住或曾经居住在俄亥俄州和密西西比河谷等严重真菌感染更为常见的地区, 您还应该告诉您的医生。如果您不知道这些感染在您所在地区是否常见, 请咨询您的医生。如果您正在服用降低免疫系统活性的药物, 请告诉您的医生, 例如: 阿巴西普 (奥伦西亚); 阿那白滞素 (Kineret); 硫唑嘌呤 (伊穆兰); 类固醇包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松; 或甲氨蝶呤 (Rheumatrex)。阿那白滞素 (Kineret); 硫唑嘌呤 (伊穆兰); 类固醇包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松; 或甲氨蝶呤 (Rheumatrex)。阿那白滞素 (Kineret); 硫唑嘌呤 (伊穆兰); 类固醇包括地塞米松、甲基强的松龙 (Medrol)、强的松龙 (Prelone) 和强的松; 或甲氨蝶呤 (Rheumatrex)。

您的医生将在您治疗期间和治疗后不久监测您是否有感染迹象。如果您在治疗前出现以下任何症状, 或者在治疗期间或治疗后不久出现以下任何症状, 请立即致电您的医生: 虚弱; 出汗; 呼吸困难; 咽喉痛; 咳嗽; 咳出带血的粘液; 发烧; 减肥; 极度疲倦; 腹泻; 肚子痛; 流感样症状; 温暖、红色或疼痛的皮肤; 或其他感染迹象。

您可能感染了肺结核 (TB, 一种肺部感染) 或乙型肝炎 (一种肝脏疾病), 但没有任何疾病症状。在这种情况下, 依那西普注射液可能会增加您的感染变得更严重并且您会出现症状的风险。您的医生将进行皮肤测试以查看您是否感染了非活动性结核病, 并可能会要求进行血液检查以查看您是否感染了非活动性乙型肝炎。如有必要, 您的医生会在您开始使用依那西普注射液之前给您治疗这种感染的药物。告诉您的医生您是否患有或曾经患过结核病, 是否曾居住在结核病常见的国家, 或者您是否曾与患有结核病的人接触。如果您有以下任何结核病症状, 或者您在治疗期间出现任何这些症状, 请立即致电您的医生:

肌肉紧张或发烧。如果您有任何乙型肝炎症状或在治疗期间或治疗后出现以下任何症状,也请立即致电您的医生:过度疲劳、皮肤或眼睛发黄、食欲不振、恶心或呕吐、肌肉酸痛、深色尿液,粘土色的排便,发烧,发冷,胃痛或皮疹。

一些接受依那西普注射和类似药物治疗的儿童和青少年患上了严重或危及生命的癌症,包括淋巴瘤(始于抗感染细胞的癌症)。如果您的孩子在治疗期间出现任何这些症状,请立即致电他的医生:无法解释的体重减轻;颈部、腋下或腹股沟的腺体肿胀;或容易瘀伤或出血。与您孩子的医生讨论给您的孩子注射依那西普的风险。

当您开始使用依那西普注射液进行治疗以及每次重新配药时,您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表(药物指南)。仔细阅读信息,如有任何问题,请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品和药物管理局(FDA)网站

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) 或制造商的网站获取用药指南。

与您的医生讨论使用依那西普注射液的风险。

## 为什么要开这种药?

依那西普可单独使用或与其他药物一起使用,以缓解某些自身免疫性疾病的症状(免疫系统攻击身体健康部位并导致疼痛、肿胀和损伤的情况),包括:

- 成人类风湿性关节炎(身体攻击自身关节,导致疼痛、肿胀和功能丧失的情况),
- 成人银屑病关节炎(导致关节疼痛、皮肤肿胀和鳞屑的疾病),
- 2岁及以上儿童的幼年特发性关节炎(JIA;一种影响儿童的疾病,身体会攻击自己的关节,导致疼痛、肿胀、功能丧失和生长发育迟缓),
- 强直性脊柱炎(身体攻击脊柱关节和其他区域导致疼痛和关节损伤的情况),
- 慢性斑块状银屑病(一种皮肤病,在身体的某些部位形成红色的鳞状斑块)在成人和4岁及以上的儿童中,其银屑病过于严重而无法单独使用局部药物治疗。

依那西普属于一类称为肿瘤坏死因子(TNF)抑制剂的药物。它通过阻断TNF的作用起作用,TNF是一种在体内引起炎症的物质

## 这个药应该怎么用?

依那西普注射液以预充式注射器和自动注射装置中的溶液（液体）形式出现，并以粉末形式与所提供的液体混合。依那西普皮下注射（皮下）。通常每周注射一次。当依那西普注射液用于治疗慢性斑块型银屑病时，可在治疗的前3个月每周注射两次，然后在前3个月后每周注射一次。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示使用依那西普。不要使用或多或少地使用它，或者使用它比医生规定的更频繁。

您将在医生办公室接受第一剂依那西普注射液。之后，您可以在家中自己注射药物，或让朋友或亲戚进行注射。请您的医生或药剂师向您或将要进行注射的人展示如何注射依那西普。在注射药物之前，请阅读依那西普注射液随附的书面说明。

依那西普注射液的小瓶可能含有足够多于一剂的药物。如果小瓶中剩余的足够完整剂量，请尽快将小瓶放入冰箱，但不得迟于混合后4小时。如果有足够的药物剩余用于完整剂量，您可以在混合后将依那西普注射液的小瓶储存长达14天。但是，您不应将两瓶或多瓶依那西普注射液的内容物组合在一起以制成完整的剂量。您也不应该将任何其他药物与依那西普注射液混合使用。

如果您的药物来自预装注射器或自动注射装置，每个注射器或装置仅使用一次，并将所有溶液注入注射器或装置中。即使注射器或设备中仍有一些溶液，也不要再次使用它。将用过的针头、注射器和装置丢弃在防刺穿容器中。与您的医生或药剂师讨论如何处理防刺穿容器。

如果您使用的是预充式注射器、自动注射装置或已冷藏的小瓶，请将注射器、装置或小瓶放在平坦的表面上，让其温热至室温15-30分钟，然后再准备好注射药物。不要试图通过在微波炉中加热、将其放入热水中或通过任何其他方法来加热药物。

不要摇动装有依那西普的注射器、自动注射装置或小瓶。小心不要将设备掉落在坚硬的表面上，因为这可能会损坏设备、注射器或针头。

注射前务必查看依那西普溶液。检查有效期是否已过，液体是否清澈无色。液体可能含有小的白色颗粒，但不应含有大的或有色的颗粒。如果注射器或剂量笔破裂或破损、过期、液体混浊或含有大颗粒或有色颗粒，请勿使用。

注射依那西普的最佳位置是大腿中部的中部。除了肚脐周围2英寸（5厘米）的区域外，您还可以将药物注射到肚脐下方的下腹部。如果其他人给您注射，该人也可以将药物注射到您的上臂。如果将依那西普注射到上臂或胃部，则必须拉伸该区域的皮肤以形成牢固的注射表面。为每次注射选择不同的部位。不要注射到皮肤柔软、瘀伤、红色、坚硬或有疤痕或妊娠纹的区域。如果您患有牛皮癣，请勿注射到红色、厚实、凸起或鳞片状的皮肤中。

依那西普注射液可能有助于控制您的病情，但不会治愈它。即使您感觉良好，也要继续使用依那西普注射液。不要在未咨询医生的情况下停止使用依那西普。

## 该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

## 我应该遵循什么特殊的预防措施？

### 在使用依那西普注射液之前，

- 如果您对依那西普或任何其他药物过敏，请告诉您的医生和药剂师。如果您将使用预充式注射器或自动注射装置，请告诉您的医生您或将为注射药物的人是否对橡胶或乳胶过敏。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及“重要警告”部分中列出的药物、糖尿病药物和环磷酰胺（Cytoxan）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您有或曾经有过癫痫发作，请告诉您的医生；影响您的神经系统的疾病，例如多发性硬化症（MS；由于神经损伤导致失去协调、虚弱和麻木）；横贯性脊髓炎（可能导致感觉异常、感觉丧失或下半身运动能力丧失的脊髓炎症）；视神经炎（将信息从眼睛发送到大脑的神经炎症）；出血问题；肝病或心力衰竭。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在使用依那西普时怀孕，请致电您的医生。如果您在怀孕期间使用依那西普注射液，请务必在您的宝宝出生后与您的宝宝的医生讨论此事。您的宝宝可能需要比平时晚接种某些疫苗。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在使用依那西普。
- 在没有与医生交谈的情况下，在使用依那西普治疗期间不要接种任何疫苗。如果您的孩子将接受依那西普注射治疗，请与他或她的医生讨论在治疗开始前应接种的疫苗。如果可能，您的孩子应在开始治疗前为他或她的年龄的孩子接种所需的所有疫苗。
- 如果您在使用依那西普时接触到水痘，请立即致电您的医生。

## 我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

## 如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即注射错过的剂量。如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您通常的服药计划。不要注射双倍剂量以弥补错过的剂量。

## 这种药物会引起副作用吗？

**依那西普可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 注射部位发红、瘙痒、疼痛或肿胀
- 头痛
- 恶心
- 呕吐
- 胃灼热
- 肚子痛
- 弱点
- 咳嗽

**一些副作用可能很严重。如果您遇到以下任何副作用或重要警告部分中提到的副作用，请立即致电您的医生或寻求紧急医疗帮助：**

- 癫痫发作
- 瘀血
- 流血的
- 苍白的肤色
- 皮肤起泡
- 皮疹
- 麻疹
- 瘙痒
- 眼睛、脸、嘴唇、舌头、喉咙、手臂、手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 呼吸或吞咽困难
- 在阳光下恶化的面部和手臂上的皮疹
- 麻木或刺痛
- 视力问题
- 手臂或腿部无力
- 头晕
- 皮肤上出现红色、鳞状斑块或充满脓液的肿块

与未接受依那西普注射的成人相比，接受依那西普注射的成人罹患淋巴瘤、白血病（始于白细胞的癌症）、皮肤癌和其他类型癌症的风险可能更大。与您的医生讨论接受依那西普注射的风险。

依那西普注射液可能会引起其他副作用。如果您在使用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用, 您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

## 我应该知道这种药物的储存和处置吗?

将这种药物放在它进来的容器中, 紧紧关闭, 并且放在儿童接触不到的地方。将依那西普注射液储存在冰箱中, 但不要冷冻。将小瓶、预装注射器或注射装置保存在原始纸箱中, 以避光。如果您将一小瓶依那西普粉末与提供的液体混合, 您可以将溶液在冰箱中储存长达 14 天。

不需要的药物应以特殊方式处理, 以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是, 您不应该将这种药物冲入马桶。相反, 处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门, 了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划, 请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要, 因为许多容器 (例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器) 不适合儿童使用, 而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒, 请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n 紧急情况/过量

如果服用过量, 请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来, 请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

## 我应该知道其他信息吗?

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试, 以检查您的身体对依那西普的反应。

在进行任何实验室测试之前, 请告诉您的医生和实验室人员您正在使用依那西普。

不要让其他人使用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药 (非处方药) 以及任何产品 (如维生素、矿物质或其他膳食补充剂) 的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时, 您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 恩布雷尔®

最后修订 - 2018 年 7 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



### [美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

---

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022 年 3 月 25 日