Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694038.html

famciclovir

pronunciado como (fam sye' kloe veer)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Famciclovir se usa para tratar el herpes zoster (culebrilla; una erupción que puede ocurrir en personas que han tenido varicela en el pasado). También se usa para tratar brotes repetidos de herpes labial o herpes labial en personas con un sistema inmunitario normal. Famciclovir se usa para tratar brotes repetidos y para prevenir nuevos brotes de herpes genital (una infección por el virus del herpes que provoca la formación de llagas alrededor de los genitales y el recto de vez en cuando) en personas con un sistema inmunitario normal. Famciclovir también se usa para tratar infecciones recurrentes de herpes simple en la piel y las membranas mucosas (boca, ano) en personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El famciclovir pertenece a una clase de medicamentos llamados antivirales. Funciona al detener la propagación del virus del herpes en el cuerpo. Famciclovir no cura las infecciones por herpes y es posible que no detenga la propagación del virus del herpes a otras personas. Sin embargo, puede disminuir los síntomas de dolor, ardor, hormigueo, sensibilidad y picazón; ayudar a curar las llagas; y evitar que se formen nuevas llagas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El famciclovir viene en forma de tabletas para tomar por vía oral con o sin alimentos. Cuando se usa famciclovir para tratar la culebrilla, generalmente se toma cada 8 horas (tres veces al día) durante 7 días, comenzando dentro de los 3 días posteriores a la aparición del sarpullido. Cuando el famciclovir se usa para tratar el herpes labial y las ampollas febriles, generalmente se toma como una dosis ante el primer signo o síntoma (hormigueo, picazón o ardor) de un herpes labial. Cuando se usa famciclovir para tratar brotes repetidos de herpes genital, generalmente se toma dos veces al día durante un día, comenzando dentro de las 6 horas posteriores al primer signo o síntoma de la afección. Para evitar que el herpes genital regrese, el famciclovir generalmente se toma dos veces al día hasta por 1 año. Cuando se usa famciclovir para tratar la infección por herpes en personas infectadas con el VIH, generalmente se toma dos veces al día durante 7 días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome famciclovir exactamente como se le indique. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico. Use este medicamento tan pronto como sea posible después de que aparezcan los síntomas.

Continúe tomando famciclovir incluso si se siente bien. No deje de tomar famciclovir sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar famciclovir,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al famciclovir, a la crema de penciclovir (Denavir), al aciclovir (Zovirax), a cualquier otro medicamento oa la lactosa.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar, especialmente probenecid (Benemid).
- dígale a su médico si tiene o alguna vez ha tenido problemas con su sistema inmunológico, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); intolerancia a la galactosa o malabsorción de glucosa-galactosa (condiciones hereditarias en las que el cuerpo no puede tolerar la lactosa); o enfermedad renal o hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma famciclovir, llame a su médico.
- Debe saber que el famciclovir puede causarle somnolencia, mareos, confusión o desorientación. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde y tome las dosis restantes para ese día a intervalos espaciados uniformemente. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El famciclovir puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas o los que se enumeran en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES anterior son graves o no desaparecen:

- dolor de cabeza
- náuseas
- vómitos
- diarrea o heces blandas
- gas
- dolor de estómago
- cansancio
- erupción
- Comezón
- periodos menstruales dolorosos

Si experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios, llame a su médico de inmediato:

- dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar su respuesta al famciclovir.

No tenga relaciones sexuales cuando tenga un brote de herpes genital. Sin embargo, el herpes genital se puede contagiar a otras personas, incluso cuando usted no tiene síntomas.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar el famciclovir, llame a su médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Famvir®

Última revisión - 15/12/2017

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022