Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611006.html

芬戈莫德

发音为 (fin gol' i mod)

为什么要开这种药?

芬戈莫德用于预防多发性硬化症（MS；一种疾病其中神经功能不正常，人们可能会出现虚弱、麻木、肌肉协调丧失以及视力、语言和膀胱控制问题）。芬戈莫德属于一类称为磷酸鞘氨醇受体调节剂的药物。它通过减少可能导致神经损伤的免疫细胞的作用起作用。

这个药应该怎么用?

芬戈莫德以胶囊形式口服。通常每天服用一次，有或没有食物。每天大约在同一时间服用芬戈莫德。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用芬戈莫德。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

芬戈莫德可能会导致成人和儿童的心跳减慢，尤其是在您服用第一次剂量后的前 6 小时内，以及在儿童首次剂量后增加剂量时。在您服用第一剂之前和服用后 6 小时，您将收到心电图（ECG；记录心脏电活动的测试）。您将在您的医生办公室或其他医疗机构服用您的第一剂芬戈莫德。服药后，您需要在医疗机构停留至少 6 小时，以便接受监测。如果您有某些情况或服用某些药物会增加心跳减慢的风险，或者如果您的心跳减慢超过预期或在前 6 次后继续减慢，您可能需要在医疗机构停留超过 6 小时或过夜小时。如果您在服用第一剂时心跳减慢，您可能还需要在服用第二剂后至少在医疗机构停留 6 小时。如果您在治疗期间的任何时候出现头晕、疲倦、胸痛或心跳缓慢或不规则，请告诉您的医生，尤其是在您服用第一剂后的前 24 小时内。

芬戈莫德可能有助于控制多发性硬化症，但不能治愈它。不要在未咨询医生的情况下停止服用芬戈莫德。如果您在治疗的前 2 周内没有服用芬戈莫德 1 天或更长时间，在治疗的第三和第四周没有服用 1 周或更长时间，或者在治疗的第一个月后没有服用 2 周或更长时间，请先咨询您的医生你又开始服用了。你可能会经历

当您再次开始服用芬戈莫德时心跳减慢，因此您需要在医生办公室重新开始用药。

当您开始使用芬戈莫德治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品药品监督管理局 (FDA) 网站 (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 或制造商的网站获取用药指南。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用芬戈莫德之前，

- 如果您对芬戈莫德过敏，请告诉您的医生和药剂师，如果您对芬戈莫德或芬戈莫德胶囊中的任何成分有严重过敏反应（皮疹、荨麻疹、面部肿胀、眼睛、嘴巴、喉咙、舌头、嘴唇、手、脚、脚踝或小腿），您的医生可能会告诉您不要使用芬戈莫德。此外，如果您对任何其他药物或芬戈莫德胶囊中的任何成分过敏，请告诉您的医生。请咨询您的药剂师或查看药物指南以获取成分列表。

- 告诉您的医生您是否正在服用治疗心律不齐的药物，例如胺碘酮（Nexterone、Pacerone）、丙吡胺（Norpace）、多非利特（Tikosyn）、决奈达隆（Multaq）、伊布利特（Corvert）、普鲁卡因胺、奎尼丁（Nuedexta）和索他洛尔（Betapace，Sorine，Sotylize）。如果您正在服用一种或多种这些药物，您的医生可能会告诉您不要服用芬戈莫德。

- 告诉您的医生和药剂师在芬戈莫德治疗期间您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：β 受体阻滞剂，如阿替洛尔（Tenormin，在 Tenoretic）、卡替洛尔、拉贝洛尔（Trandate）、美托洛尔（Lopressor、Toprol-XL，在 Dutoprol，在 Lopressor HCT）、纳多洛尔（Corgard，在Corzide)、奈必洛尔 (Bystolic, 在 Byvalson)、普萘洛尔 (Inderal LA, Innopran XL) 和噻吗洛尔；地尔硫卓（Cardizem、Cartia、Tiazac 等）；氯丙嗪；西酞普兰（Celexa）；地高辛（Lanoxin）；红霉素（EES、Ery-Tab、PCE 等）；氟哌啶醇（Haldol）；酮康唑；治疗心脏问题的药物；美沙酮（多洛芬，美沙酮）；和维拉帕米（Calan，Verelan，在 Tarka）。如果您正在服用以下任何药物，或者您过去是否服用过这些药物，请告诉您的医生：皮质类固醇，如地塞米松、甲基强的松龙和强的松；治疗癌症的药物；以及削弱或控制免 疫系统的药物，如米托蒽醌、那他珠单抗 (Tysabri) 和特立氟胺 (Aubagio)，您的医生可能需要更改药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与芬戈莫德相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是那些未出现在此列表中的药物。那他珠单抗（Tysabri）和特立氟胺（Aubagio），您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与芬戈莫德相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是那些未出现在此列表中的药物。那他珠单抗（Tysabri）和特立氟胺（Aubagio），您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与芬戈莫德相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是那些未出现在此列表中的药物。

- 告诉您的医生您在过去六个月内是否患有或曾经患有以下任何一种情况：心脏病发作、心绞痛（胸痛）、中风或小中风或心力衰竭。如果您患有长 QT 综合征（这种情况会增加发生心律不齐的风险，可能导致昏厥或猝死）或心律不齐，还要告诉您的医生。您的医生可能会告诉您不要服用芬戈莫德。

- 告诉您的医生您是否曾经晕倒、心脏病发作、中风或小中风，或者您目前是否有发烧或其他感染迹象，如果您的感染来来去去或不会消失，并且如果您患有或曾经患有糖尿病；睡眠呼吸暂停（您短暂停止的情况

夜间呼吸多次）或其他呼吸问题；高血压; 葡萄膜炎（眼睛发炎）或其他眼部问题；心跳缓慢；血液中钾或镁含量低；皮肤癌，或心脏或肝脏疾病。如果您最近接种过疫苗，也请告诉您的医生。

- 如果您怀孕或计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。您应该在治疗期间和最后一次服药后的 2 个月内使用避孕措施来预防怀孕。如果您在服用芬戈莫德期间或在最后一次服药后 2 个月内怀孕，请致电您的医生。
- 在您使用芬戈莫德治疗期间或在您最后一次服药后的 2 个月内不与您的医生交谈，不要接种任何疫苗。与您孩子的医生讨论您的孩子在开始接受芬戈莫德治疗之前可能需要接种的疫苗。
- 如果您从未患过水痘并且未接种过水痘疫苗，请告诉您的医生。您的医生可能会下令进行血液检查，以查看您是否接触过水痘。您可能需要接种水痘疫苗，然后等待一个月才能开始使用芬戈莫德治疗。
- 计划避免不必要或长时间暴露在阳光和紫外线下（例如晒黑室），并穿上防护服、太阳镜和防晒霜。芬戈莫德可能会使您的皮肤对阳光的危险副作用更加敏感，并可能增加您患皮肤癌的风险。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一剂的时间了，请跳过错过的剂量并在服用下一剂之前致电您的医生。当您重新开始服药时，您可能需要受到监控。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

芬戈莫德可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 弱点
- 背痛
- 手或脚疼痛
- 腹泻
- 腹痛
- 恶心
- 头痛或偏头痛
- 脱发

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状，请立即致电您的医生：

- 心跳缓慢
- 皮疹，荨麻疹，瘙痒; 面部、眼睛、嘴巴、喉咙、舌头或嘴唇肿胀；或吞咽或呼吸困难
- 喉咙痛、全身酸痛、发烧、发冷、咳嗽和其他感染迹象，治疗期间和治疗后 2 个月
- 治疗期间和治疗后 2 个月的头痛、颈部僵硬、发烧、对光敏感、恶心或意识模糊
- 治疗期间和治疗后 2 个月，皮肤有疼痛、灼热、麻木或刺痛感，对触摸、皮疹或瘙痒敏感
- 突然剧烈头痛、意识模糊、视力改变或癫痫发作
- 视线中心出现模糊、阴影或盲点；对光敏感；您的视力出现异常颜色或其他视力问题
- 改变现有痣；皮肤上出现新的变黑区域；不愈合的疮；皮肤上的生长物，例如可能有光泽、珍珠白、肤色或粉红色的肿块，或皮肤的任何其他变化
- 身体一侧虚弱或手臂或腿部笨拙，随着时间的推移而恶化；思维、记忆或平衡的变化；混乱或性格改变；或失去力量
- 新的或恶化的呼吸急促
- 恶心、呕吐、食欲不振、腹痛、皮肤或眼睛发黄或尿色深

芬戈莫德可能会增加患皮肤癌和淋巴瘤（始于抗感染细胞的癌症）的风险。与您的医生讨论服用这种药物的风险。

在您停止服用芬戈莫德后的 3 至 6 个月内，可能会出现 MS 症状的突然增加和残疾恶化。停止芬戈莫德后，如果您的 MS 症状恶化，请告诉您的医生。

芬戈莫德可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗?

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 心跳减慢或不规则

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生将要求进行某些实验室检查、皮肤和眼科检查，并在治疗前和治疗期间监测您的血压，以确保您开始或继续服用芬戈莫德是安全的。

在进行任何实验室测试之前，请告诉您的医生和实验室人员您正在服用芬戈莫德。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 吉莱尼亚®

最后修订 - 2019 年 2 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日