



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

פפאברין

מבוטא כ (pa pav' er een)

היי האם נרשמה תרופה זו?

משמש לשיפור זרימת הדם בחולים עם בעיות במחזור הדם. זה פועל על ידי הרפיית כלי הדם כך שהדם יכול לזרום בקלות רבה יותר אל הלב ודרך הגוף Papaverine.

תרופה זו נרשמה לפעמים לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

מגיע כטבליה וכמוסה בשחרור מורחב (לטווח ארוך) לנטילה דרך הפה. הטבליה נלקחת בדרך כלל שלוש עד חמש פעמים ביום במרווחים שווה. הקפסולה בשחרור מורחב נלקחת בדרך כלל כל 8-12 שעות. אין למעוך, ללעוס או לחלק את הקפסולות בשחרור מורחב. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח פפאברין בדיוק לפי ההוראות Papaverine.

עשוי להיות יוצר הרגל. אין לקחת מינונים גדולים יותר, לקחת את זה לעתים קרובות יותר, או לתקופה ארוכה יותר ממה שהרופא שלך אומר לך Papaverine.

שולט על לחץ דם גבוה אך אינו מרפא אותו. המשך לקחת פפאברין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק לקחת פפאברין מבלי לדבר עם הרופא שלך Papaverine.

השימושים בתרופה זו

משמש גם לטיפול באימפוטנציה אצל גברים. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים האפשריים של שימוש בתרופה זו למצבך Papaverine.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת פפאברין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לפפאברין או לכל תרופה אחרת.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם אתה נוטל, במיוחד לבודופה (Larodopa, Sinemet) וויטמינים.

- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת לב, חסימת AV (הפרעה בקצב הלב), או גלאוקומה.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת פפאברין, התקשר לרופא שלך.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל פפאברין.
- עליך לדעת שתרופה זו עלולה לגרום לך ישנוניות או סחרחורת. אל תנהג במכונית או תפעיל מכונות עד שאתה יודע איך זה משפיע עליך.
- שאל את הרופא שלך לגבי השימוש הבטוח באלכוהול בזמן שאתה נוטל פפאברין. אלכוהול יכול להחמיר את תופעות הלוואי מפפאברין.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שהוחמזה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמזה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמזה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף
Papaverine

- הסמקה (תחושת חום)
- מיוזע
- כאב ראש
- עייפות
- סחרחורת
- פריחה בעור
- קלקול קיבה
- אובדן תיאבון
- שלשול
- עצירות
- כאב בטן

אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד:

- הצהבה של העור או העיניים
- פעימות לב לא סדירות

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון נטילת גלולות שבועית ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org> <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכנית החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות מסוימות כדי לפקח על תפקודי הכבד שלך.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- פאבוקוט®

מתוקן לאחרונה - 15/09/2017

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור

AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022